


ECHACOMECHACO

MANAETIBBUPA

MPOOL MOCKOBCKATO YHUBEPCHTETA



KES KES KES K


FOR THE PEOPLE FOR EDVCATION FOR SCIENCE

LIBRARY

OF
THE AMERICAN MUSEUM

OF
NATURAL HISTORY





охотничьи промысловыя ПТИЦЫ

ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ и КАВКАЗА.



Chropan Villera and michal

ОХОТНИЧЬИ ПРОМЫСЛОВЫЯ ПТИЦЫ

ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ и КАВКАЗА.

Mixhael aleksand ruch Mirgher

М. А. Мензбира,

профессора Императорскаго Московскаго Университета.

Съ атласомъ изъ 140 таблицъ.

Jm <u>П</u> Томъ II-ый.





Оглавленіе.

IV. Курингыя 71. Рябчикъ. (Bonasa canescens, Spartil.) 72. Рябчикъ темпий. (Bonasa grisciventris, Menzb.) 73. Тетеренъ канказскій. (Tetrao inlokosiewiczi, Tacz.) 40. Тетеренъ косачъ. (Tetrao tetrix, L.) 74. Тетеренъ косачъ. (Tetrao tetrix, L.) 75. 1. Весенняя охота, стр. 6,— Пътий образъ жизни. стр. 51.— Весенняй очеркъ, стр. 4,— Весенній образъ жизни. стр. 51.— Весенняя охота, стр. 6,— Пътий образъ жизни тетерева, стр. 61.— Сесния охота, стр. 6,— Пътий образъ жизни тетерева, стр. 64.— Сесния охота, стр. 8,— Осений и зимий образъ жизни тетерева, стр. 64.— Сесния охота, стр. 8,— Осений и зимий образъ жизни тетерева, стр. 64.— Сесния охота, стр. 63.— Пътия охота, стр. 13.— Весения охота, стр. 13.— Сесния охота, стр. 13.— Осень и зима, стр. 15. 75. Куронатка бълая. (Lagopus albus, Gm.) 76. Куронатка туп. гряная. (Lagopus mutus, Mont.) 77. Куронатка туп. гряная. (Lagopus mutus, Mont.) 78. Куронатка туп. гряная. (Lagopus mutus, Mont.) 79. Перенетъ. (Социтіх сощиний. Вопнат.) 80. Куронатка каменная. (Perdix cinerea. Briss.) 81. Куронатка каменная. (Perdix cinerea. Briss.) 82. Пидъйка горная кавказская. (Tetraogallus caucasicus, Pall.) 83. Пидъйка горная кавкайская. (Tetraogallus caucasicus, Pall.) 84. Турачъ. (Francolinus vulgaris, Steph.) 223 85. Кавказскій фазанъ. (Phasianus colchicus, L.) 231 86. Конытка. (Syrrhaptes paradoxus, Pall.) 87. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arenarius, Pall.) 233 87. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arenarius, Pall.) 234 49. Голуб п. 237 49. Голуб п. 238 Рябокъ бълобрюхій. (Социньа livia, Briss.) 241 94. Клинтухъ. (Социньа рашньых, L.) 243 244 245 246 247 249 248 247 249 249 249 247 247 249 248 249 249 249 244 247 249 247 249 248 249 249 249 249 240 240 240 241 241 241 242 243 244 245 246 246 247 247 248		Cmp.
Распространеніе. стр. 3.— Образь жилли, стр. 6.— Охота стр. 13. 72. Рабонись темный. (Вола-а griselventris, Menzb.)	IV. Куриныя	. I
72. Рябчикъ темпый. (Bonasa grisciventris, Menzb.). 39 73. Тетеревъ кавказскій. (Tetrao mlokosiewizi, Tacz.). 40 74. Тетеревъ косатъ. (Tetrao tetrix, L.). 45 Распространеніе и обмій оперкъ, стр. 45.— Весенній образъ жизни. стр. 31.— Весенняя охота, стр. 63.— Лѣтий образъ жизни тетерева, стр. 31.— Весенняя охота, стр. 63.— Лѣтий образъ жизни тетерева, стр. 63.— Осенняя охота, стр. 63.— Лѣтий образъ жизни тетерева, стр. 63.— Осенняя охота, стр. 63.— Осенняя охота, стр. 104. 75 и 76. Глухарь (Tetrao urogallus, L.) и глухарь бѣлобрюхій (Теtrao urogallus uralensis, Menzb.) Распространеніе, стр. 124.— Весенній образъ жизни, стр. 128.— Весенняя охота, стр. 136.— Лѣто и лѣтияя охота, стр. 134.— Осень и зима, стр. 163. 77. Куронатка бѣлая. (Lagopus albus, Gm.). 172 78. Қуронатка туптряная. (Lagopus mutus, Mont.). 178 79. Перенель. (Coturnix communis, Bonnat.). 180 80. Куронатка сърая. (Perdix cinerea, Briss.). 195 81. Куронатка каменная. (Perdix cinerea, Briss.). 208 82. Пидъйка горная кавказская. (Тetraogallus caucasicus, Pall.). 215 83. Индъйка горная кавказская. (Tetraogallus caucasicus, Pall.). 223 84. Турачъ. (Francolinus vulgaris, Steph.). 223 85. Кавказскій фазанъ. (Phasianus colchicus, L.). 225 V. Рябки 231 86. Конытка. (Syrrhaptes paradoxus, Pall.). 233 87. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arenarius, Pall.). 233 88. Рябокъ бѣлобрюхій. (Pterocles alchata sewerzowi, Bgdn.). 236 VI. Голуби 237 89. Горлица. (Титtur auritus, Gray). 239 90. Голубь дикій, сизый. (Columba livia, Briss.). 241 91. Клинтухъ. (Columba palumbus, L.). 249 92. Вяхирь. (Columba palumbus, L.). 249 94. Крохаль длинноносый. (Mergus serrator, L.). 251		. 3
73. Тетеревъ кавказскій. (Tetrao mlokosiewiczi, Tacz.) 40 74. Тетеревъ косачъ. (Tetrao tetrix, L.) 45 Распространеніе и общій очеркъ, стр. 45.—Весенній образъ жизни. стр. 51.—Весенняя охота, стр. 63.—Пьтній образъ жизни, стр. 74.— Льтняя охота, стр. 84.—Осенній и зимий образъ жизни тетерева, стр. 93.—Осенняя охота, стр. 100. 75 и 76. Глухаръ (Tetrao urogallus, L.) и глухаръ обълобрюхій (Tetrao urogallus uralensis, Menzb.) 124 Распространеніе, стр. 124.—Весенній образъ жизни, стр. 128.—Весенняя охота, стр. 136.—Осень и зима стр. 165. 77. Куронатка объав. (Lagopus albus, Gm.) 172 78. Куронатка тупдряная. (Lagopus mutus, Mont.) 178 79. Перепелъ. (Coturnix communis, Bonnat.) 180 80. Куронатка тупдряная. (Perdix cinerea, Briss.) 195 81. Куронатка каменнам. (Perdix chukar, Gray) 208 82. Пидъйка горная кавказская. (Tetraogallus caucasicus, Pall.) 215 83. Индъйка горная каспійская. (Tetraogallus caspius, Gm.) 221 84. Турачъ. (Francolinus vulgaris, Steph.) 223 85. Кавказскій фазанъ. (Phasianus colchicus, L.) 233 87. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arenarius, Pall.) 233 88. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arenarius, Pall.) 236 VI. Голуби. 237 89. Горлица. (Титtur auritus, Gray) 239 90. Голубь дикій, сизый. (Columba livia, Briss.) 241 91. Клинтухъ. (Columba oenas, Briss.) 241 92. Вяхирь. (Columba palumbus, L.) 249 94. Курохаль длиноносый. (Mergus serrator, L.) 251		20
74 Тетеревъ косачъ. (Tetrao tetrix, L.). Распространеніе и общій оперкъ, стр. 45.— Весенній образь живни. стр. 51.— Весенняя окота, стр. 63.— Пѣтняй образь живни, стр. 74.— Лѣтняя окота, стр. 84.— Осенній и зимий образь живни тетерева, стр. 93.— Осенняя окота, стр. 98.— Зимияя окота, стр. 100. 75 и 76. Глукарь (Tetrao urogallus, L.) и глукарь оѣтлобрюхій (Теtrao urogallus uralensis, Menzb.). 124 Распространеніе, стр. 124.— Весенній образь живни, стр. 128.— Весенняя окота, стр. 146.— Іѣто и лѣтняя окота, стр. 154.— Осень и зима, стр. 163. 77. Куропатка оѣлая. (Lagopus albus, Gm.). 172 78. Куропатка тупдряная. (Lagopus mutus, Mont.). 178 79. Перенеть. (Coturnix communis, Bonnat.). 180 80. Куропатка сърая. (Perdix cinerea, Briss.). 195 81. Куропатка каменная. (Perdix cinerea, Briss.). 208 82. Пидъйка горная кавказская. (Tetraogallus caucasicus, Pall.). 215 83. Пидъйка горная кавказская. (Tetraogallus caspius, Gm.). 221 84. Турачъ. (Francolinus vulgaris, Steph.). 223 85. Кавказскій фазанъ. (Phasianus colchicus, L.). 231 86. Конытка. (Syrrhaptes paradoxus, Pall.). 233 87. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arenarius, Pall.). 235 88. Рябокъ бълобрюхій. (Pterocles alchata sewerzowi, Bgdn.). 236 VI. Голуби 237 89. Горлица. (Титтит auritus, Gray). 239 90. Голубь дикій, сизый. (Columba livia, Briss.). 241 91. Клинтухъ. (Columba oenas, Briss.). 242 92. Вяхирь. (Columba palumbus, L.). 249 94. Крохаль длинноносый. (Метgus serrator, L.). 251		
Распространеніе и общій очеркь, стр. 45.— Весенній образь жизни. стр. 51.— Весенняя охота, стр. 63.— Лѣтияя охота, стр. 84.— Осений и зимий образь живни, стр. 74.— Лѣтияя охота, стр. 98.— Зимияя охота, стр. 100. 75 п. 76. Глухарь (Tetrao urogallus, L.) и глухарь оѣлобрюхій (Теtrao urogallus uralensis, Menzb.) Распространеніе, стр. 124.— Весенній образь живни, стр. 128.— Весенняя охота, стр. 1,6.— Лѣто и лѣтияя охота, стр. 154.— Осень и зима, стр. 163. 77. Куронатка оѣлая. (Lagopus albus, Gm.)		· · ·
стр. 51.— Весенняя охота, стр. 63.— Лѣтияй образъ жизни, стр. 74.— Лѣтияя охота, стр. 84.— Осенняй и замый образъ жизни тетерева, стр. 93.— Осенняя охота, стр. 98.— Зямияя охота, стр. 100. 75 и 76. Глухарь (Tetrao urogallus, L.) и глухарь оѣлобрюхій (Tetrao urogallus uralensis, Menzb.)		
(Tetrao urogallus uralensis, Menzb.)	стр. 51.— Весенняя охота, стр. 63.— Лѣтній образъ жизни, стр. 74 Лѣтняя охота, стр. 84.— Осенній и зимній образъ жизни тетерев	_
(Tetrao urogallus uralensis, Menzb.)	75 и 76. Глухарь (Tetrao urogallus, L.) и глухарь о́влобрюхі	ñ
Распространеніе, стр. 124.— Весенняй охота, стр. 136.— Лето и летняя охота, стр. 154.— Осень и зима, стр. 163. 77. Куронатка белая. (Lagopus albus, Gm.) 172 78. Куронатка тупдряная. (Lagopus mutus, Mont.) 178 79. Перенель. (Čoturnix communis, Bonnat.) 180 80. Куронатка сърая. (Perdix cinerea, Briss.) 195 81. Куронатка каменная. (Perdix cinerea, Briss.) 208 82. Пидъйка горная кавказская. (Tetraogallus caucasicus, Pall.) 215 83. Пидъйка горная каспійская. (Tetraogallus caucasicus, Pall.) 221 84. Турачь. (Francolinus vulgaris, Steph.) 223 85. Кавказскій фазанъ. (Phasianus colchicus, L.) 225 V. Рябки. 231 86. Конытка. (Syrrhaptes paradoxus, Pall.) 233 87. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arcnarius, Pall.) 235 88. Рябокъ бълобрюхій. (Pterocles alchata sewerzowi, Bgdn.) 236 VI. Голуби. 237 89. Горлица. (Титиг auritus, Gray) 239 90. Голубь дикій, сизый. (Columba livia, Briss.) 241 91. Клинтухъ. (Columba palumbus, L.) 242 92. Вяхирь. (Columba palumbus, L.) 247 93. Лутокъ. (Mergus albellus, L.) 249 94. Крохаль длинноносый. (Mergus s		
78. Куропатка тупдряпая. (Lagopus mutus, Mont.)	Распространеніе, стр. 124.— Весенній образъ жизни, стр. 128.—Весення охота, стр. 146.— Л'ято и л'ятияя охота, стр. 154.— Осень и зим	RI
78. Куропатка тупдряпая. (Lagopus mutus, Mont.)	77. Куронатка бълая. (Lagopus albus, Gm.)	. 172
79. Перепеть. (Coturnix communis, Bonnat.)		
80. Куропатка сврая. (Perdix cinerea. Briss.)	70 Hepeners (Coturnix communis Bounat)	180
81. Куропатка каменная. (Perdix chukar, Gray)	80 Kypouarva chang (Perdix cinerea Briss)	
82. Пидъйка горная кавказская. (Tetraogallus caucasicus, Pall.). 215 83. Пидъйка горная каснійская. (Tetraogallus caspius, Gm.). 221 84. Турачь. (Francolinus vulgaris, Steph.)		
83. Пидъйка гориая касиййская. (Tetraogallus caspius, Gm.)		
84. Турачь. (Francolinus vulgaris, Steph.)		
85. Кавказскій фазанъ. (Phasianus colchicus, L.)		
V. Рябки. 231 86. Конытка. (Syrrhaptes paradoxus, Pall.) 233 87. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arenarius, Pall.) 235 88. Рябокъ бѣлобрюхій. (Pterocles alchata sewerzowi, Bgdn.) 236 VI. Голуби. 237 89. Горлица. (Turtur auritus, Gray) 239 90. Голубь дикій, сизый. (Columba livia, Briss.) 241 91. Клинтухъ. (Columba oenas, Briss.) 242 92. Вяхирь. (Columba palumbus, L.) 244 VII. Пластинчатоклювыя 247 93. Лутокъ. (Мегдиз albellus, L.) 249 94. Крохаль длинноносый. (Mergus serrator, L.) 251	од. Турачь. (Franconnus vulgaris, Steph.)	. 223
86. Конытка. (Syrrhaptes paradoxus, Pall.)	85. Ivan (l'hasianus colenicus, L.)	. 225
87. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arenarius, Pall.)	V. Рябки	. 231
87. Рябокъ чернобрюхій. (Pterocles arenarius, Pall.)	86. Конытка. (Syrrhaptes paradoxus Pall.)	. 233
88. Рябокъ облобрюхії. (Pterocles alchata sewerzowi, Bgdn.) 236 VI. Голуби		
VI. Голуби		
89. Горлица. (Turtur auritus, Gray)	1 mooks oblioopioniii (* terocies aleilata senermoni, bgani);	. 25
90. Голубь дикій, сизый. (Columba livia, Briss.)	VI. Голуби	. 237
90. Голубь дикій, сизый. (Columba livia, Briss.)	89. Горлица. (Turtur auritus, Gray)	. 239
91. Клинтухъ. (Columba oenas, Briss.)	90. Голубь дикій, сизый. (Columba livia, Briss.)	
92. Вяхирь. (Columba palumbus, L.)		
VII. Пластинчатоклювыя		•
93. Лутокъ. (Mergus albellus, L.)	,	. , , ,
94. Крохаль длинионосый. (Mergus serrator, L.) 251	VII. Пластинчатоклювыя	. 247
94. Крохаль длинионосый. (Mergus serrator, L.) 251	93. Лутокъ. (Mergus albellus, L.)	. 249
95. Крохаль большой. (Mergus merganser, L.) 253		
	95. Крохаль большой. (Mergus merganser, L.)	

				Cmp.
96.	Савка. (Erismatura leucocephala, Scop.)			255
	Γara. (Somateria mollissima, L.)			256
98.	Гага гребенушка. (Somateria spectabilis, L.)			260
99.	Гага сибирская. (Somateria stelleri, Pall.)			261
100,	Синьга. (Fuligula nigra, Briss.)			262
101.	Турнанъ. (Fuligula fusca, L.)			263
	Морянка. (Fuligula glacialis, L.)			265
	Kаменушка. (Fuligula histrionica, L.)			267
	Гоголь. (Fuligula clangula, L.)			268
105.	Гоголь исландскій. (Fuligula islandica, Gm.)			269
	Нырокъ бълоглазый. (Fuligula nyroca, Güld.)			270
	Нырокъ краспоносый. (Fuligula rufina, Pall.)			271
108.	Чернеть хохлатая. (Fuligula cristata, Leach.)			272
	Чернеть морская. (Fuligula marila, L.)			274
	Пырокъ красноголовый. (Fuligula ferina, L.)			275
	Широконоска. (Anas clypeata, Briss.)			276
	¹ Іпрокъ трескунокъ. (Anas circia, L.)		Ċ	277
	Чирокъ свистунокъ. (Anas crecca, L.)			278
	Чирокъ узконосый. (Anas angustirostris, Ménéth.)			279
T 15.	Утка сърая. (Anas strepera, L.)			280
	Кряква. (Anas boschas, L.)			281
,	Распространеніе и общій очеркъ, стр. 281.— Весна и весенняя	oxo	та.	
			,	
	стр. 290. — Лъто и осень, стр. 302.			
117.	стр. 290.— Лѣто и осень, стр. 302. Шилохвость. (Anas acuta, L.)			318
	Шилохвость. (Anas acuta, L.)	 		318 319
118.	Шилохвость. (Anas acuta, L.)	 		318 319 321
118. 119.	Шилохвость. (Anas acuta, L.)	 		319 321
118. 119. 120.	Шилохвость. (Anas acuta, L.)	 		319
118. 119. 120. 121.	Шилохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Anas penelope, L.) Півганка. (Tadorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Tadorna rutila, Pall.) Лебедь кликунъ. (Cygnus musicus, Bechst.)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		319 321 323 324
118. 119. 120. 121. 122.	Шилохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Anas penelope, L.) Півганка. (Tadorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Tadorna rutila, Pall.) Пебедь кликунъ. (Cygnus musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Cygnus bewicki, Yarr.)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		319 321 323 324 329
118. 119. 120. 121. 122.	Нінлохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Anas penelope, L.) Пібганка. (Tadorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Tadorna rutila, Pall.) Пебедь кликунъ. (Cygnus musicus, Bechst.) Пебедь малый. (Cygnus bewicki, Yarr.) Пебедь шинунъ. (Cygnus olor, J. G. Gm.)			319 321 323 324 329 330
118. 119. 120. 121. 122. 123.	Нінлохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Anas penelope, L.) Півганка. (Tadorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Tadorna rutila, Pall.) Лебедь кликунь. (Cygnus musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Cygnus bewicki, Yarr.) Лебедь шинунь. (Cygnus olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей. Гусь білый. (Anser hyperboreus, Pall.)			319 321 323 324 329 330 331
118. 119. 120. 121. 122. 123.	Нінлохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Anas penelope, L.) Півганка. (Tadorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Tadorna rutila, Pall.) Лебедь кликунь. (Cygnus musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Cygnus bewicki, Yarr.) Лебедь шинунь. (Cygnus olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей. Гусь білый. (Anser hyperboreus, Pall.)			319 321 323 324 329 330 331 333
118. 119. 120. 121. 122. 123.	Инпохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Anas penelope, L.) Півтанка. (Tadorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Tadorna rutila, Pall.) Лебедь кликунъ. (Cygnus musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Cygnus bewicki, Yarr.) Лебедь шинунъ. (Cygnus olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей. Гусь бълый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.)			319 321 323 324 329 330 331 333 334
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.	Шилохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Anas penelope, L.) Півтанка. (Tadorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Tadorna rutila, Pall.) Лебедь кликунъ. (Cygnus musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Cygnus bewicki, Yarr.) Лебедь шинунъ. (Cygnus olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь бълый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бълощекая. (Anser leucopsis, Bechst.)			319 321 323 324 329 330 331 333 334 335
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.	Шилохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Anas penelope, L.) Пъганка. (Tadorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Tadorna rutila, Pall.) Лебедь кликунъ. (Cygnus musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Cygnus bewicki, Yarr.) Лебедь шинунъ. (Cygnus olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь бълый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бълощекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruticollis, Pall.)	· · · · · ·		319 321 323 324 329 330 331 333 334 335 336
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.	Ніплохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Anas penelope, L.) Півтанка. (Tadorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Tadorna rutila, Pall.) Лебедь кликунь. (Cygnus musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Cygnus bewicki, Yarr.) Лебедь шинунь. (Cygnus olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь бълый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бълонцекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruficollis, Pall.) Казарка бълолобая. (Anser albifrons, Scop.)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		319 321 323 324 329 330 331 333 334 335 336 338
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.	Ніплохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Апаs penelope, L.) Півтанка. (Таdorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Таdorna rutila, Pall.) Лебедь кликунъ. (Судпиз musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Судпиз bewicki, Yarr.) Лебедь шинунъ. (Судпиз olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь бѣлый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бѣлонекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruficollis, Pall.) Казарка бѣлолобая. (Anser albifrons, Scop.) Казарка малая бѣлолобая. (Anser crythropus, L.)			319 321 323 324 329 330 331 333 334 335 336 338
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.	Ніплохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Апаs penelope, L.) Півтанка. (Таdorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Таdorna rutila, Pall.) Лебедь кликунь. (Судпиз musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Судпиз bewicki, Yarr.) Лебедь шинунь. (Судпиз olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь б'ялый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка б'ялонекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruficollis, Pall.) Казарка б'ялолобая. (Anser albifrons, Scop.) Казарка малая б'ялолобая. (Anser erythropus, L.) Гуменникъ. (Anser segetum, Gm.)			319 321 323 324 329 330 331 333 334 335 336 340 341
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.	Инпохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Апаs penelope, L.) Пѣганка. (Таdorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Таdorna rutila, Pall.) Лебедь кликунь. (Судпиз musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Судпиз bewicki, Yarr.) Лебедь шинунь. (Судпиз olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь бѣлый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бѣлонекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruticollis, Pall.) Казарка бѣлолобая. (Anser albifrons, Scop.) Казарка малая бѣлолобая. (Anser erythropus, L.) Гуменникъ красноносый. (Anser neglectus, Suschk.)			319 321 323 324 329 330 331 335 336 340 341 342
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.	Инпохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Апаs penelope, L.) ПЪганка. (Таdorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Таdorna rutila, Pall.) Лебедь кликунь. (Судпиз musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Судпиз bewicki, Yarr.) Лебедь шинунь. (Судпиз olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь бѣлый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бѣлонекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruticollis, Pall.) Казарка бѣлолобая. (Anser albifrons, Scop.) Казарка малая бѣлолобая. (Anser erythropus, L.) Гуменникъ красноносый. (Anser neglectus, Suschk.) Гуменникъ коротконосый. (Anser brachyrhynchus, Baill	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		319 321 323 324 329 330 331 335 336 340 341 342 346
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.	Ніплохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Апаs penelope, L.) Півтанка. (Таdorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Таdorna rutila, Pall.) Лебедь кликунъ. (Судпиз musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Судпиз bewicki, Yarr.) Лебедь шинунъ. (Судпиз olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь бѣлый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бѣлонцекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruticollis, Pall.) Казарка бѣлолобая. (Anser albifrons, Scop.) Казарка малая бѣлолобая. (Anser erythropus, L.) Гуменникъ красноносый. (Anser neglectus, Suschk.) Гуменникъ коротконосый. (Anser brachyrhynchus, Baill			319 321 323 324 329 330 331 335 336 340 341 342 346 347
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.	Инпохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Апаs penelope, L.) ПЪганка. (Таdorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Таdorna rutila, Pall.) Лебедь кликунь. (Судпиз musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Судпиз bewicki, Yarr.) Лебедь шинунь. (Судпиз olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь бѣлый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бѣлонекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruticollis, Pall.) Казарка бѣлолобая. (Anser albifrons, Scop.) Казарка малая бѣлолобая. (Anser erythropus, L.) Гуменникъ красноносый. (Anser neglectus, Suschk.) Гуменникъ коротконосый. (Anser brachyrhynchus, Baill			319 321 323 324 329 330 331 335 336 340 341 342 346
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 130. 131. 132. 133.	Ніплохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Апаs penelope, L.) Півтанка. (Таdorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Таdorna rutila, Pall.) Лебедь кликунъ. (Судпиз musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Судпиз bewicki, Yarr.) Лебедь шинунъ. (Судпиз olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей Гусь бѣлый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бѣлонцекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruticollis, Pall.) Казарка бѣлолобая. (Anser albifrons, Scop.) Казарка малая бѣлолобая. (Anser erythropus, L.) Гуменникъ красноносый. (Anser neglectus, Suschk.) Гуменникъ коротконосый. (Anser brachyrhynchus, Baill			319 321 323 324 329 330 331 335 336 340 341 342 346 347 359
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.	Нипохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Апая penelope, L.) Пѣганка. (Таdorna cornuta, Gm.) Утка красная. (Таdorna rutila, Pall.) Лебедь кликунь. (Суgnus musicus, Bechst.) Лебедь малый. (Суgnus bewicki, Yarr.) Лебедь шинунь. (Суgnus olor, J. G. Gm.) Добываніе лебедей. Гусь бѣлый. (Anser hyperboreus, Pall.) Казарка черная. (Anser brenta, Briss.) Казарка бѣлонекая. (Anser leucopsis, Bechst.) Казарка краснозобая. (Anser ruticollis, Pall.) Казарка бѣлолобая. (Anser albifrons, Scop.) Казарка малая бѣлолобая. (Anser erythropus, L.) Гуменникъ красноносый. (Anser neglectus, Suschk.) Гуменникъ коротконосый. (Anser brachyrhynchus, Baill Гусь сѣрый. (Anser cinereus, Meyer.) Краснокрылъ. (Phoenicopterus roseus, Pall.)			319 321 323 324 329 330 331 335 336 341 342 346 347 359
118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.	Нипохвость. (Anas acuta, L.) Свіязь. (Апая penelope, L.). Пѣтанка. (Таdorna cornuta, Gm.). Утка красная. (Таdorna rutila, Pall.). Лебедь кликунъ. (Судпия musicus, Bechst.). Лебедь малый. (Судпия bewicki, Yarr.). Лебедь шинунъ. (Судпия olor, J. G. Gm.). Добываніе лебедей. Гусь бѣлый. (Anser hyperboreus, Pall.). Казарка черная. (Anser brenta, Briss.). Казарка бѣлонекая. (Anser leucopsis, Bechst.). Казарка краснозобая. (Anser ruficollis, Pall.). Казарка бѣлолобая. (Anser albifrons, Scop.). Казарка малая бѣлолобая. (Anser erythropus, L.). Гуменникъ. (Аnser segetum, Gm.). Гуменникъ красноносый. (Anser neglectus, Suschk.). Гуменникъ коротконосый. (Anser brachyrhynchus, Baill Гусь сѣрый. (Anser cinereus, Meyer.). Краснокрытъ. (Phoenicopterus roseus, Pall.).			319 321 323 324 329 330 331 335 336 340 341 342 346 347 359

IV. КУРИНЫЯ.



71. Рябчикъ.

Bonasa canescens, Sparrm.

Табл. 74.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 400.

Болѣе распростр. названія: рябчикъ, рябецъ, рябокъ.

Мъстныя названія: *боровой*, *молионогій рябокъ* (въ Нермской губ. въ отличіе отъ сфрой куронатки, которую называють рябкомъ и рябкомъголоножкой).

Польек.—jarqzbek, gluszee jarzqbek.—Эст.—pü, lane pü, laas püwi.—

Лат.—mescha irhv.—Фин.—tavallinen руу.—;Кмул.—jeruhes.

Татар.—посоръ, бидженръ.—Вашк.—сыль.—Сиб. тат.—джимъ, джиме.—
Нерм. и Зырянск.— съсла. — Мордов.—веринпувна, веринповаль.—Черем. —
муж. -Вотяц.— инле. сяла. Сосв. вог. шулли, у друг. кизина, апка. —
Берез. ост.—паетекъ. На Пртинъ постовой. На Сургутъ пынкъ. -На
Нарымъ пекке. пече. На р. Кеть— пече. пеле. Монг. кеду.—Калм.—
мтунъ. Тунг. киркъ. На Енис. хипьюки. -На Байк.—мукъ.—Ламут. —
илики. - Бирар.-Тунг.— инки.—Карагасс.— сарма.—Ороч. в. Амура—хипкиилик, примор.—осеме.—Якут.—пунурасъ, бунурасъ, банограсъ. — Гольд.—
пимму.—Никн. Уссури—пимо, верхн.—хипка, степки.—Гиляцк.—ханъ.—
Манг.—пенью.

Мы не ошибемся, сказавъ, что первое мѣсто среди промысловыхъ птицъ принадлежитъ рябчику, который какъ по цѣнѣ, такъ и по количеству добываемыхъ экземпляровъ оставляетъ позади себя даже тетерева-косача и куропатокъ. При этомъ рябчикъ является преимущественно русской птицей, такъ какъ его распространение за предѣлами нашего отечества, въ западной Европѣ и въ Китаѣ, весьма ограниченно. Но несмотря на все это, свѣдѣнія объ образѣ жизни этой птицы до послѣдняго десятилѣтія были весьма скудны, да и теперь оставляютъ желать многаго въ смыслѣ полноты.

Хотя рябчикъ въ западной Европѣ, восточной Сибири и Манчжуріп и встрѣчается въ горахъ, тѣмъ не менѣе коренное его мѣстонахожденіе составляютъ равнинные лѣса и это опредѣляетъ его распространеніе. Обширная лѣсная область сѣверо-восточной Европы и Сибири—такова въ общихъ чертахъ область его распространенія. Ко-

нечно и въ предълахъ этой площади и вить ея рябчикъ вмѣстѣ съ подходящими лѣсами, особенно по долинамъ рѣкъ и ручьевъ, подинмается въ горы, но гориой итицей его никакъ нельзя назвать. Что касается западной Европы, то даже болѣе чѣмъ вѣроятно, что здѣсь рябчикъ былъ оттѣсненъ въ горы лишь все увеличивающимся населеніемъ и вырубкою лѣсовъ низменностей. Въ восточной же Сибпри, во всей области р. Амура и Манчжуріи рябчикъ лишь условно можетъ быть названъ горной птицей. Шренкъ весьма опредѣленно говоритъ, что онъ водится здѣсь преимущественно по лѣсистымъ берегамъ рѣкъ, и въ южной части страны по склонамъ горъ и скалистымъ берегамъ потоковъ, поросшихъ свѣтлыми лиственными лѣсами съ густой порослью.

Что касается Европ. Россіи, то не можетъ быть сомнічнія, что въ концѣ XVIII столѣтія, а можетъ быть и позднѣе, рябчикъ шелъ значительно южиће, чѣмъ теперь. Такъ, у Филарета есть указаніе, взятое изъ въдомости за 1784 г., изъ котораго видно, что въ это время въ Зміевскихъ літеахъ водились рябчики. Гмелинъ приводитъ рябчика для Воронежской губ., гдв его теперь положительно нѣтъ; но такъ какъ Гмелинъ на ряду съ рябчикомъ приводитъ и бѣлую куропатку, то относительно Воронежской губ. можно думать, что Гмелинъ судилъ по продажнымъ, базарнымъ экземплярамъ, которые могли быть привезены откуда-нибудь, хотя нътъ ничего невъроятнаго, что рябчикъ прежде дѣйствительно водился въ Воронежской губ. Какъ далеко спускалась эта птица на югъ-сказать точно нѣтъ никакой возможности, но надо полагать, что она шла къ югу такъ далеко, какъ шли глухіе лиственные лѣса съ подсъдомъ и сырымъ низомъ. Во всякомъ случаъ, отсутствіе рябчика въ Крыму и на Кавказъ опредъленно говорить, что степь была для него непреодолимой преградой.

Но если и можно сказать, что южная граница рябчика съ годами просто отодвинулась къ съверу, это еще не опредъляетъ тъхъ измъненій, какія произошли въ его распространеніи; главное изм'вненіе состоить въ спорадичности его распространенія тамъ, гдѣ прежде опъ занималъ сплоничю область. Рябчиковое населеніе, если можно такъ, выразиться, разр'едилось на значительной части занятой имъ площади во всей средней Россіи, и вмѣстѣ съ этимъ рябчикъ пересталь здѣсь быть предметомъ промысла. Л. П. Сабанвевъ еще 20 лвтъ тому назадъ былъ совершенно правъ, говоря, что въ настоящее время рябчикъ служить предметомъ промысла только въ съверной половинъ Европейской Россіи, именно, начиная отъ лівваго берега Волги и праваго Бълой до впаденія ея въ Каму, и что юживе этой границы онъ многочисленъ лишь мъстами, напр., въ губ. Владимірской, Костромской и Нижегородской. Посмотримъ же теперь, какъ идетъ общая южная граница его распространенія въ нашей странъ. Начинаясь подъ 52° с. ш. на Уралъ, эта граница пдетъ на съверо-западъ, такъ что охватываетъ сопредъльныя части Бугульминскаго и Бугурусланскаго у вздовъ, потомъ проходитъ на занадъ черезъ Чистонольскій и Спасскій

увзды Казанской губ., новорачиваеть къ югу, и идеть черезъ Ставропольскій у. Самарской губ., окружаєть лівеа Жигулевскихъ горъ, гдів
рябчикъ еще довольно многочисленъ, и отсюда идеть онять на западъчерезъ южныя части Симбирской и Неизенской губ. Въ Тамбовской
губ. рябчикъ еще есть въ Шацкомъ и Моршанскомъ у., по пройдя
ихъ, южная граница описываемой итицы вівроятно круто поднимается
къ С.-З., отрівая юго-западную часть Рязанской губ., гдів рябчика
ивтъ, отъ сіверо-восточной, гдів есть. Отсюда граница идеть въ югозападномъ направленіи, охватывая т. наз. "засівку" Тульской губ., и
черезъ западные утвіды Орловской и сіверные Чершиговской, Кіевской (?) и Вольшской направляется къ Карпатамъ. Въ Подольской губ.
рябчикъ, повидимому, уже совсімъ не встрфчается.

Что касается распространенія рябчика въ Привислянскомъ краф и Балтійскихъ губерніяхъ, то здѣсь онъ встрѣчается въ довольно большомъ количеств во встхъ большихъ лъсахъ, вообще же распространенъ повсемъстно. Въ губерніяхъ Виленской, Ковенской и Гродненской рябчикъ малочислениве, чвмъ далве въ глубь страны, въ губ. Минской и Могилевской, и даже сравнительно съ Прибалтійскими. Въ Смоленской очень обыкновененъ и водится даже въ борахъ, лишь бы низъ заросъ папоротникомъ, чего не наблюдается въ другихъ мѣстахъ. Но въ больномъ количествъ рябчикъ встръчается только въ обширныхъ елово-лиственныхъ и еловыхъ лъсахъ съверной России. Въ лъсныхъ увздахъ Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской, Вятской и Пермской губ, онъ является самой важной лівеной дичью, которая для тамошияго населенія служить даже большей статьей промысла, нежели глухарь и косачь; въ губерніяхъ же Олонецкой, Вологодской, съверной части Вятской и Пермской и въ большей части Архангельской рябчиковый промыселъ достигаетъ своего напбольшаго значенія и стоитъ выше всъхъ. Обыкновененъ рябчикъ и въ Финляндіп, но какъ предметъ промысла не имфетъ большого значенія. Сфверная граница распространенія рябчика пдетъ такъ: въ Лапландін она поднимается до 69° с. ш., отсюда идетъ по берегу Бѣлаго моря и, ифсколько огибая Мезенскую и Большеземельскую тундры, оканчивается на Уралъ около 67° с. ш. Вообще говоря, съвернымъ предъломъ распространенія рябчика является съверная граница крупнаго лѣса, по крайней мѣрѣ въ Европ. Россіи. Въ Сибири же рябчикъ. кажется, не доходитъ до этой естественной границы, останавливаясь въ нѣкоторомъ разстояній къ югу отъ нея.

За Ураломъ въ предълахъ Пермской губ. рябчика нѣтъ только въ Шадринскомъ у., въ Оренбургской же онъ встръчается только ближе къ Уральскому хребту, въ западныхъ частяхъ Челябинскаго у. Далъе къ востоку и юго-востоку южная граница распространенія рябчика проходитъ черезъ Ншимскій у. Тобольской губ. и отсюда, минуя лъса, разбросанные въ Барабинской степи, направляется къ верховьямъ Оби и Алтаю.

Въ лѣсной области Сибири рябчика нѣтъ въ землѣ Чукчей и въ

Камчаткъ, по опъ еще очень обыкновененъ въ хвойныхъ и лиственныхъ лъсахъ о. Сахалина *).

Какъ видно изъ этого обзора географическаго распространенія рябчика, эта птица населяетъ весьма однообразныя по своему характеру мѣста и потому насъ не удивитъ, что и образъ жизни ея отличается весьма большимъ однообразіемъ на всей обширной занятой ею площади.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общая характеристика птицы.—Весна, т. наз. токованіе рябчиковъ.—Выводъ молодыхъ и лътняя жизнь.—Осень и зима.

Рябчикъ является одинмъ изъ наиболъе характерныхъ представителей л'Еспой фауны: изъ л'Еса опъ не вылетаетъ ни при какихъ условіяхъ и даже въ ліксу живетъ осібдло на очень небольшомъ участків, совершая въ разныя времена года лишь инчтожныя переселенія, и только изрѣдка, въ какихъ-то еще не выясненныхъ обстоятельствахъ, предпринимая болже далекія странствованія. Само собою разумжется, что эта осѣдлость птицы гибельно отражается на ея благополучін: узнавъ, гдф живутъ рябчики, промышленникъ дочиста выбъетъ ихъ здісь на пищикъ и выловить сильями, и нужны долгіе годы, чтобы рябчики, случайно попавъ сюда, опять размножились здѣсь. Коренное мъстожительство рябчика—старые еловые или елово-лиственные лъса; въ юго-западной Россін онъ круглый годъ держится въ старомъ лиственномъ лъсу, вообще же въ лиственные лъса рябчикъ перебирается только на весну и лъто. Кромъ того, надо имъть въ виду, что рябчикъ вовсе не горная птица и выбираетъ для себя или лъса низменностей, или р'ячныхъ долинъ, всегда съ сырымъ низомъ, поросшимъ густою порослью. Поэтому рябчика нельзя назвать собственно "боровою" птицею, т. к. сухихъ сосновыхъ боровъ онъ положительно избъгаетъ и лишь въ видъ исключенія встръчается въ такихъ сосновыхъ борахъ, низъ которыхъ густо покрытъ напоротникомъ (въ Смоленской губ., наприм., по сообщенію В. А. Разевига). Не встр'ячается рябчикъ и на чистыхъ моховыхъ болотахъ, норосшихъ редкимъ сосиякомъ. На съверъ къ ельникамъ, въ качествъ постояпнаго мъстообитанія рябчика, присоединяются еще шихтовники и кедровники, въ южной полосъ средней Россіи (наприм., губ. Орловской) любимое м'ястопребываніе рябчиковъ составляютъ т. наз. "ольхи", т.-е. низкія, сырыя м'ьста, гдів произрастаютъ разныя породы лиственныхъ деревьевъ, какъ-то: ольха, береза, лина, осина, илимъ, ясень, кленъ, дубъ, вязъ, ракита, орЪшникъ, черемуха, рябина, разные ягодные кустарники, каковы калина, круппиа и т. д. и въ небольномъ количествъ также ель. Впрочемъ олешникъ и на сѣверѣ, по крайней мърѣ въ извѣстное время года, составляеть любимое м'ястопребываніе рябчика: зд'ясь онъ находитъ

^{*)} Удивительно, что покойный В. К. Тачановскій, говоря о распространеніи рябчика вообще, упомянуль, что къ югу онъ спускается до Кавказа.

себф обильную пину, здфсь же, благодаря почти пепролазной чандь, застрахованъ отъ преслъдованія враговъ. Такимъ образомъ, по своимъ мъстонахожденіямъ, рябчикъ, съ одной стороны, сходится съ глухаремъ, съ другой—съ обыкновеннымъ косачемъ. По глухарь, какъ мы увидимъ, не избфраетъ сосновыхъ лъсовъ и моховыхъ болотъ, а косачъ забирается въ лиственныя крфин только во время линьки.

Рябчикъ никоимъ образомъ не можетъ назваться общественной птицей, такъ какъ собирается по ифскольку штукъ вмфстф линь въ очень р'адкихъ случаяхъ; обыкновенно онъ держится нарами, отдъльными особями и выводками. Болъе значительныя стайки образуются, когда ифсколько выводковъ соберутся вмфстф, и въ такомъ случаф временно рябцы встрфчаются итукъ по 20-30 вмфстф. Это же опредвляеть собою и тотъ районъ, гдв держится эта итица: небольная лъсная площадь, центромъ для которой является мъсто, гдъ находилось гивадо. Конечно, перелеты, вызванные необходимостью добыть корма, могутъ заставить рябчика удалиться отъ его мѣста жительства временно на болъе или менъе далекое разстояніе, но, какъ было замъчено, большихъ перелетовъ онъ не дълаетъ. Такъ, въ Архангельской и Вологодской губ, рябчики осенью и зимой держатся близъ воды, въ березовыхъ и ольховыхъ лъсахъ, гдъ сначала кормятся ягодами рябины, а потомъ почками; къ весит же, въ мартъ, они оставляють эти мъста и на весь гитадовой періодъ перебираются въ хвоїные л'яса. Перелеты свои рябчики совершають по зарямъ и не сразу, а въ течение пъсколькихъ дней.

Въ средней Россіи такихъ замѣтныхъ перелетовъ рябчикъ не дѣлаетъ, но все-таки обратно тому, что есть на сѣверѣ, весною и лѣтомъ держится въ чернолѣсъѣ и смѣшанномъ лѣсу, въ августѣ перебирается въ ягодники (собственно бруспичники), а позднею осенью— въ краснолѣсье. Въ среднемъ Уралѣ рябчики съ первымъ снѣгомъ перебираются въ березнякъ и олешнякъ, по рѣчкамъ, и тамъ остаются до весны. Уже одно то, что въ разныхъ частяхъ занятой имъ области рябчикъ совершаетъ свои переселенія въ совершенно обратномъ порядкѣ, доказываетъ намъ, что они обусловливаются мѣстными причинами и по всей вѣроятности прямо или косвенно недостаткомъ корма.

Рябчикъ летаетъ сильно и быстро, но не можетъ перелетать большого разстоянія. Вспугнутый онъ взрывается съ шумомъ, "загремитъ", какъ говорятъ промышленники, и спѣшитъ добраться до дерева, гдѣ и садится обыкновенно въ полдерева. Очень рѣдко поднимается рябчикъ выше лѣса и еще рѣже садится на самую вершину дерева. Сѣвъ на горизонтальную вѣтвь ели, рябчикъ такъ затаивается, что замѣтитъ его здѣсь только зоркій глазъ промышленника; если же птица очень напутана, въ такомъ случаѣ она перебѣгаетъ по сучкамъ на другую сторону дерева и, выставивъ оттуда только головку, старается разсмотрѣть причину тревоги. Разъ взлетѣвъ на дерево, рябчикъ долго не слетаетъ съ него, развѣ только будетъ вспугнутъ. Вообще это робкая и осторожная птица, боящаяся шума, и потому подойти

къ ней можно только по сырой почвѣ; нпаче, каждая хрустнувшая вѣтка заставитъ его подняться, и тогда найти его почти невозможно.

Въ нормальныхъ условіяхъ рябчикъ проводить большую часть времени на землѣ, гдѣ движется съ большой быстротой и ловкостью, перебъгая иногда значительныя пространства. На землѣ онъ отыскиваетъ свой кормъ, на землѣ же устранваетъ и свое незатѣйливое гнѣздо. Въ спокойномъ состояніи рябчикъ сидитъ и ходитъ только вытягивая нейку, если же что-нибудь остановило его вниманіе и обезпокоило, въ такомъ случаѣ онъ поднимаетъ голову и весь настораживается. При этомъ самчикъ весь какъ-то выпрямляется, поднимаетъ хохолокъ и принимаетъ очень задорный видъ. Перебѣгая открытые косогоры, рябчикъ бѣжитъ сгорбившись и прижавнись къ землѣ, и очень напоминаетъ собою куропатку. Въ теплую и сухую ногоду рябчики очень любятъ купаться въ пескѣ, подобно тетеревамъ и куропаткамъ, чтобы избавиться отъ наружныхъ паразитовъ.

Пища описываемой птицы очень разнообразна и сильно измъняется по временамъ года. Съ осени и до весны рябчикъ питается растительными веществами, какъ-то: березовыми и ольховыми сережками, почками разныхъ лиственныхъ и хвойныхъ деревьевъ, можжевеловыми и другими ягодами. Почкамъ и игламъ хвойныхъ породъ мясо рябчика и обязано своимъ характернымъ вкусомъ, а вовсе не съменамъ этихъ деревьевъ, какъ многіе ошибочно думаютъ. Вообще же рябчикъ предпочитаетъ всякому другому растительному корму съмена и почки лиственныхъ деревьевъ и можжевеловыя ягоды. Съ весны рябчикъ кормится также, по замъчанию съверныхъ промышленниковъ, листьями кислицы и нъкоторыхъ другихъ растеній. Начиная же съ того времени, какъ выдупятся птенцы, главную пищу рябчиковъ составляетъ животный кормъ, т.-е. насъкомыя и ихъ личинки, улитки и т. п., которыхъ они или обираютъ съ вѣтвей и листьевъ, или достаютъ, разбрасывая ногами листья. Со второй половины лъта, вмъстъ съ поспъваніемъ ягодъ, и молодые рябчики начинаютъ постепенно все болъе и болъе примъшивать растительный кормъ къ животному, употребляя главнымъ образомъ ягоды земляники, черники, костяники и малины въ средней полосъ, черники, морошки, брусники и клюквы на стверт, калины, рябины и бузины повсемтьстио. Для облегченія пищеваренія рябчики заглатывають крупныя песчинки и камешки.

Благодаря характеру занятыхъ имъ мѣстъ, рябчикъ мало истребляется его естественными врагами. Конечно, отъ времени до времени, онъ становится жертвой большихъ совъ, ласки, куницы и т. п., но это не можетъ замѣтно отражаться на уменьшени количества рябчиковъ. Совсѣмъ другое—преслъдованіе со стороны человѣка, какъ это мы увидимъ далѣе.

Теперь, познакомившись съ характеромъ рябчика и его мъстообитаній вообще, перейдемъ къ описанію его образа жизни въ разныя времена года.

Зимній образъ жизни рябчиковъ очень простъ: поседившись

около ручьевъ или въ долинахъ рѣчекъ, они вею зиму держатся здѣсь либо поодиночить, либо парами, либо, наконецъ, небольшими стайками, образовавинимися изъ собравинихся вифстф молодыхъ, чаще одного выводка. Въ поискахъ за кормомъ рябчики передетаютъ изъ одного участка лъса въ другой; если сиъгъ не глубокъ, охотно сиускаются на землю для добыванія изъ-подъ него ягодь брусники, клюквы и т. п., если же, напротивъ, сиъга много, кормятся хвоей и почками лиственных в деревьевъ. Ночують обыкновенно въ гундъ елей, если же очень холодно, то, подобно тетеревамъ, зарываются въ сивтъ. Въ март'в, какъ только сильно начиетъ пригр'явать солице, и но обращеннымъ къ югу склонамъ рфиныхъ долинъ начнутъ появляться проталины, не спарившіеся съ осени рябцы образують пары и переселяются въ чащу, гдф и начинаютъ перекликаться. "Но вотъ пришелъ апръль мъсяцъ *), весна вполить вступаетъ въ свои права и заявляетъ свою могущественную силу. На солицепекахъ ин сибжинки, въ ельникахъ оголились окрапны, и бурливо зашумъли окруженные ледяными накипями горныя рфчки. Ярко палящее солнышко проникаетъ въ каждый глухой отпадокъ и всюду распространяеть свое вліяніе. Оживилась природа, оживилось и пернатое населеніе. Рябчики забрались въ свои любимые ельшики, размъстились по глухимъ отпадкамъ около ключей и весело перенархивають съ ельника въ хребеть, гдв бъгають по косогору, лакомясь подсифжною брусинкою, подбирая несокъ и камешки, — и затъмъ снова улетаютъ въ глубь своего темнаго, мрачнаго жилища. Токъ ихъ въ самомъ разгарф. Съ первымъ проблескомъ утренней зари просыпается задорный самчикъ, съ шумомъ вспархиваетъ на елинку и заводитъ свою звонкую, дискаптовую трель. Въ глубинъ ельника отозвалась рябушка, и этимъ отзывомъ привела въ неистовый восторгъ супруга: онъ стремительно спускается съ дерева на землю и, распустивши вферомъ хвостъ, растоныривъ крылья, приподнявъ хохолокъ и весь какъ бы распушившись, стремглавъ бъжитъ на голосъ самки; не попавши сразу на м'всто свиданія, останавливается и еще разъ пикаетъ, отвътъ послышался ближе и сама рябушка перепорхнула съ мъста на мъсто; тутъ уже самчикъ яростно дълаетъ короткую трель, порывается и летитъ безъ остановки по направленію голоса, встръчаетъ рябушку и съ азартомъ спаривается съ нею; затъмъ оба бъгутъ вмъстъ-съвсть нъсколько ягодокъ брусники, какънибудь разъединятся—самецъ вновь начинаетъ пикать, приходитъ въ прежній азартъ и возобновляются тѣ же супружескія нѣжности. Для разнообразія картины нер'єдко является случайно встр'єтившійся соперникъ, и мирныя сцены нарушаются ожесточенной дракой. Подобное препровождение времени продолжается все утро, послѣ чего рябчики пасутся по косогорамъ или въ самыхъ ельникахъ по мшистымъ кочкамъ, а вечеромъ снова начинаютъ токованіе и занимаются этимъ до глубокихъ сумерекъ".

^{*)} И. Шведовъ. Породы осъдлой и прилетной дичи окрестностей Иркутска.

Само собою разум'вется, что ухаживаніе самца за его собственной самочкой нельзя назвать токованіемъ и, следовательно, у рябчиковъ изтъ тока въ томъ смыслъ, какъ онъ есть у тетеревей. Если подзывающій свою самку или по крайней мірів желающій узнать, гдів она, самчикъ, случайно встрътивъ другого самца, и подерется съ нимъ, и просонить его—это обычное явление для всѣхъ спаривающихся птицъ и къ току не имфетъ шкакого отношенія. Поэтому, виф всякаго сомивнія, представленіе о токів рябчиковъ составилось всявдствіе манеры самчика "пикать", подзывая самку. Выдълываемая имъ трель очень характерна и состоить изъ очень изжныхъ и мелодичныхъ звуковъ, слышныхъ на 50-100 саженъ. Старый и молодой самецъ и самка шкаютъ различно, по объ этомъ подробиће въ главћ, посвященной описанию охоты за рябчикомъ. Здъсь достаточно прибавить къ уже сказанному еще немногое. Самецъ съ самаго начала брачнаго періода держится вблизи самки; поздиве же, когда самка начнеть нестись, самецъ почти не отходить отъ нея и въ это время обращаетъ гораздо менфе винманія на другихъ самцовъ.

Само собою разумвется, что начало брачнаго періода у рябчиковть, въ связи съ общирнымъ распространеніемъ этой птицы, измѣняется по мѣсту очень сильно, въ зависимости отъ времени наступленія весны. Въ средней Россіи брачный періодъ начинается съ конца марта или начала апрѣля и продолжается до половины мая, когда даже запоздавшія самки успѣваютъ отложить яйца. Въ Прибалтійскомъ краѣ гиѣзда съ полными кладками находятъ обыкновенно уже въ кошфѣ апрѣля. Въ Пермскомъ Уралѣ рябушки садятся на гиѣзда не рашѣе начала мая. Въ устройствѣ гиѣзда и высиживаніи самецъ не пришимаетъ участія, хотя держится недалеко отъ гиѣзда. Впрочемъ судя по тому, что опъ въ это время хорошо идетъ на манку, онъ вѣроятно не прочь временно сходиться съ холостыми и, чаще всего, болѣе молодыми самками, пока его собственная дружка сидитъ на яйцахъ.

Устройство гивзда очень просто: самка вырываетъ для него небольшую ямочку подъ кустомъ, деревомъ, валежникомъ, или даже просто во мху и даже гипломъ деревѣ, выстилаетъ ее травинками, листьями, ипогда мелкими прутиками, и незатѣйливая постройка готова. Однако, благодаря именно своей незатѣйливости, гиѣздо рябчика отлично скрыто и найти его можно только съ большимъ трудомъ. Л. П. Сабанѣевъ говоритъ, что на Уралѣ онъ нашелъ всего два раза гиѣздо рябчика, тогда какъ разъ 15 находилъ гиѣзда глухарокъ. Самка кладетъ обыкновенно отъ 6 до 10 янцъ, но болѣе старыя рябушки несутъ даже 14—15, а по словамъ промышленниковъ и до 20. Послѣднее число, впрочемъ, очень соминтельно; не лишено вѣроятія даже и то, что если дѣйствительно были находимы гиѣзда съ такимъ числомъ янцъ, то нослѣднія могли случайно принадлежать двумъ самкамъ. По величниѣ яйца пѣсколько больше голубиныхъ, измѣняясь въ длинѣ отъ 1,7 до 1,65 д. и въ ноперечникѣ отъ 1,17 до 1,15; скорлупа ихъ

гладкая, блестящая, основной цвЪтъ буровато - желтый, иногда совершенно лишенный пестринъ, обыкновенно покрытый ръдкими краснобурыми пятнышками и точками. Самка сидить на гибадів очень крізнко, иногда даже позволяетъ взять себя съ него руками; при видъ неминуемой опасности, однако, незамѣтно сходить съ гитъзда и начинаетъ отводить отъ него, большею частью изыкомъ. Насиживание продолжается около трехъ недаль, и итенцы могуть багать сейчась же посла того какъ матка обсущитъ ихъ подъ крыльями. На другой день она обыкновенно уводить ихъ на св'ятлыя травянистыя лужайки и опунки, гдъ птенцы находять въ изобилни свой первоначальный кормъ: насъкомыхъ и ихъ личинокъ, червячковъ, науковъ, улитокъ и пр. Особенно любять птенчики муравыныя яйца, для чего мать разрываетъ имъ ногами муравыныя кучи. Очень травянистыхъ полянъ рябчики избътають, напротивъ-лъсныя дороги съ ихъ скудной травянистой растительностью и колеями, гдв долго держится дождевая вода, очень охотно посъщаются ими. Главное время кормежки выводковъ-утреннія и вечернія зори, тогда какъ днемъ опи прячутся въ валежникъ или густой поросли, гдв конечно подкармливаются понемногу, но откуда неохотно выходять на чистыя мфста. Относительно участія самца въ воспитании молодыхъ мибнія расходятся. Некоторымъ охотникамъ никогда не удавалось найти при выводкъ самца и потому они ръшительно отрицають какое-бы то ни было его участіе въ жизни выводковъ. Но большинство опредъленно указываютъ, что самецъ присоединяется къ маткъ съ молодыми вскоръ же послъ вывода послъднихъ и раздъляетъ съ нею всф труды и заботы по воспитанію молодыхъ. Сообщаются даже такіе случан, когда саменъ, при гибели самки, всецѣло бралъ на себя заботы объ осиротъвшей семьѣ, подавалъ голосъ какъ самка, подобно ей отводилъ отъ яниъ и т. д.

Первое время по выводѣ птенцы растутъ очень медленно, но даже будучи совсѣмъ крохотными они превосходно прячутся, затанваясь въ ямкахъ, подъ сучьями и т. д., и начинаютъ перепархивать всего нѣсколько дней отъ роду. Трехнедѣльные уже настолько усиѣваютъ окрѣпнуть, что обыкновенно почуютъ на деревьяхъ, находя себѣ здѣсь самое надежное убѣжище. Даже днемъ вспорхнувшій на дерево птенчикъ рябчика до того сливается съ его корой своими пестринами, что неопытнымъ глазомъ ни за что не различить его, развѣ въ бинокль. Мѣсячные птенцы всего съ перепелку, но послѣ этого они растутъ очень быстро и черезъ мѣсяцъ уже становятся ростомъ со стараго, отъ котораго отличаются лишь перьями птенцоваго наряда на головѣ.

Линька молодыхъ во взрослый нарядъ и линька старыхъ идетъ очень быстро. Старые самцы начинаютъ линять въ центральной России въ серединѣ іюля и къ серединѣ сентября перелиниваютъ окончательно, только кой-гдѣ еще остаются не совсѣмъ развившіяся перья. Самки приступаютъ къ линькѣ нѣсколько позднѣе, но въ серединѣ сентября и ихъ линька заканчивается и молодые успѣваютъ надѣть взрослое перо, только у послѣднихъ перья плюсны еще коротки. Къ

октябрю, однако, и послѣднія отрастаютъ настолько, что рябчику не странны становятся даже сплыные морозы.

Достигнувъ приблизительно мъсячнаго возраста, молодые оставляють исключительно животную иншу, прим'яшивая къ ней ягоды, а въ теченіе августа даже совсемъ переходять на растительный кормъ. Вивств съ динькой выводки рябчиковъ разбиваются, и молодые, не нуждаясь въ нокровительствъ старыхъ, начинаютъ вести самостоятельную жизнь, хотя обыкновенно, по своей осъдлости, держатся недалеко одинъ отъ другого и потому тамъ, гдв вы нашли одного, можете съ увъренностью ожидать встрътить и другихъ. По окончаніи линьки, начиная вести болве бродячую жизнь, рябчики опять сходятся другъ съ другомъ и разбиваются на пары. "Въ серединъ сентября, при ясной, хорошей погодь, -- говорить объ этомъ Ф. К. Лоренцъ, -- иногда до двадцати рябчиковъ собираются на какой-либо полянкъ въ лъсу. При этомъ самцы распускають свои хвосты, опускають крылья, приподинмають хохолки и начинають ухаживать за самками, издавая особую трель. Такія собранія продолжаются не долго; какъ только каждый самець выбереть себф самку, сборище расходится, а сошедшіеся въ пары самцы и самки живутъ вмъстъ до весны".

Пока не наступять сильные холода и не выпадеть снъгъ, рябчики не нуждаются въ пищъ и держатся въ одиночку или парочками, такъ какъ далеко не всегда пары образуются съ осени. Когда же начнутся сильные морозы, и глубокій си'ягь покроетъ собою оставшіяся ягоды, рябчикамъ приходится плохо, и они начинаютъ переселяться къ ручьямъ и ръчкамъ, гдъ растетъ ольха и береза. На съверъ это бъдственное для рябчиковъ время наступаетъ уже въ концъ октября, въ средней Россіи не ранъе конца ноября. Какъ обычное слъдствіе безкормицы или, точнъе говоря, сохраненія корма лишь въ опредъленныхъ мъстахъ, наступаетъ стаденіе рябчиковъ и, начиная съ этого времени, ихъ, какъ лътомъ, опять можно встръчать штукъ по 5-10 вмъств. Однако это не продолжается долго: скоро недостатокъ корма заставляетъ разыскивать его энергичиће, и временныя сборища опять расходятся, разбиваясь на пары, которыя и живутъ особнякомъ до весны. Чамъ холодиве и больше сивга, тамъ дальше начинаютъ перелетать рябчики. Этимъ объясияется ихъ появление въ суровыя зимы тамъ, гдъ ихъ вообще пътъ, напр., нодъ Оренбургомъ, этимъ же объясняется и увеличение ихъ численности только тамъ, гдъ они живуть постоянно, папр., въ Московской губ.

Дальнъйшія подробности образа жизни рябчика умъстиве сообщить при описаніи охоты за этой итицей.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Добываніе рябчиковъ.—Ружейная охота съ легавой и лайкой.—Охота съ загонщиками.—Охота на пищикъ.

Самая распространенная и самая характерная охота на рябчиковъ—на пищикъ или на манку—требуетъ такого продолжительнаго навыка и знаийя повадокъ итицы, что доступна лишь немпогимъ охотникамъ изъ тѣхъ, которые привыкли охотиться за болотной дичью съ легавой. Да, пожалуй, большинство изъ нихъ и не оцѣнитъ своеобразной прелести этой охоты, какъ большинство не цѣнитъ охоты за глухарями на току. Но кто не видитъ въ охотѣ одного умѣнья стрѣлятъ подиятую изъ-подъ собаки дичь и не боится утомленія, связаннаго со всякой лѣсной охотой, требующей крайняго вниманія, тому охота за рябчиками на пищикъ доставитъ много удовольствія. О ней однако поздиѣе, а теперь о другихъ, болѣе случайныхъ способахъ охоты съ ружьемъ за рябчиками.

Рябчикъ, вообще говоря, бонтся собаки и потому самому отъ легавой по отношеню къ этой птицъ многаго ждать не приходится. Заслышавъ собаку, онъ не выдерживаетъ ея стойки, а спѣшитъ укрыться въ густыхъ вътвяхъ хвойныхъ деревьевъ, гдъ умфетъ великолъпно прятаться. Если къ этому добавить еще, что рябчикъ держится въ лъсной чащъ, гдъ стръльба въ летъ почти немыслима, само собою станетъ понятно, что обычная охота съ легавой не даетъ въ этомъ случав ничего. Но летомъ, когда выводки еще не разбились, за шими можно охотиться съ собакой: для этого надо выбирать раннее утро, когда выводки кормятся, при чемъ молодые расходятся врозь и могутъ быть подняты поочередно, а не всф сразу. Мфста такихъ кормежекъ подробно описаны выше; теперь упомянемъ лишь, что это вовсе не открытыя мѣста, а либо густой кустарникъ среди высокихъ деревьевъ, либо л'всъ съ буреломомъ. Если собака, наткнувшись на выводокъ, съ самаго начала подниметъ его цъликомъ и птицы усядутся на деревья, охоту надо считать неудавшеюся, такъ какъ вспугнутый выводокъ не скоро спустится на землю. Охота еще можетъ удаться въ такомъ случаъ, если самка помъщается на одномъ деревъ, а дъти на другомъ. Высмотръвъ старку и сваливъ ее, можно перебить большую часть молодыхъ, которые не пугаются выстръловъ и не улетаютъ, а лишь затаиваются въ густыхъ вфтвяхъ. Вся трудность только въ томъ, чтобы высмотръть молодыхъ, которые прячутся превосходно.

Въ другомъ родъ охота съ лайкой, которая употребляется нашими съверными промышленниками для охоты за тетеревами, глухарями и бълками. Такія собаки пріучены находить птицу или звърька и, найдя добычу, голосомъ давать объ этомъ знать хозяину, въ то же самое время привлекая на себя ея вниманіе, чтобы удержать до прихода охотника. Глухарь, тетеревъ и бълка не боятся собаки и, видя

ее лающей подъ деревомъ или скребущей дерево, съ большимъ интересомъ слъдятъ за всъми ея движеніями, не обращая вниманія на подходящаго охотника. Съ рябчикомъ дѣло обстоитъ иначе, потому что вообще эта птица боится шума и въ частности собачьяго лая. Поэтому, чтобы съ успъхомъ охотиться съ лайкой на рябчиковъ, ее надо пріучить лишь слабо подать голосъ, когда рябчикъ найденъ, и потомъ не обращать на себя его випманія. Говорять, что есть такъ хорошо натасканныя собаки, что, выследивъ рябчика и подавъ голосъ, оне не бросаются къ дереву, не лаютъ громко, а либо ложатся, либо начинаютъ кататься на землъ. Понятно, что при такой охотъ рябчика приходится бить сидячаго. Г. Прокудинъ-Горскій говоритъ, какъ очевидецъ, что вспугнутый лайкой рябчикъ ведетъ себя какъ тетеревъ: "онъ, наклонивъ свою голову, съ удивленіемъ смотритъ съ высоты дерева на докучливую подлайку, которая опершись передними лапами на древесный стволъ того дерева, гдф онъ засълъ, надрывается лаемъ. Какъ будто бы поддразнивая ее, онъ хорохорится, чичикаетъ, бъгаетъ по сучьямъ, растопыриваетъ крылышки и распускаетъ свой красивый хвость въеромъ до тъхъ поръ, пока губительный свинецъ не опустить его на земь". Все это безъ сомнънія относится только къ такимъ старымъ рябчикамъ, которые озабочены тѣмъ, чтобы отвести собаку отъ дътей, почему и приманивають ее къ себъ, и совершенно пеприложимо къ рябчикамъ вообще.

Охота съ загонщиками производится только въ западныхъ и югозападныхъ губерніяхъ и, по справедливому замѣчанію Л. П. Сабанѣева, безъ сомнѣнія была вызвана, съ одной стороны, частыми облавами на звѣрей, которыя очень распространены въ названномъ краѣ, съ другой— неудачами этихъ охотъ и желаніемъ поживиться хотя пернатою дичью.

Производится эта охота, какъ и всъ облавы, весьма простымъ способомъ. Охотники отправляются въ лѣсъ, гдѣ есть рябчики, беря съ собою человъкъ 10--15 мальчиковъ. Охотники становятся въ линію, гдів и какъ угодно, смотря по мівстности, а мальчиковъ ставятъ отъ себя на разстоянін, приблизительно, одной десятины. Вся обязанность последнихъ состоить въ томъ, чтобы идти на липію охотниковъ и, носвистывая, изр'яжа ударять палкою по деревьямъ. Отъ такого шума рябчики не пугаются и не летятъ какъ сумасшедине, а большею частію перелетають съ дерева на дерево до тъхъ поръ, пока не наткнутся на линію стрълковъ, гдѣ шумъ, производимый ими при полетѣ, выдаетъ ихъ охотшику. Конечно, бываетъ, что испуганный рябчикъ несется черезълнию стрълковъ, по это только усугубляетъ удовольствіе охоты, давая возможность стрѣлять въ леть. Къ тому же стрѣльба рябчиковъ въ лѣсу въ летъ требуетъ большого навыка и ловкости и легко можетъ статься, что охотинкъ, выпустивъ съ десятокъ зарядовъ, не убьеть ин одной итицы. Вообще же охота съ загонщиками добычлива и зашимательна тъмъ, что чрезвычайно оживлена: едва пачнетъ раздаваться стукъ, со всѣхъ сторопъ послышатся выстрѣлы. Кромѣ того.

какъ и при всякой охоть съ загонщиками, можетъ выпасть такой случай, что на линію выйдетъ совсьмъ неожиданная добыча: зайцы, лисицы, даже волки и козы.—Когда мальчики дойдуть до линіи охотниковъ, то останавливаются, а стрълки занимають слъдующую десятину, и такъ можетъ быть повторено изсколько разъ.

Въ средней Россіи такая охота на рябчиковъ съ загонщиками совершенно не практикуется, хотя по м'ястнымъ условіямъ внолив возможна. Весьма въроятно, что у многихъ явится даже недовърје къ осуществимости этого способа добыванія итицы; по главною причиною тому конечно явится охотинчья коспость, тормозящая всякое начинаніе. Къ тому же большинство охотниковъ не считаетъ рябчика за дичь, хотя очень немногіе между шими могуть похвастаться тізмъ, что какимъ бы то ни было способомъ успъпно охотились за этой птичкой. А между тъмъ, этой охотъ надо бы привиться именно тамъ, гдъ существують охотинчы кружки и общества, и гдв, само-собою разум'вется, не всегда же охота съ загонщиками можетъ производиться по красному звърю. Ифкоторая разръженность лфсовъ и разбивка большихъ лъсныхъ илощадей на отдъльные, хотя и крупные участки, также только благопріятствуєть этому способу охоты, такъ какъ въ шихъ легче идти загонишкамъ и легче поддерживать линю стръдковъ. Наконецъ, практика охотниковъ Вольшской, Черниговской и другихъ западныхъ губерній дучие всего доказываеть и осуществимость и успѣшность этого рода охоты.

Какъ выше замѣчено, напоолѣе характерная охота на рябчиковъ— охота съ пищикомъ, основанная на подражанін голосу рябчика посредствомъ небольшой дудочки, пищика, сдѣлашнаго изъ разныхъ матеріаловъ, а то такъ и просто ртомъ. Рябчикъ, отзываясь на пищикъ, подлетаетъ или подбъгаетъ къ охотнику часто на очень близкое разстояніе и такимъ образомъ дѣлается его добычей.

Г. Александровъ недавно такъ хорошо описалъ эту охоту, что я сначала приведу большую часть его очерка и уже потомъ сдълаю къ нему разныя добавленія.

"Для успѣшной охоты на рябчиковъ, говоритъ г. Александровъ, необходимо знать: 1) качество лѣса, гдѣ любитъ держаться рябчикъ, или, какъ здѣсь (въ Ярославской губ.) говорятъ, рябиныя мѣста; 2) время года и часы дня, когда онъ бойко идетъ на пискъ; 3) погоду и, наконецъ, обладать хорошими пищиками.

"По большей части излюбленными мѣстами для рябчиковъ служатъ лѣсные рѣчки, ручейки, родники, ключи и овраги, сплошь заросшіе смѣшаннымъ лѣсомъ изъ ели, осины, березы, ольхи съ кое-гдѣ разбросанными кустами волчатника и рябины. Въ общемъ—мѣстечки всегда уютныя, живописныя. Съ вывода и почти до Успеньева дня молодые рябчики находятся при маткѣ и держатся въ такихъ лѣсныхъ трущобахъ, куда далеко не всегда удается и проникнуть. Въ это время хотя рябчикъ и мелокъ, но идетъ на пискъ чудесно и при томъ всегда землею, "пѣшкомъ", цѣлымъ выводкомъ, голова въ голову. Но такъ

какъ это время совпадаетъ съ разгаромъ крестьянскихъ работъ, то охоты за нимъ не производится, да и цізнность мелкаго рябчика значительно падаетъ. Съ Успеньева же дня выводки рябчиковъ разсыпаются, переселяются на мелкіе ручын и рѣчки и держатся въ вышеуказанныхъ мізстахъ. Такъ какъ рябчикъ большую часть своей жизни проводить на земль, отыскивая кормь, жируя, то и льса выбираеть чистые, безъ подсъда, травы и древеснаго лому. Лътомъ въ чистыхъ еловыхъ, сосновыхъ и осиновыхъ лѣсахъ рябчикъ почти никогда не держится, разв'в только буря и дождь загоняютъ его въ л'всную глушь, когда онъ обыкновенно сбивается на зиму, собираясь въ стан по 30 и болъе особей. Отыскивать рябчика такъ же, какъ и тетерева, надо непрем'янно возл'я старыхъ заросшихъ л'ясныхъ дорогъ, тропъ или просѣкъ, по коимъ, досыта нажировавшись и отдохнувъ, онъ очень любить бъгать, что бываеть обыкновенно часа за два, за три до заката солнца "). По времени года, рябчикъ начинаетъ идти на пискъ, прим'врно, съ Успеньева дня, но сначала не охотно, ибо присутствіе матки при выводкъ значительно портитъ охоту. Настоящая же охота на пищикъ начинается съ Рождества Богородицы, когда выводки разбиваются на пары, и идетъ безъ перерыва вилоть до самой зимы. По временамъ дня, охота на рябчиковъ начинается стемна, съ зари и до 11—12 часовъ дня; затъмъ слѣдуетъ, примърно, двухчасовой перерывъ, въ теченіе коего рябчики парами сидятъ гдівнибудь возлів дороги или вырубки и отдыхаютъ. Въ это время рябчикъ, находясь возлѣ самки, совершенно не откликается на пискъ. Съ часу или двухъ дня они опять принимаются за кормежку, разбиваются по лѣсу и охотно идутъ на пискъ до самыхъ сумерекъ. Все это, разумъется, бываетъ умъстно при условін благопріятной погоды. Посл'ядняя им'я тромадное вліяніе на рябиную охоту. Лучшею погодою для этой охоты надо считать ясные, тихіе, слегка прохладные дип, копми бываетъ богата вторая половина сентября. Иногда въ начал в октября, посл в листопада, вынадаютъ чудные, тихіе, туманные дни съ легкой изморозью; въ такую погоду рябчики, ножировавъ, разлетаются и разсаживаются по высокому осиннику и безъ перерыва перекликаются, чъмъ и открываютъ свое присутствіе охотнику, давая ему возможность бить ихъ съ подхода на узерку, въ теченіе ифсколькихъ часовъ. Въ грозы и вообще въ ненастную дождливую погоду рябчики перебираются въ густой ельникъ, и хотя идутъ на манокъ, но всегда землею, не дълая ни одного перелета, въроятно изъ боязии замочиться. Но вътряную погоду надо считать самой неблагопріятной для рябиной охоты: въ лъсу поднимается такой шумъ, что ни писку, ни взлета рябчика бываетъ не слышно, идетъ на манокъ опъ всегда почти изшкомъ и всегда усвъваетъ ранъе увидъть охотника, нежели последній замътить его. Жара и холодъ, повидимому, особеннаго вліянія на ходъ рябчика не им'вютъ.

^{*) &}quot;О присутствіи рябчиковъ можно судить по грудкамъ помета его, которымъ обыкновенно бываютъ покрыты старые пни, буреломины и лъсныя поляны".

"Затъмъ, помимо знанія рябиныхъ мъсть и времени охоты, для успъха послъдней необходимо обладать хороними пинциками, которые бываютъ различныхъ сортовъ, какъ-то: оловянные, жестяные, м'ядные, изъ гусинаго пера, костей зайда и домашней крупной итицы, точеные изъ кости, и, наконецъ, изъ цѣликомъ сиятой коры молодыхъ побѣговъ ивы и ели. Испробовавъ на практикъ всъ вышеозначенные сорта пишиковъ, я пришелъ къ заключенію, что лучиним изъ нихъ по силъ звука и тону-точеные изъ кости. Разумфется, купить хорошій нищикъ, инкогда не слыхавъ голоса рябчика, довольно трудно, тъмъ болбе, что въ продажб попадается и много пегодныхъ для охоты. Самое лучшее—это попросить кого-нибудь изъ охотниковъ выбрать. При аккуратной поскѣ (въ чехликѣ изъ замии) и бережливости хорошій пищикъ можетъ прослужить десятки летъ. Пищикъ крестьянъ-преимущественно все самодѣлки изъ заячьихъ костей, хотя послѣднее время приходилось встрачать и покупные. Нать сомнанія, что и опи начинаютъ отдавать предпочтеніе покупнымъ передъ своими грубыми самолфлками.

"Вооружившись парой отличныхъ пищиковъ, охотинку остается теперь самое главное — это выучиться пищать по-рябиному. Не знаю, откуда и почему, по у многихъ охотниковъ сложилось такое мнъніе, что нътъ проще занятія подманивать рябчиковъ и бить ихъ десятками. Но я склоненъ думать, что любому изъ этихъ охотниковъ съ хорошими пищиками и въ хоропшхъ рябиныхъ мъстахъ не подманить ни единаго рябчика и не убить. На практик оно такъ и выходить: охота за рябчиками куда какъ проста, а быотъ ихъ изкоторые. Затамъ изкоторые интеллигентные охотники категорически изрекаютъ, что рябчикъ-де глупъ, – какъ ни пискни, все летитъ къ тебъ, – поэтому обзаводятся какимъ-нибудь однимъ инщикомъ, не различая, годенъ ли онъ для самца или самки. Въ дъйствительности же подманить рябчика довольно трудно, —приходится имфть два рода пищиковъ, —самочы и самцовые, пбо манера пищать ихъ совершенно различна. Пискъ самки-короткій, слабый, всего въ три тона, отрывистый и безъ трели. На бумагѣ его можно передать следующими буквами: "ти-у-и". Средній слогъ "у" тянется дольше двухъ крайнихъ. Голосъ самца изобразится такъ: "тити-ти-тить-ти, ти-ти-ти-тіу". Здѣсь первые два слога "ти" надо тянуть долго, а затъмъ прочіе-трелью, отрывая каждый слогъ, кромъ послъдняго *). Выучиться хорошо пищать — наука довольно трудная, требу-

^{*)} Л. П. Сабанѣевъ говоритъ, что свистъ самцовъ состоитъ изъ пяти нѣжныхъ и звучныхъ нотъ: двухъ протяжныхъ, высокихъ и трехъ укороченныхъ, пониже—въ видъ трели; все колѣно онъ выражаетъ такъ: "т...т, т, ии, ти-ти-ти". По Прокудину-Горскому рябчиковый свистъ можно передатъ такъ: "тю-ті-ю", съ разстановкой или протяжно, потомъ отрывисто "тютъ" и, наконецъ, скоро и часто, какъ трель, "ти-ти-ти". Шведовъ выражаетъ отзывъ рябчика какъ "тіи, ти-тирири-ти-ти", при чемъ первая нота нѣсколько протяжна, въ серединѣ повышающаяся, вторая короче и ниже ея, третъя съ удареніемъ на послѣднемъ "ри", четвертыя ноты короткія и съ одинаковымъ удареніемъ на оба "ти". Всѣ эти передачи болѣе или менѣе удачны, но кто не слыхалъ писка рябчика, тотъ по нимъ все-таки не составитъ себѣ о немъ яснаго представленія.

ющая отъ охотника тонкаго слуха, теривнія и вниманія. Конечно, лучше всего учиться шищать на практикъ, т.-е. на охотъ въ лъсу, съ къмънибудь изъ опытныхъ охотниковъ или промышленниковъ, на самихъ рябчикахъ. Вообще это искусство дается только годами упорной работы пищикомъ, хотя бываютъ и исключенія. Я, напр., учился пищать у г. Аверкіева (изв'ястный рыбинскій спеціалисть охоты на рябчиковъ), сопровождая его на рябиныхъ охотахъ. Несмотря на сравнительно хорошій слухъ, поливишее желаніе, отличнаго ментора, вълиць А-ва, и проч. благопріятныя условія, только на третій годъ я выучился владъть хорошо пищикомъ и началъ бить подманенныхъ мною рябчиковъ. А сколько за эти три года пришлось испортить крови, сколько испорчено было полей, благодаря отвратительному писку! По крайней мъръ, сотни три рябчиковъ распугалъ я за это время, изъ коихъ съ грѣхомъ пополамъ удалось взять всего какой-нибудь десятокъ, да и то болѣе на узерку или шумовыхъ. Вотъ поэтому-то, испытавъ много злоключеній на этой охотъ и мало-по-малу ознакомившись съ нею, я не могу сказать, что она очень проста и прибыльна.

"Самая же охота производится следующимъ образомъ. Осень, чуть-чуть забрезжила зорька на небф, отправляещься въ хорошо извъстныя рябиныя мъста, безъ собаки, которой рябчикъ страшно пугается и отъ которой далеко улетаетъ, придерживаясь старыхъ лъсныхъ дорогъ или тропъ. Идень тихо, шагъ за шагомъ, изръдка попискивая самкой и чутко прислушиваясь, нѣтъ ли взлета. Если съ вами есть неопытный, не ум'ьющій манить товарищъ, то ему всего лучше держаться вплотную за вами, быть вашей тынью: меньше шуму и помыхи. Въ противномъ случаћ надо держаться другъ отъ друга шаговъ на 300-400, уйти со слуха. Ходить надо неторопливо, и какъ можно меньше шуршать ногами: рябчикъ не столько боится человъка, сколько шелесту и чавканья подъ ногами, отъ коего онъ далеко, виб слуха, вспархиваетъ и таптся. Не пройдень и 200 шаговъ, какъ вправо, шагахъ въ 70-80, раздается характерное хлопанье крыльевъ: то рябчикъ вспорхиулъ на дерево, заслышавъ ваши шаги. Вамъ его не видно, вы останавливаетесь, прислушиваетесь, отыскивая глазами подходящее м'єсто, гді бы зас'єсть: елочку, сосенку или какой-инбудь кустикъ, откуда вамъ было бы удобно наблюдать за перелетами. Затъмъ даете первый свистокъ. Если рябчикъ одинъ, безъ самки, то сейчасъ же отзывается. Въ такомъ случаћ вамъ остается засъсть на избранное мъстечко, лицомъ къ птицъ, дать 5—6 минутную выдержку (выкурить неторонливо напиросу) и дать второй инскъ. Рябчикъ сдълаетъ прилеть въ вашу сторону и отзовется. При этомъ, отвъчая на его пискъ, лучше дать ему пискнуть два-три раза, а ему въ отвътъ одинъ разъ; это его сильнъе раззадориваеть и заставляеть быстръе перелетать. Дълая перелетъ за перелетомъ, рябчикъ въ концѣ-концовъ подлетаетъ къ вамъ на 20—25 шаговъ и усаживается, весь на виду. Вы стръляете. Такъ иногда удается подманить сразу 3-4 рябчиковъ и постепенно убить. Начинать пищать надо всегда самкой (нбо самцы попадаются

чаще), и послѣ перваго отзыва вы уже знаете, кто вамъ откликаетея— самка или самецъ. Сидѣть въ прикрытін надо тихо, безъ шевеленій, и ружье держать на изготовку.

"Если, заслышавши шумъ рябчика, опъ не откликается на второй зовъ, то это значитъ, что рябчикъ или нутаный (стрълянъ), или возлъ него самка. Бываеть такъ: вспархиваеть рябчикъ и садится передъ вами; поиятно, бъешь на узерку. Но пногда изъ-подъ ногъ рябчикъ бросается въ чащу; тогда надо, осторожно ступая, дать небольнюй кругъ, дѣлая видъ, какъ-будто удаляенься отъ него, затѣмъ зайти съ противоноложной стороны и уствинсь подъ деревомъ, послъ выдержки, подавать голосъ. Иногда рябчикъ, подлетая и яро отзываясь, вдругъ замолчить и пропадеть: это значить, что онь замѣтиль самку, соединился еъ нею и далеко ушелъ ившкомъ. Въ этомъ случав приходится, отыскавъ ихъ, нарочно разганивать въ разныя стороны, а затъмъ уже машить. Вообще разгонять приходится всегда, когда стопишь пару рябчиковъ или цѣлый выводокъ; манить всегда начинаешь самкой. Усаживаться для манки отподь не сл'ядуетъ въ густыхъ заросляхъ или молоднякъ: тогда невидно и красивыхъ перелетовъ его, которые пріятно волнують, а главное-рябчикъ усаживается въ 5-7 шагахъ отъ охотника и можетъ быть разбитъ выстръломъ вдребезги. Засъвши же на рѣдникѣ, всегда бъешь въ 30—40 шагахъ. Рѣдкій изъ охотниковъ не соблазнится, спутнувъ изъ-подъ погъ рябчика поохотиться на него на узерку. Но при этомъ надо знать, какъ и куда садится поднятый рябчикъ. Спутнутый въ нервый разъ, рябчикъ всегда садится гдф попало, но на виду охотника: будучи очень любопытнымъ, онъ заинтересовывается причиной безнокойства и, прыгая по въткъ, разсматриваетъ охотника. Убить его тутъ не составляетъ никакого труда. Спугнутый во второй разъ садится въ вершину, для чего столбомъ поднимается вверхъ и расправивъ крылья, опускается плавно въ вершину Туть уже только опытный глазъ можетъ усмотръть его, да и то къ концу осени, когда деревья на чисто освобождаются отъ листвы, въ противномъ случат можно, по ошибкъ, отпустить сколько угодно пуделей. Наконецъ, въ третій разъ рябчикъ уже не подпускаетъ близко охотника и бросается преимущественно въ елку, къ самому стволу, притомъ такъ ловко прячется, растягиваясь по въткъ или прижимаясь къ дереву, что даже и опытный промышленникъ не сразу сумфетъ его зам'єтить. Следуя сов'єту г. Аверкіева, на охоту на узерку я вооружался сильнымъ биноклемъ, съ помощью котораго значительно легче разглядывать затапвшагося рябчика. Не имѣя же навыка, можно цѣлый часъ продежурить подъ деревомъ и уйти ни съ чѣмъ. Не досадно ли бываетъ бросать птицу, которая находится отъ васъ всего въ какихънибудь 10—12 шагахъ. Послъ же третьяго раза рябчикъ дълаетъ большіе перелеты и садится чаще всего по вершинамъ. Помимо того, при хорошемъ слухъ и вниманіи, можно даже точно опредълить породу дерева, на которое сълъ рябчикъ. Къ сожальнію, до сихъ поръя еще не постигъ этого искусства, но здѣсь есть охотники-промышленники,

которые безопибочно опредъляють, на что съль рябчикъ: на березу, ель или сосну. Опредъленіе идеть по тому звуку, который производить рябчикъ, садясь на дерево. Такъ, напр., при посадкѣ на березу слынится характерный трескъ, на ель — шумъ отъ качающихся вътокъ, и, наконецъ, на сосну—гулъ. Безъ сомивнія, это дается многольтнимъ опытомъ.

"Затъмъ, чтобъ обмануть охотника, рябчикъ иногда, съвиш на дерево, иъкоторое время хлопаетъ крыльями, производя такой шумъ, какъ будто опъ продолжаетъ дальне летътъ. Кромѣ того, будучи подраненъ на деревѣ, онъ рѣдко когда падаетъ на землю, чаще же, въ особенности на ели или соснѣ, такъ илотно западаетъ, что иногда тутъ и остается, тѣмъ болѣе, что охотникъ не всегда увѣренъ въ правильности сдѣланнаго выстрѣла.

"Охота на узерку бываетъ добычлива во второй половинъ августа и началь сентября, когда рябчикъ въ выводкъ; молодые всегда разсаживаются на глазахъ у охотника, давая ему возможность убить 2—3 штуки съ подхода. Охота же съ пищикомъ по выводкамъ производится такъ же, какъ и по разогнанной парѣ рябчиковъ; иногда, впрочемъ, молодые на голосъ матки бъгутъ гуськомъ и тогда 3-4 штуки можно бываетъ положить однимъ выстреломъ, а затемъ по-одиночке, на пискъ. При этомъ долженъ замътить, что садиться пищать надо по возможности около того самаго мъста, откуда былъ поднятъ выводокъ; это, впрочемъ, приходится продълывать въ большинствъ случаевъ, ибо рябчикъ всегда охотиће возвращается туда, гдф онъ жировалъ, вфроятно въ надеждъ найти самку. Не разъ случается, что рябчикъ, подлетая къ охотнику на пискъ, ошибается слухомъ и нѣсколько разъ перепархиваетъ охотника. Безпокопться этимъ нечего: на следующій разъ онъ вернется и всегда можетъ быть усаженъ тамъ, гдв того желаетъ охотникъ. Рябчикъ вообще обладаетъ изумительнымъ слухомъ, и охотнику, плохо владъющему нищикомъ, едва ли когда удастся провести его. Сдълавъ два-три перелета, прислушавшись, рябчикъ живо отличитъ фальшивый пискъ и, неслышно спустившись на землю, далеко уходитъ пъшкомъ. Послъ промаха, каковые всегда возможны, рябчикъ обыкновенно далеко не улетаетъ, но машить его въ такомъ случаћ надо, по крайней мъръ, черезъ полчаса, а лучне нока оставить въ покоф и идти искать следующаго. Такимъ образомъ, бродя по лесу, охотникъ незамътно коротаетъ время до полудия. Затъмъ въ двухтрехчасовой перерывъ охоты охотникъ имъетъ возможность основательно отдохнуть и нодкрѣпить свои силы. Съ 1—2 часовъ дня можно онять приниматься манить. Теперь уже ходить надо еще остороживе и притомъ лъсными дорогами: весь рябчись послъ отдыха держится на этихъ дорогахъ, бъгая за маткой и отыскивая червяковъ. Вечернее поле инчъмъ не разнится отъ утренняго, только садиться манить надо возать дорогъ и тронъ. Вечерняя охота дангся до наступленія полныхъ сумерекъ.

"Говоря о перелетахъ рябчика, я забылъ добавить, что идя на

нискъ, онъ всегда садится въ полдерева и на виду, притомъ нерепрыгиваетъ по въткъ, чутко прислушиваясь. Въ такомъ возбужденномъ состояни рябчикъ отъ взъерошеннаго пера кажется очень большимъ, почти съ тетерку, почему, илохо взявши его на мушку, легко сдълать промахъ, да и на близкой дистанціи зарядъ дроби пдетъ кучей.

"О добычливости этой охоты можно сказать следующее: при основательномъ знаніи рябиной охоты и уменьи отлично манить, за день охоты легко взять отъ 6 до 12 шт., конечно, въ зависимости отъ рябиныхъ месть. По словамъ искоторыхъ спеціалистовъ-промышлевниковъ, иногда, подмашвая рябчика, можно убить бълку или кушицу, которыя тоже идутъ на рябиный шискъ, въ надежде полакомиться дичинкой. Но такіе случан надо отнести къ категорін выдающихся.

"Описанные мною пріемы охоты бывають ум'єстны и дають положительные результаты только при условін благопріятної, тихої погоды. Въ дождливую, в'єтряную и вообще въ ненастную погоду, когда на шискъ рябчикъ пдетъ землею, п'єшкомъ, — процессъ охоты н'єсколько изм'єняется. Неудобства л'єсної охоты въ дождливую пору очевидны: помимо влаги сверху, каждый кустъ окачиваетъ васъ, какъ изъ ведра, и высокіе саноги не спасають васъ отъ намокшей травы. Но нер'єдко педостатокъ свободнаго времени заставляетъ васъ въ непогодь отправляться въ л'єсъ, въ особенности, если вы забрались куда-шобудь подальше, въ отъ'єздъ.

"Въ дурную погоду, въ особенности въ дождь, рябчиковъ надо отыскивать хотя и по тімъ же мізстамъ, по псключительно въ чащахъ ельника и сосняка, гдъ они спасаются отъ сырости: здъсь даже и въ большой дождь всегда суше, чемъ въ смешанномъ чернолесын. Согнавъ рябчика даже изъ-подъ ногъ, охотиться на узерку уже не удастся, нбо въ такую погоду онъ бросается на ель или сосну въ полдерева, прячется и не выказываетъ ни малъйшаго желанія къ перелетамъ. Тогда приходится, сдълавъ демонстративный кругъ, избрать мъсто и манить; при этомъ садиться надо такъ, чтобы отозвавшийся или взлетъвшій рябчикъ былъ сзади охотника: этотъ маневръ необходимъ въ виду того, что рябчикъ подходитъ пъшкомъ всегда съ противоположной стороны, откуда слышалъ онъ ваши шаги или пискъ. Кромѣ того и м'всто укрытія охотника должно удовлетворять удобству осмотра всего подножнаго ландшафта, чтобъ заблаговременно замътить и вовремя ударить по бъгущему рябчику. Допускать близко къ себъ его не следуетъ, ибо онъ заметитъ охотника и съ характернымъ чириканьемъ улетитъ. Бъгаетъ по землъ рябчикъ очень проворно, а идя на пискъ, часто останавливается и, вытянувъ шейку, наслушиваетъ: это бываетъ весьма удобный моментъ для выстръда. Весьма ръдко рябчикъ идетъ прямо на пискъ, откуда его согнали, не сдълавъ предварительнаго круга. Нечего и говорить, насколько трудна охота на рябчика по пъшему ходу: тутъ надо и ловко състь, и зорко смотрѣть, и во-время ударить по юркой птичкъ. Въ особенности плохо рябчики идутъ послѣ тихихъ ночныхъ дождей, когда весь лѣсъ на утро бываетъ покрытъ милліонами капель влаги; пока пе обдуетъ в'втеръ, охоту нечего и начинать.

"Объ охотъ въ октябрьскіе туманные съ изморозью дни я уже говорилъ выше. Въ такую погоду рябчика легко бить и на узерку, да и на манокъ онъ идетъ бойко.

"Такъ идетъ рябиная охота до самой зимы, съ наступленіемъ которой рябчики откочевываютъ въ глухіе лѣсные уголки, сбиваются въ стан и такъ проводять всю зиму до мартовскихъ пригрѣвовъ. Охота по первозимью, до выпаденія глубокаго сиѣга, производится въ томъ же порядкѣ, что и осенью, съ тою лишь разницей, что отыскать стаю бываетъ гораздо трудиѣе, нежели одиночныхъ рябчиковъ, но зато, наткнувшись на таковую, пногда удается за одинъ день взять десятка полтора рябчиковъ, конечно, при благопріятной погодѣ".

Въ этомъ прекрасномъ очеркѣ такъ сказать техническая сторона охоты описана настолько полно, что дѣлать къ нему еще какія-либо добавленія въ этомъ направленіи, пожалуї, только портить уже сказанное. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ говорится только объ осенней собственно охотѣ, тогда какъ на рябчиковъ охотятся съ шищикомъ также весною и вотъ объ этої-то весенней охотѣ надо сказать особо.

Весною охота начинается съ того времени, когда рябчики покидаютъ свои зимийя мъстопребывания— чащи ельника и олешнякъ по берегамъ ручьевъ и ръчекъ, и вмъстъ съ первыми лучами весенняго солнца переселяются на болъе высокія и открытыя мъста, на южные склоны косогоровъ и уваловъ, поблизости ключей, гдъ много бурелома или гдъ есть густой подсъдъ. Въ зависимости отъ количества рябчиковъ ихъ пары часто селятся очень близко другъ отъ друга, въ разстояніи всего какой-нибудь сотни шаговъ.

Следовательно, въ зависимости отъ географическаго положенія мъста и времени паступленія весны, весенняя охота на пищикъ начинается въ мартъ или апрълъ и оканчивается ближе къ южной границь распространенія птицы пногда уже въ анръль, тогда какъ на стверт можетъ затянуться до начала іюня. Точите продолжительность ея можно опредфанть такъ: начинается охота, когда рябчики разобьются на пары, оканчивается вскорт послт того, какъ самки сядутъ на яйца. Практикуемая иткоторыми охота еще по насту, на лыжахъ, мало занятна, потому что при этомъ трудно избъжать шуму, который пугаетъ рябчика, да последній еще и самъ по себе идеть илохо на пищикъ. Но когда сиътъ почти стаетъ, наступятъ даже теплыя весеннія почи, безъ заморозковъ, такъ что по пасту можно ходить почти безнумно, и рябчики идутъ на пищикъ превосходно. Л. П. Сабанъевъ говорить, однако, что самый лучшій весенній ходь на манку бываеть немедленно послъ того, какъ самки сядутъ на яйца, именно въ центральной Россіи— за недълю, за десять дней до цвѣтенія черемухи (середина мая). Идутъ собственно самцы, почему и манить надо голосомъ самки, и идутъ такъ "зарко", что повторно подходятъ на пищикъ даже послъ 1—2 неудачныхъ выстръловъ. Однако много зависить оть того, какая была зима: по наблюденіямъ Кирѣевскаго, самый лучшій и жаркій ходъ бываетъ послѣ продолжительной и постоянной, безъ оттепелей, зимы и сильныхъ морозовъ, и при дружной, теплой веснѣ съ обильными дождями.

Охоту надо начинать очень рано — съ восхода солица, и можно продолжать ее часовъ до 9-10; зат'ямъ п'ясколько часовъ перерыва и около трехъ часовъ охоты передъ закатомъ солица. Въ середниъ дня рябчикъ илохо отзывается, главнымъ образомъ потому, что въ это время съ нимъ держится его самка, съ которой они вмѣстѣ кормятся. Утромъ же и вечеромъ самчикъ въ больнюмъ азартъ, озабоченный темъ, какъ бы не пустить въ свои владения другихъ самцовъ, занять также преслъдованіемь самки, которая болье помышляеть о своихъ семейныхъ обязанностяхъ, нежели о немъ, и идетъ на манку превосходно. Само собою разумъется, что состояніе погоды также очень важно для усившной охоты: если утро ясное и теплое, да п земля влажна отъ почного дождя, охота бываетъ очень удачна; въ пасмурный день рябчикъ идетъ хуже, по зато цізый день; при дождів и вътръ охота инчего не стоитъ. Не говоря уже о томъ, что рябчика не слышно, не слышно даже его перваго шумпаго взлета, онъ и отзывается неохотно, предпочитая тапться въ чащѣ, да и плохо слышитъ пищикъ. Нъкоторые совътуютъ манить рябчика въ такомъ случат въ болье громкій металическій пищикъ, по это мало обезпечиваеть усиѣхъ охоты.

Теперь о самой манкѣ. Охотинкъ обязательно долженъ умѣть манить самцомъ и самкой, такъ какъ въ зависимости отъ того, на кого манить въ разное время весны, зависитъ и успѣхъ охоты. Съ самаго начала весны, когда еще далеко не всѣ самцы спарились, манить надо самкой, тѣмъ болѣе, что на такой манокъ идутъ даже и спарившіеся самцы, но неуспѣвшіе привязаться къ своимъ подругамъ. Позднѣе же, въ самый разгаръ брачной поры, рябчики охотиѣе идутъ на манку самцомъ, такъ какъ очевидно у нихъ тогда преобладаетъ надъ другими стремленіями драчливость. Въ самый конецъ весенней охоты обстоятельства опять измѣняются и рябчикъ идетъ приблизительно одинаково хорошо какъ на манку самцомъ, такъ и самкой, что конечно объясняется тѣмъ, что самка удѣляетъ ему отъ ящцъ очень мало времени.

Приведемъ теперь описаніе весенней охоты на рябковъ, составленное въ видѣ очерка охотничьихъ впечатлѣній покойнымъ пркутскимъ охотникомъ П. Шведовымъ.

"Апръль въ исходъ. Снъгъ въ лъсу сошелъ. Солнце припекаетъ днемъ совершенно по-лътнему. Натосковавшись за зиму объ охотъ, вы не разъ уже порывались отвести душу на рябкахъ, но вполнъ вамъ этого не удавалось: къ ельникамъ нельзя приступиться — вездъ лежитъ снъгъ, по хребтамъ ходи только по солнцепекамъ, въ сиверахъ же зима непочатая, словомъ—горе, не охота; убъешь пару, другую рябчиковъ, но только пуще въ задоръ входишь — такъ и тянетъ

пробраться во всв закоулки; мечта укатить дия на два въ ельники рѣшительно не даеть покоя... Но вотъ, наконецъ, и дождались... Зовете знакомаго крестьянина-промышленника (одному ходить въ здѣшнихъ лъсахъ какъ-то жутко, а кстати вдвоемъ веселье, и онъ мъста хорошо знаетъ), - трактуете съ нимъ, куда лучше фхать, рфшаете-и на другой день, пообъдавши пораньше, садитесь въ тарантасъ и ъдете версть за 20 отъ дому въ какую-нибудь крестьянскую "заимку" "), заствиную въ глубнить глухого распадка или красующуюся на высокой горъ, среди безконечныхъ пашенъ. Прівхавиш вечеромъ, между прочимъ сходинь въ ближайшій ельпикъ, убьень нізсколько штукъ рябчиковъ и, нашившись чаю и закусивъ вплотиую, ложишься спать въ тарантасъ или на соломъ возлъ заимки (въ избъ заъдятъ разныя насѣкомыя) и строго паказываешь разбудить себя утромъ какъ можно раньше. Порученіе ваше исполняется въ точности, часа въ четыре утра васъ настойчиво тормошатъ и заявляютъ, что время вставать, пить чай и идти на охоту. Вы лѣниво потягиваетесь, открываете глаза и встрѣчаете голубое, безоблачное небо, встаете съ пригрѣтаго ночпого ложа – и васъ обдаетъ свѣжестью яснаго, теплаго утра. На крышахъ лежитъ легкій иней. Солнышко едва показалось изъ-за горы и обливаетъ яркимъ свътомъ однъ лишь верхушки деревьевъ. За ближайшею горой слышится бормотаніе тетеревей, то різче, то глуше долетающее до слуха; чуфыкаютъ косачи, гдѣ-то недалеко крякаетъ. утка, - сколько прелести, сколько гармонін во всфуь этихъ вешнихъ звукахъ, какъ горячо, какъ сочувственно относится къ шимъ охотникъ!... Вы поспъшно встали, умылись у ключа, напились чаю и, надъвши на себя всъ охотничьи доспъхи и тщательно спрятавъ за галстухъ рябчиковыя пикульки **), направились въ сопровожденіи прі-Фхавшаго съ вами промышленника чрезъ хребетъ въ ельникъ. Весеннее утро даетъ себя чувствовать—вамъ холодно, вы прячете руки въ карманы и прибавляете шагу, но вамъ легко, дышится свободно, и вы мысленно упоситесь въ заманчивые ельники... Наконецъ, желаніе ваше исполняется, хребеть клонится къ низу – и вдали черивется темною массою ельникъ... Еще немного - и вы подошли къ нему. Изъ глубины еловой чащи допосится журчаніе рѣчки. Между деревьевъ сквозятъ бълья наледи. Ближе къ склону горы стелятся министыя кочки, покрытыя сплошнымъ брусинчикомъ.

– Ну, здѣсь можно и попикать, мѣсто доброе, -говоритъ шопотомъ вашъ вожатый, останавливаясь наверху косогора и облокачиваясь на свою длишую винтовку, которую опъ взялъ на всякій случай—можетъ гдѣ-шоўдь встрѣтится козуля.

^{*)} Этимъ именемъ въ Сибири и восточной Россіи, гдѣ поля и покосы лежатъ часто въ разстояніи десятковъ верстъ отъ селенія, называется полевая избушка.

^{**)} Въ обыкновенныхъ пищикахъ отверстіе до извѣстнаго предѣла залѣпляется просто воскомъ, который на хололу застываетъ, и тогда пищикъ вовсе перестаетъ издавать звукъ. Поэтому, а также въ избѣжаніе порчи вищика отъ засоренія, его и посятъ обыкновенно на шнуркѣ, за галстухомъ.

"Вы выпули изъ-за галстуха пикульки и заводите изв'ястную рябчиковую трель, которая громко раздалась на зарѣ, въ невозмутимой типпин яспаго весенияго утра. Ф-р-р-р... въ глубнив ельника пырхнуль рябчикъ, и сердце ваше забило тревогу, такъ хорошо понимаемую каждымъ охотникомъ. Вы знаменательно переглядываетесь съ вожакомъ, тихонько взводите курки и съ полнымъ стараніемъ пикаете еще разъ: рябчикъ пырхиулъ еще ближе и откликнулся своимъ тонкимъ, мелодичнымъ голосомъ... Вы пикиули въ третій разъ, и рябчикъ, распустивъ крылья и производя какія-то особыя дребезжащія трели, детить прямо на васъ и садится какъ нарисованный на ближайшей елкъ или березъ, распустивни грудь и горделиво приподнявъ хохликъ... Пафъ!.. онъ камиемъ падаетъ на землю и пачинаетъ тренехтаться. Вы его не берете, но, выждавъ, покуда послъдніе раскаты гулкаго эхо не смізнятся прежинмъ безмолвіемъ, возобновляете пиканіе, разсчитывая — не отзовется ли поблизости рябушка или рябчикъ изъ другой пары. Но напраспо, больше изтъ ничего, и вы, зарядивши ружье и взявъ добычу, отправляетесь дальше тъмъ же косогоромъ. Пройдя шаговъ двъсти, вновь останавливаетесь и шикаете съ иъкоторыми промежутками три раза-отзыва и шумпаго взлета рябчика не послъдовало—значить, ивть инчего, и вы идете дальше... Воть вамъ ветръчается, примыкающій къ пади и углубляющійся въ гору, глухой отпадокъ, поросній густымъ ельпікомъ; по склопу горы, въ его вершинъ, между камнями струится маленькій ключикъ. Въ подобныхъ мѣстахъ рябчики держатся весьма охотно, и потому вы направляете свои шаги въ вершину этого отпадка, тамъ останавливаетесь и начинаете манить. Съ перваго же пика на горъ послышалось бурчаніе, а вслъдъ за нимъ раздался грубый голосъ рябушки—"Ахъ, чортъ бы ее побралъ! Рябушка!" шепчете вы съ досадою, потому знаете, что рябушка гораздо лукавѣе рябца, далеко невсегда идетъ на манку, да и самый рябчикъ въ ея присутствін неохотно летить на пикъ. Вы пикнули въ другой разъ и съ радостью услыхали со стороны противоположной рябушкѣ пырханіе самца, а вскор'в увид'яли и его, с'явшаго на высокую сосну. Стрълять — далеко, но вы разсчитали, что вслъдъ за повтореннымъ пиканьемъ онъ подлетитъ на близкое разстояніе; увы! расчетъ вашъ не оправдался: рябушка предупредила—она пикнула, и рябчикъ, прошмыгнувъ надъ вашей головой, стремительно улетълъ къ ней. Вы начинаете вновь пикать, но рябчики не отзываются и не заявляютъ никакихъ признаковъ своего присутствія. Это васъ бъситъ, и вы уже помышляете попросить вожака обойти и подогнать ихъ *); вдругъ,

^{*)} Подгонять надо съ умѣньемъ, которымъ не каждый обладаетъ, но зато мастеръ этого дѣла можетъ каждаго рябца направить на своего товарища. Дѣлается это такъ: одинъ изъ охотниковъ, опредѣливъ мѣсто, гдѣ затаилась птица, отправляется обходомъ и старается дѣлать кругъ какъ можно больше, чтобы рябецъ оставался между нимъ и его товарищемъ. Послѣдній между тѣмъ, оставаясь на своемъ мѣстѣ, начинаетъ манить; рябецъ, слыша производимый загонщикомъ шумъ и въ то же время голосъ своей мнимой дружки, сейчасъ же подлетаетъ на зовъ, а загонщикъ, замѣтивъ, что рябчикъ снялся, останавливается, чтобы тотъ не перелетѣлъ черезъ охотника.

взглянувши съ горы вглубь ельника, видите: рябчики другъ за дружкой сгорбившись бъгутъ къ вамъ по гладкой поверхности падели. Потихоньку пикаешь—и рябчики, наддавъ прыти, приближаются шаговъ на двадцать; стръляешь по бъгущей впереди рябушкъ; она остается на мъстъ, а рябчикъ улетаетъ вглубь ельпика. Зная, что, убивъ самку, самца подмаштъ петрудно, стоитъ только зайти къ нему съ другой стороны и разъ-другой пикнуть, или еще лучше выждать, когда опъ самъ нервый подастъ голосъ,—вы такъ и сдълали: прошли шаговъ на сто въ сторону, пикнули—и опъ съ перваго же раза прилетълъ и сълъ на то дерево, подъ которымъ вы стоите. Вскидываете ружье, стръляете — и рябчикъ, считая вътки, падаетъ къ ногамъ вашимъ.

"Такимъ порядкомъ охотитесь вы цѣлый день. Обошли одинъ ельникъ со всѣми его отпадками, перевалами, черезъ хребетъ въ другой—и такъ цѣлый день до самыхъ сумерекъ. Въ серединѣ дня рябчики идутъ на пикъ иѣсколько туже, къ вечеру— опять такъ же, какъ и утромъ..."

Охота съ пищикомъ осенью и просто на узерку по первозимью является въ съверной Россіи, особенно въ губ. Архангельской, Вологодской и др., чисто промысловой, и въ прежнее время большая часть поступающихъ въ продажу рябчиковъ добывалась этимъ путемъ. Говорять, что въ прежнее время два хорошихъ охотника могли настрѣлять за одинъ сезонъ паръ до 1.000 рябчиковъ, но теперь это отошло въ область преданій, и 100 150 паръ за то же время нынъ считаются хорошей охотой. Главной причиной такого значительнаго уменьшенія количества рябчиковъ, добываемыхъ ружьемъ, объясняется вообще уменьшеніемъ пхъ количества всл'єдствіе чрезвычайно распространившейся ловли сильями. Какъ птица прочно привязанная къ извъстному лъсному участку и не совершающая даже значительныхъ кочевокъ, рябчикъ, разъ выбитый въ извъстномъ участкъ, лишь съ трудомъ и пость продолжительнаго періода времени можеть опять завестись тамъ. А между тъмъ силья именио вылавливаютъ рябчика начисто, чего нельзя сказать ин о какой ружейной охоть. Даже прекрасный охотникъ, отлично знающій повадки птицы, все-таки не истребитъ въ извъстномъ участить всъхъ рябчиковъ, а такъ какъ каждая пара выводить въ среднемъ то цыплятъ, то уже этимъ обезпечивается уловъ будущаго года, даже при маломъ числъ остающихся старыхъ паръ. Кром'в того, очень опибаются т'в, которые видять въ промышленник'в пдеальнаго охотника; конечно, между инми есть такіе, но большая часть илохо знаеть привычки дичи, вовсе не обладаеть умѣньемъ хороню манить, вооружена самыми грубыми ружьями, и если несмотря на все это они добываютъ много дичи, то исключительно благодаря поразительному терпівнію и тому, что цізлый день не выходять изъ атьсу. Унотребляемыя для охоты на рябчиковъ ружья винтовки самаго малаго калибра, заряжаемыя пулькой не бол ве горошинки. Ложе этихъ винтовокъ устроено такъ, что прикладъ большею частью приходится

класть на илечо, а не упирать въ него, и ифлиться, держа голову прямо. Къ тому же, тяжесть такого ружья такова, что ифлиться "съ руки" совершенно невозможно, и чтобы устранить это существенное неудобство, около конца винтовки надъвается одна желфаная скобка, съ периендикулярнымъ, заостреннымъ шишнькомъ, длиною около 3 вершка, винзу. При стрфльбф изъ такого ружья, охотиткъ упирается шишнькомъ въ дерево и только въ такомъ случаф можетъ разечитывать на большую или меньшую вфриость выстрфла.

Этимъ можно закончить описаніе разныхъ видовъ ружейной охоты на рябчиковъ и перейти къ описанію довди этихъ итицъ сильями.

Прибавимъ, что при охотѣ на рябчика дробь надо употреблять сравнительно крупную, № 6 или 7, а никакъ не № 10, какъ дѣлаютъ многіе охотники. Мелкимъ калибромъ дроби вѣроятно объясияется значительная доля промаховъ по рябчикамъ. Конечно, птица сама по себѣ невелика и стрѣлять ее приходится чаще на близкомъ разстояни, почему и можетъ казаться, что № 10 совершенно достаточно. Но не надо забывать особенности этой охоты: стрѣлять приходится въ сучья и черезъ сучья, почему до рябчика доходитъ очень немного дробинъ. Къ тому же и опредъленіе разстоянія, на которомъ приходится стрѣлять, при частыхъ вѣтвяхъ чрезвычайно затруднительно.

II.

Промысловое добываніе рябчиковъ.—Добычливость ловли снастями передъ ружейнымъ промысломъ. – Непроизводительность ловли снастями. — Отрицательныя стороны промысловой охоты за рябчиками въ Архангельской губ. по даннымъ Воропая. — Описаніе промысловыхъ способовъ добыванія рябчиковъ. — Торговля рябчиками.

Уже изъ сдъланнаго описанія ружейной охоты за рябчиками на пищикъ очевидно, что этой охотой нельзя истребить всъхъ рябчиковъ даннаго района. Какъ ни велика осъдлость рябчика, онъ и на извъстной площади все-таки имъетъ много шансовъ спастись отъ выстръла, и безъ сомнѣнія это было главной причиной, почему ружейная охота во многихъ мъстахъ смънилась довдею сильями. Второй причиной послужила трудность добыванія и дороговизна пороха до последнихъ -атты: до разрешенія вольної продажи пороха имъ торговали на сфверѣ (губ. Архангельская, Олонецкая, Вятская, Пермская и др.) сами охотники, при чемъ цѣна на него поднималась до 1 р. за фунтъ. Промышленникъ отлично знаетъ, что ловля рябцовъ сильями уменьшаетъ ихъ число на будущіе года, но вм'єсть съ тьмъ лельеть надежду добыть ихъ въ данный годъ столько, что это выведетъ его изъ встхъ финансовыхъ затрудненій. Не должно забывать, что огромная лѣсная площадь съверной Россіи не богата заработками для тамошняго населенія и охотничы промыслы и составляли, и составляють его главную статью дохода. Что мудренаго, что промышленникъ не заботится о будущемъ, когда приходится изыскивать средства для существова-

нія въ пастоящемъ. Н'ятъ сомн'япія, что проведеніе жел'явныхъ дорогъ п разработка естественныхъ богатствъ края должны уменьшить охотничьи промыслы, давъ народонаселению другия средства для заработка, а вмъстъ съ тъмъ и благотворно повліять на сохраненіе дичи, а покачто можно вкратцѣ такимъ образомъ охарактеризовать результаты промысловаго добыванія рябчиковъ на нашемъ сѣверѣ: тамъ, гдѣ прежде два хорошихъ охотника могли настрѣлять въ осень до 1000 паръ этой итицы, теперь на ихъ долю придется паръ 100—150, а то и того меньше. Отчасти это какъ бы компенсируется тъмъ, что цъна 20—25 к. пара, какая была прежде, смінплась ціною 60-75 к. пара, но не должно забывать, что такую ц/ыу илатять только за стр/пяныхъ рябчиковъ: ловленые гораздо дешевле, а такъ какъ ловленые количественно преобладають надъ стр'влеными, то выручка отъ продажи рябчиковъ вовсе не можетъ возрастать, напротивъ, должна уменьшаться (вследствіе уменьшенія количества дичи и въ общемъ сохраненія пизкихъ цѣнъ), что мы и видимъ на самомъ дѣлѣ.

Можетъ быть, людямъ, мало знакомымъ съ охотой, покажется страннымъ, почему добывание птицы снастями неизмѣримо вреднѣе ружейной охоты; но объяснить это очень легко. При ружейной охотъ охотнику приходится разыскивать птицу, подманивать ее и, наконецъ, стр'влять по ней; при сильяхъ птица, напротивъ, сама идетъ въ нихъ. Охотникъ въ извъстное время разставляетъ эти силья, иногда въ количествъ 500-600 штукъ на одного, и такъ какъ эти силья стоятъ недълями, то понятио, что при умълой ихъ постановкъ они дадутъ гораздо больше, нежели ружье, особенно доморощенная винтовка съвернаго промышленинка, изъ которой стрѣлять приходится въ одномъ случав изъ десяти. Итакъ, добычливость несомивнно на сторонв всякихъ ловушекъ. Однако, добычливость эта въ значительной степени ведетъ не къ пользъ и обогащению промышленника, а къ безсмысленному переводу дичи: изъ встахъ пойманныхъ птицъ около 2/3 пропадаютъ для промышленника, будучи похищены четвероногими и пернатыми хищинками, или просто испортившись, потому что промышленникъ не успълъ во время осмотръть снасти. Изъ остальныхъ незначительная часть тоже низкаго качества, все по той же причинъ, т.-е. тронулась отъ тепла, другіе не особенно высоко цізнятся за способъ добыванія: ниже всего стоить цізна на давленыхъ петлями, затімъ идутъ придавленныя падающими снастями. Поэтому многіе промышленники, собравъ въ кучу свъже пойманныхъ рябчиковъ, стръляютъ въ нихъ, чтобы однимъ зарядомъ дроби, какъ они выражаются, выпустить у шихъ кровь, по просту говоря, чтобы продать за стръляныхъ. Въ виду этого, т.-е. непроизводительной добычливости рябчиковъ снаетями, надежда на оставленіе этого способа ловли конечно не потеряна, т. к. сами промышленники говорять, что хорошо было бы, если бы имъ доставалась 1/2 всей пойманной итицы, по, къ сожалению, этотъ промыселъ слишкомъ въздлея въ наше ефверное население и, главное, въ семьи промышленниковъ съ ихъ чадами и домочадцами.

Лучие всего сказанное можно подтвердить частнымъ примъромъ и таковой мы заимствуемъ у одного изъ дучнихъ знатоковъ промысловыхъ охотъ съвера—г. Вороная. Къ тому же больная часть наинсаннаго по этому предмету является простой перефразировкой словъ этого писателя.

"Охотясь съ ружьемъ, —говорить Воронай *, — нельзя добыть столько рябчиковъ, сколько сильями; охотясь съ ружьемъ, не каждаго рябчика можно найти, да и не каждый найденный будеть убить: много причинъ, по которымъ рябчику удается снастись. Доказательствомъ служитъ то, что, начиная съ перваго октября, или правильите, съ послъдней субботы передъ этимъ днемъ (по примътамъ охотинковъ въ этотъ день надо убить хоть одну бълку или рябчика), каждый охотникъ ежедневно ходитъ по однимъ и тъмъ же мъстамъ и каждый день находитъ нъсколько рябчиковъ; отсюда видно, что по окончаніи промысловъ къ весить ихъ остается еще много; а какъ каждая пара выводитъ средицмъ числомъ не ментъ 10-ти цынлятъ, то и на будущую осень будетъ ихъ довольно.

"Совствить иное дело ловля сильями; тамъ ужъ итстъ пощады: на томъ пространстве, где поставлены силья, очень, очень ребдий рябчикъ останется целъ, и, сятедовательно, добыча будетъ несравненно богаче ружейнаго промысла, но зато временная: годъ отъ году остается ихъ менте и менте, сятедовательно, и принлодъ уменьшается, такимъ образомъ рябчики истребляются до посятедияго. Итъ тому же надо прибавить, что часто за ятынью охотника или когда вдругъ вынадетъ глубокій ситьгъ, либо по другимъ причинамъ, силья остаются не задернуты, и весной самка, иногда уже насидъвнии яйца, удавливается, и такимъ образомъ пропадаетъ цельій выводъ.

"Чтобы яснъе понять, отъ чего на мъстности, занимаемой сильями, могутъ истребиться рябчики совершенно, надо припомнить, что опи не перелетають далеко, следовательно, ежели на значительномъ пространствѣ ихъ выловить, то надо много времени, чтобы они развелись вновь. Для прим'тра, до чего доводитъ эта охота, возьмемъ охотниковъ Кодемской пустыни. Кромф своей дачи, занимающей до 80.000 десятинъ, они ловятъ въ Устьянской дачъ, Вельскаго уъзда, въ Сольвычегодскомъ у. до Двины и въ Шенкурскомъ, по рфчкф Зимней, почти до Разсохъ, слъдовательно приблизительно занимаютъ до 250.000 десятинъ; охотниковъ считается 50 человъкъ; каждый среднимъ числомъ ставитъ 900 силковъ, слъдовательно, всего 45.000. Отбросивъ огромныя пространства, гдф рябчики не живутъ, то-есть чистыя болота съ рфдкимъ сосновымъ лъсомъ и сосновые боры, увидимъ, что на мъста, гдѣ держится эта птица, остается едва ли 25.000 десятинъ, и такимъ образомъ на каждую десятину придется почти два силка. Силки начинаютъ ставить не съ 1-го октября, а съ 15-го августа, и ловятъ ими до конца октября, всего 75 дней, т.-е. на пространств в 60-ти саженъ

^{*)} Охота на съверъ Россіи, стр. 43 и слъд. Москва, 1871 г.

въ длину и 40 въ ширину поставлено два силка, и рябчикъ долженъ прожить 75 дней, не попавъ въ петлю,—на это надобно особенное счастіе.

"Послъдствія этой ловли уже дълаются ясны и для самихъ кодемцевъ: лѣтъ 15 съ небольшимъ, какъ введенъ этотъ способъ ловли, и, по ихъ словамъ, теперь не налавливается и иятой части противъ прежнихъ лѣтъ, и годъ отъ году добыча дѣлается значительно меньше; судя по теперениему уменьшенію, можно ручаться, что еще черезъ го лѣтъ рябчиковъ не будетъ совсѣмъ. Крестьяне деревни Большого-Верховья разсказывали, что пока кодемцы не ловили въ ихъ дачахъ, то у нихъ съ двухъ дворовъ набирали возъ рябчиковъ, т.-е. 1.000 штукъ (рябчикъ считается т фунтъ). Нынѣпиній годъ во всемъ Верховъѣ, гдѣ б или 7 охотниковъ, едва ли убито 200 рябчиковъ, и то недалеко отъ деревни, гдѣ иѣтъ сильевъ. На этомъ пространствѣ никогда ихъ не ставили, и рябчики водятся постоянно.

"Выше было сказано, что спло стоитъ на одномъ мѣстѣ 75 дней; но на самомъ дѣлѣ это не нужно и не вездѣ бываетъ: рябчики вылавливаются гораздо скорѣе; поэтому кодемскіе охотники начинаютъ ловить съ 15-го августа въ мѣстахъ отдаленныхъ, а съ 1-го октября переходятъ ближе къ домамъ; но имъ и этого времени очень довольно. Когда послѣ 1-го октября верховскіе пойдутъ въ тѣ мѣста своей дачи, откуда вышли кодемцы, то ни одинъ изъ нихъ, проживши тамъ нѣсколько дней, не убъетъ больше одной пары: такъ весь лѣсъ будетъ очищенъ.

"Но это далеко еще не весь вредъ, какой происходить отъ сильевъ. Пусть бы каждый рябчикъ, попавшій въ петлю, доходилъ до рукъ охотника; по крайней мъръ, заработавъ въ одинъ годъ порядочныя деньги, другой бы хоть изъ лѣни не половилъ бы одну осень; но охотнику достается далеко меньшая половина, а большую събдаютъ медвѣди, вороны и кукини. Каждый охотникъ имъетъ ивсколько пересъкающихся троиннокъ, возлъ которыхъ ставитъ силья. Воронъ или медвъдь, найдя случайно иъсколько рябчиковъ, замъчаютъ направленіе тронники; тогда охотнику не достается уже шичего: онъ въ недѣлю едва обойдеть два раза свои силья, а они будуть посвидать каждый день. Воронъ опасиће медвъдя: эта птица чрезвычайно дукава и осторожна, она скоро находить силья и одаренная острымъ слухомъ и зръніемъ, ни за что не допустить къ себъ близко охотника, и поэтому убить ее почти невозможно. Медвъдь ходить медленно, разыскивая слъды охотника, и часто поилачивается своею шкурой, потому что для него въ такомъ случаћ тоже стараются устронть нетлю изъ хорошей веревки, и онъ удавливается. Кукшей въ лъсу очень много, и хотя онъ не въ состоянін съъсть рябчика, по зато растренлють его совершенно и сдължотъ совсъмъ негоднымъ для продажи. Кромътого, вороны, ястреба и другія итицы не мало истребляють ихъ. Қодемцы говорятъ, что очень были бы довольны, если бы половина попавшихся доходили до ихъ рукъ, больше и не желаютъ.

"Когда промыселъ кончитея и нойдетъ продажа добычи, ловивине сильями онять теряють. Охота ружейная начинается съ 1-го октября, т.-е. когда начнутся уже заморозки; охотникъ, возвративнись вечеромъ къ лъсной избушкъ, вынимаетъ изъ сумки убитыхъ рябчиковъ, подвертываетъ голову итицы подъ крыло, приглаживаетъ перья и екладываеть рядышкомь на полу, у наружной етыки избушки; въ почь рябчики замерзають и такимъ образомъ въ цълости сохраняются до продажи: такого рябчика купецъ беретъ штука за штуку. Совефиъ другое діло бываеть съ ловлеными. Пойманная въ половинт августа или въ началъ сентября птица еще не доросла до настоящей величины, кром'в того, пролежавни и всколько времени въ теплую ногоду, она или совершенно испортится, или завянеть, едівлается дряблою (вытечеть, по выражению промыньленииковъ). И вотъ при продажѣ начинается споръ: покупщикъ изъ 100 выбираетъ 70, по принимаетъ ихъ за 50, много за 60; за этихъ даетъ онъ цъпу настоящую, хотя и меньше, пежели за стр'яляныхъ, остальныхъ не беретъ вовсе; охотникъ начинаетъ упрашивать, чтобы и остальныхъ взялъ, и купецъ береть ихъ не въ настоящой цѣнѣ, а даетъ изъ милости что-нибудь, и такимъ образомъ выйдетъ, что довденые продаются на третью часть дешевле стръляныхъ. Настоящая цъна рябчиковъ въ поябръ мъсяцъ за пару 25-30 и даже 40 копеекъ; въ августъ свъжіе можно купить 8—10 и 12 к.; когда они пролежатъ въ теплъ педълю, тогда не дадутъ и этой цъны. Весь расчетъ въ томъ, что рябчикъ будетъ проданъ мерзлый, следовательно, не такъ приметна норча. Хотя скупщики и опытны, во, кунивши дешево, разсчитывають сбыть въ Петербургь тоже мерзлою, гдь не каждый угадаеть, что рябчикъ не свъжъ. Скупщики бываютъ въ больщихъ убыткахъ, ежели въ дорогъ передъ Петербургомъ ихъ захватитъ сильная оттепель. Случается по иъскольку дней простоять на постояломъ дворъ передъ городомъ п молить Бога о морозъ, а иначе рябчики пойдутъ въ Неву.

"Теперь сдълаемъ расчетъ, сколько же гибнетъ рябчиковъ безъ пользы для охотниковъ и какой черезъ это выходитъ ущербъ въ ихъ размноженін. Тфхъ, которые достаются въ руки, считать не станемъ. Въ Кодемъ 50 охотниковъ; въ 1859 году ими поймано среднимъ числомъ по 50 паръ на каждаго. По ихъ словамъ, только одна треть достается имъ, а $^2/_3$ гибнетъ отъ разныхъ причинъ; но для вѣрнѣйшаго счета возьмемъ только по 50-ти паръ, следовательно, на первый годъ уже совершенно напрасно погибло 2.500 паръ; каждая пара выводитъ не меньше пяти паръ, слъдовательно, на будущій годъ было бы 12.500, черезъ два года—62.500, а черезъ три года—312.500 паръ, или 625.000 штукъ. Раздъливши на 25.000 десятинъ лѣсу, удобнаго для пристанища рябчиковъ, получимъ на каждую десятину по 25 штукъ. Цифра огромная. Положимъ, отъ разныхъ причинъ пропадетъ 20, т.-е. останется по 5, даже по три птицы на десятину, и тогда самый обыкновенный охотникъ убилъ бы отъ 10 до 15 штукъ въ день, а хорошій—гораздо больше.

"Все это не пустыя цифры, не одна теорія, но діло бывалое и доказанное на практикі. Ті же охотники разсказывали, что прежде за цільнії день приходилось проходить не больше і квадратної версты и при томъ ділать но бо и 70 выстріловъ; но по неиміню хороникъ ружей бывало много промаховъ, а все-таки есть такіе, которымъ удавалось въ хорошії день убивать по 30 штукъ, слідовательно, разсказы верховскихъ охотниковъ, что вдвоемъ въ 4½ місяца набивали до 1.000 рябчиковъ, совершенно справеднивы. Со всімъ этимъ крестьяне соглашаются, но шкогда добровольно не бросять этого способа ловли: они говорять, что шкаче не заработаютъ подати, а между тімъ, не разсчитываютъ, какъ будутъ жить черезъ 10—15 літъ, когда некого уже будетъ ловить. Вообще наши крестьяне не всегда пошимаютъ свою пользу и въ особенности не умінотъ разсчитывать на будущее: большею частію надо ділать имъ добро противъ ихъ воли.

"Тъ, которые быотъ изъ ружей, соглашаются охотно на прекращение ловли сильями; по ловящие добровольно не бросятъ, а между тъмъ, ежели охота эта не будетъ прекращена, то можно смъло поручиться, что скоро во всемъ уъздъ нельзя будетъ найти и 5-ти паръ.


"Въ другихъ увздахъ то же самое. Пинежскіе охотники забираются теперь верстъ за 150 и 200 отъ домовъ и налавливаютъ въ хорошій годъ паръ по 150 и болѣе на человѣка; но и тамъ, по ихъ разсказамъ, около домовъ рябчиковъ уже нѣтъ, да и въ глуши теперь меньше. И въ самомъ дѣлѣ, въ 1856 году мнѣ случалось пройти 250 верстъ по тѣмъ мѣстамъ, и едва ли попалось 5 выводковъ. Одинъ иннежскій крестьянинъ поселился въ лѣсу верстъ на 25 отъ границы Пенкурскаго уѣзда, т.-е. отъ своихъ деревень въ 150 в., и 20 лѣтъ назадъ, его сынъ мальчикъ 8 лѣтъ въ одну осень убилъ 90 рябчиковъ, едва умѣя держать въ рукахъ виштовку. Не трудно сообразить, сколько было въ лѣсу птицы.

"Увъреніе крестьянъ, что рябчики налетять изъ другихъ мъстъ, совершенно ложно. Выше было говорено, какъ рябчикъ летаетъ; слъдовательно, ему перелетіть 500 вер. почти никогда не придется. Выводокъ лѣтомъ интается мошками, червяками и живетъ спокойно на томъ м'вств, гдв было гивадо; когда осенью посивютъ ягоды и на этомъ мЪстЪ ихъ не будетъ, рябчики перебираются дальше и, неремъстивнись верстъ на 10—15, много уже на 20, върно найдутъ корму довольно и остаются здісь. А на такомъ разстоянін непремінно уже будеть брусника, если не рябина; это замъчено на опытъ: случалось видъть пространства въ изсколько верстъ, усынанныя ягодами, а далбе настолько же верстъ не видать ни одной. Отчего такъ бываетъ? Дъло постороннее; по это фактъ. Осенью 1858 года въ Торнянской волости (въ 18 верстахъ отъ Шенкурска) не было вовсе рябины, и крестьяне набрали ее въ окрестностяхъ Шенкурска два воза для приманки на силья. Слъдовательно, на пространствъ 20—30 верстъ, рябчикъ можетъ перемъститься съ одного мъста на другое, но если начнется общее одновременное истребление ихъ на извеколькихъ милліонахъ десятниъ, то налетъть имъ уже неоткуда... Въ настоящее время въ Шенкурскомъ уъздъ добывается до 15.000 наръ рябчиковъ"...

Послъ этихъ общихъ замъчаній о промысловомъ добываніи рябчика перейдемъ къ описанію самыхъ ловушекъ.

Простъйшая ловушка—такъ наз. *пастушка*, попросту небольшая круглая въ аршинъ глубины яма, отверстіе которой прикрывается тонкими прутиками; прутики покрываются тонкимъ слоемъ древесныхъ листьевъ, на которыя для приманки кладутъ ягоды рябины. Книзу пастушка иъсколько расширяется, кверху суживается. Прилетъвъ на приманку, итица проваливается въ яму и уже не можетъ выбраться отсюда.

Зыряне употребляютъ для ловли рябчиковъ такъ наз. колпакъ,




Ловля рябчиковъ колпакомъ.

изображенный на приложенномъ рисункъ. Въ сущности это круглая рѣдкая съть, привязанная къ обручу. Этотъ колпакъ слегка укрѣпляютъ бечевкой на небольшой высотѣ отъ земли, привязывая снизу въ глубинѣ его для приманки рябину, и онъ падаетъ сейчасъ же, какъ только рябчикъ, подбѣжавъ подъ него, дернетъ за рябину, покрывая собою птицу.

Но самыя употребительныя для ловли рябчиковъ снасти — силья и давушки. Силья бываютъ волосяныя или конопляныя и называются чапками или очапками и поножами; кромѣ того, тѣ же силья, только въ усовершенствованномъ видѣ, представлены пружками. Для того, чтобы съ успѣхомъ разставить силья, надо конечно знать привычки рябчика и выбирать такія мѣста, гдѣ онъ кормится и гдѣ охотнѣе спускается на землю. Каждый промышленникъ, какъ упомянуто, ставитъ сотни сильевъ, идя едва замѣтной тропой, такъ наз. путикомъ,

черезъ едва проходимыя части лѣса. Смотря по количеству сильевъ и разстоянію между ними, всѣ силья или путикъ можно обойти лишь въ теченіе иѣсколькихъ дней, поэтому промышленникъ обыкновенно начинаетъ обходъ съ одного конца путика и постепению доходитъ до другого. Затѣмъ, поворачиваетъ и идетъ въ обратномъ направленіи. Само собою разумѣется, что рябчикъ можетъ понасться въ ловушку вскорѣ послѣ прохода промышленника и въ такомъ случаѣ при теплой погодѣ усиѣваетъ испортиться, пока онъ подойдетъ во второй разъ. Время постановки сильевъ—осень; къ выпаденію глубокаго снѣга силья синмаются; если же почему-либо остаются до весны, то въ такомъ случаѣ перѣдко губятъ перезимовавшихъ самокъ.




Пружокъ.

Силья устранваются различно не только въ разныхъ губерніяхъ, но даже въ разныхъ частяхъ одной и той же, что, впрочемъ, и не удивительно при огромномъ протяженіи нашихъ сѣверныхъ губерній. Однако, всѣ силья можно раздѣлить на два главные типа: ножныя, или путики, и горловыя. Ножныя дѣлаются изъ крѣнко ссученныхъ нитокъ, длиною въ т½ арш., горловыя плетутся изъ конскаго волоса, для рябчика въ 8—15 волосковъ. Ножныя силья чаще всего соединяются съ насторожкой и тогда получается такъ наз. пружокъ. Для этого одинъ конецъ нетли привязывается къ веринигѣ предварительно очищеннаго небольного упругаго деревца — березки, рябинки или можжевельника,—которое пригибаютъ къ устроенной на земтѣ дужкѣ, или козелкамъ, и настораживаютъ при помощи налочки и поперечной перекладины, какъ показано на рисушкѣ. На ноперечную палочку накладываютъ легкихъ вѣтокъ, а на шихъ разстилаютъ петлю и кладутъ приманку, состоящую изъ ягодъ рябины, рѣже калины (въ Вятской

губ.), которыми запасаются съ осени. Итица, наступая на вѣтки, чтобы достать ягоды, своею тяжестью придавливаетъ вѣтки, роняетъ насторожку, пригнутое дерево (оченъ) выпрямляется, и птица, понавшаяся обыкновенно въ петлю погою, новисаетъ въ воздухѣ. Если деревцо не очень упруго, или петля длинна, пойманная птица часто остается живой и даже разгуливаетъ съ петлей на погѣ.

Такой способъ довли им'ветъ несоми'виное преимущество передъ гордовыми нетлями, такъ какъ пойманиая итица можетъ до изв'встной степени изб'вжать нападеній подбирающихся къ ней хинципковъ, по промышленники чаще употребляютъ гордовыя петли, которыя легче



Силокъ для рябчика.

устанавливать. Эти петли растягиваются кольцеобразно, на полвершка отъ земли, въ квадратныхъ воротцахъ, сдѣланныхъ изъ палочекъ въ полвершка толщины; воротца же ставятся такъ: замѣтивъ съ осени мѣсто, охотно посѣщаемое рябчиками, промышленникъ снимаетъ дернъ до песка, дѣлаетъ на ободранномъ мѣстѣ загородку съ воротцами, насыпаетъ тутъ ягоды и ставитъ силья такъ, чтобы они приходились концами къ воротцамъ. Спустившаяся на землю покормиться птица идетъ по тропинкѣ, поклевывая ягоды, бѣжитъ дальше и попадается въ петлю. Иногда по бокамъ площадки укладываютъ срубленныя елочки, чтобы помѣшать рябчику свернуть въ сторону и миновать петлю.

Зимою, вслъдствіе обильнаго снѣга, петли на землѣ не ставятся, а ставятся на деревья, что особенно часто практикуется зырянами. Для этого на сучья двухъ деревьевъ, на разстояніи 2—3 аршинъ или просто на два вбитые въ землю кола съ вилками на концѣ кладется

еловая перекладина, на которой петля укрѣпляется вертикально, какъ показано на рисункѣ, между двумя загнутыми другъ къ другу и связанными концами вѣтками перекладины. По обѣимъ сторонамъ петли прикрѣпляются пучки рябины. Увидѣвъ ее, рябчикъ бѣжитъ по перекладинѣ, поѣдаетъ рябину съ одной стороны, идетъ дальше, чтобы добраться до другого иучка, и по дорогѣ попадаетъ въ петлю.

Что касается давушки, то для нея устранвается точно такъ же загородка съ воротцами, какъ для горловыхъ петель, но въ воротцахъ настораживается доска, или плашка, которая своею тяжестью и придавливаетъ птицу, когда последняя левзетъ въ воротца за приманкой.

Наконецъ, послъдній промысловый способъ добыванія рябчиковъ-ловля ихъ шатромъ, практикуемая въ Олонецкой губ. "Этотъ родъ ловли, если исполненъ хорошо, весьма добычливъ ") и хорошъ тъмъ, что доставляетъ промышленнику не измученную, а живую дичь; устранвается шатеръ слъдующимъ образомъ: берутъ 8 кольевъ около сажени длины и 9-й колъ, аршина въдва съ половиной, къ верхушкъ котораго придълана круглая доска съ восемью углубленіями по краямъ. Поставивъ этотъ колъ посрединъ, къ нему прикладываютъ другіе восемь кольевъ, нижніе края которыхъ закруглены, въ немного наклонномъ положении. Образовавшийся такимъ образомъ остовъ шатра накрываютъ сверху легкою сътью, которая должна не доходить до земли немножко болже чемъ на четверть. Привязавъ къ сторожевому, среднему колу длинную, крѣпкую и нетолстую веревку, охотпикъ протягиваетъ ее саженей на 20 или 30 и садится въ кустахъ.— Шатеръ ставится на мъстахъ прежде приготовленныхъ, гдъ уже прежде дѣлалась привада, т.-е. во время зимы, при ловлѣ весною, или лътомъ, при довлъ осенью, сыпался пыжевникъ ***) или торица; остовъ шатра тоже долженъ стоять довольно долго, чтобы къ нему привыкли какъ рябчики, такъ и куропатки, или, какъ ихъ здъсь называютъ, куропоть, птицы, прилетая на знакомое имъ мѣсто, не замѣчаютъ накипутой на остовъ шатра сътки и спокойно проходять въ оставленное виизу отверстіе, а когда ихъ наберется довольно большое количество, особенно осенью, охотникъ-промышленникъ дергаетъ веревку, — сторожевой коль упадаеть, съ нимъ вмісті и боковые колья, и сіть нокрываетъ птицъ, которыя при шумъ падающаго кола взлетаютъ и путаются въ съткъ. Но этотъ родъ добыванія дичи, хотя и очень удобенъ, если исполненъ ловко, очень добычливъ и, главное, не портитъ птицы, — очень мало распространенъ въ Олонецкой губерни, потому что, во-первыхъ, требуетъ съти, а во-вторыхъ, -- времени, которое въ это время года, особенно весной, дорого".

Посл'я этого обзора разныхъ способовъ добыванія рябчика, какъ охотинчыхъ, такъ и промысловыхъ, намъ остается сказать только о торговл'я этою итицею.

^{*)} Жури. Охоты Импер. общ. размн. охотн. и промысл. жив. 1875. № 3, стр. 53.

^{**)} Вымятки коноплянаго или льняного сфмени, остающиеся послф выжатія масла.

Главный рынокъ оптовой торговли рябчиками составляетъ Москва, т. к. черезъ ея торговцевъ идетъ рябчикъ и заграницу и въ Петербургъ. Поскольку можно судить по свъдбинямъ, собраннымъ за изсколько летъ въ Охотномъ ряду, въ Москву приходитъ и черезъ Москву проходить въ общемъ свыше милліона паръ рябчиковъ. Слъдовательно, сділанный еще двадцать лічть тому назадъ Л. Н. Сабанъевымъ подсчетъ продажнаго количества рябчиковъ не измънштся сколько-инбудь значительно и тенерь. Сабанфевъ клаль въ кругъ, что всего въ Россін (съ Снопрыю) въ годъ добывается около полутора милліона паръ рябчиковъ, и я готовъ принять это количество для нашего времени, съ тою лишь оговоркою, чтобы слово "добывается" было замінено словомь "поступаеть въ продажу". Добывалось рябчиковъ прежде и добывается теперь гораздо больше этого количества, т. к. изъ сдъланнаго очерка промысловыхъ охотъ за рябчиками мы уже знаемъ, что около $^{-2}/_{3}$ всего пойманнаго количества рябчиковъ пропадаетъ для промышленника и, стало-быть, не попадаетъ въ продажу. Такимъ образомъ, если въ продажу поступаетъ $1^{1}/_{2}$ милліона паръ рябчиковъ, добывается ихъ по країней мѣрѣ 2¹/₂—3 милліона. Отсюда и заключеніе Сабан'вева, что на каждой квадратной верст'я занятой рябчикомъ площади добывается одна пара въ годъ, невърно: добывается 2—3 пары, и это объясияетъ намъ истребленіе рябчиковъ. Что рябчикъ м'ястами очень сократился въ числ'я, доказывается измѣнившимися на него мъстными цѣнами: такъ, даже въ Архангельской губ., у населенныхъ центровъ конечно, за пару рябчиковъ приходится платить свыше 60 к., цфна прежде неслыханная. И если количество продажныхъ рябчиковъ остается прежнимъ и въ Москвъ цъна на нихъ существенно не измѣнилась, то это объясняется тѣмъ, что съ проведеніемъ желтыныхъ дорогъ явились новыя области, доставляющія на рынокъ эту птицу. Все это огромное количество проданныхъ рябчиковъ, по країней мѣрѣ 2/3 его, добывается въ какіе-шоўдь 2 мѣсяца, осенью п въ началѣ зимы, когда уже начались заморозки. Остальное количество составляетъ предметъ мъстнаго потребленія. Такъ, въ Москвъ, въ іюль и августъ продается свъжій, стръляный рябчикъ, доставляемый изъ уъздовъ Московской губ. и другихъ сосъднихъ. Позднъе же начинается привозъ изъ болъе отдаленныхъ мъстъ, и въ январъ-февралъ приходятъ партіп спбирскихъ рябчиковъ. Сообразно этому, колеблется и рыночная цъна этой дичи. Лътомъ рябчикъ продается по 1 р. 50—1 р. 75 к. за пару, несмотря на то, что еще мелокъ, не доросъ. Поздиће цѣна падаетъ за пару до 1 р. и даже 80-85 к., но даже и зимою ръдко понижается ментье 60 к., а такъ наз. сибирскій рябчикъ почти всегда стоитъ около 1 р. за пару. Конечно, у уличныхъ торговцевъ цѣны значительно ниже, но ихъ нельзя брать во вниманіе, потому что они продають бросовый, полугнилой товаръ.

Что касается цъны, по которой скупщики дичи берутъ пару рябчиковъ у промышленниковъ, то она равняется въ среднемъ 20 к.

Следовательно, тогда какъ промышленники получають за свою дичь въ среднемъ около 300 тыс. руб., торговцы должны бы получить по средней рыночной центь за то же количество свыше милліона руб. Но, конечно, они получають неизмернию меньше, такъ какъ много рябчиковъ приходится или совсемъ выбрасывать, или продавать за безценокъ. Иногда целые обозы гибнутъ изъ-за неожиданной оттенели. Да къ тому же и большой барышъ, распределяясь по итсколькимъ рукамъ, вместе съ темъ сильно теряетъ свое значеніе.

Какъ бы то ни было, этихъ чиселъ достаточно, чтобы оцѣнить огромное промысловое значеніе рябчика и вызвать упорядоченіе способовъ его добыванія: 2—3 каждогодно добываемыя нары на одной квадратной верстъ слишкомъ много, особенно если изъ трехъ двѣ пропадаютъ для промышленника.

72. Рябчикъ темный. Bonasa griseiventris, Menzb.

Табл. 75.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 486.

Этотъ красивый, впервые описанный мною видъ рябчика (по экземплярамъ изъ Пермской губ.), какъ теперь выяснено, имѣетъ очень широкое распространеніе: онъ встрѣчается съ запада на востокъ отъ Олонецкой до Тобольской губ. включительно (черезъ Вологодскую, Архангельскую, Вятскую и Пермскую) и съ сѣвера на югъ отъ Архангельской до Нижегородской включительно. По образу жизни, безъ сомнѣнія, не разнится существенно отъ обыкновеннаго, которому, однако, неизмѣримо уступаетъ въ численности. Можно сказать, что темный рябчикъ количественно тонетъ въ массѣ обыкновеннаго, но это находитъ себѣ многочисленныя аналогіи въ орнитологической фаунѣ палеарктической области и только сильнѣе подтверждаетъ мое убѣжденіе, что это древняя форма.

73. Тетеревъ кавказскій. Tetrao mlokosiewiczi, Tacz.

Табл. 76, 77.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 489.

Мѣстныя названія: Кавк. тат.— кара-тухъ, месша-тухъ (или таукъ).— Лез.— рісзта.— Туш. — росцо.— Груз. — кареули - катани. — Оссет. — каркъ. — Армян. — пайтморекъ. — Персид. — ябанъ-таукъ.

Кавказскій тетеревъ распространенъ въ полост алпійскихъ луговъ по всъмъ горнымъ хребтамъ Большого и Малаго Кавказа, гдѣ живеть болье или менье осьдло, только изръдка спускаясь зимою до 5—4.500' н. у. м., вообще же держась не ниже 6.000'. Эта полоса альпійскихъ луговъ опоясывается, какъ кольцомъ, поясомъ лѣса, гдѣ тетеревъ не держится, и это, безъ сомивнія, придаетъ столь опредвденный характеръ занятымъ имъ станціямъ; только тамъ, гдф, какъ, наприм., на съверномъ Кавказъ, лъсной поясъ прерывается, кавказскій тетеревъ спускается зимою ниже полосы альпійскихъ луговъ. Въ противность горной индфійкъ, которая держится около ледниковъ, тетеревъ населяетъ альпійскія луга тамъ, гдъ они прилегаютъ на своей инжией границѣ къ зарослямъ рододендроновъ, отдѣляющимъ ихъ отъ лъсной области. Если здъсь есть разбросанныя тамъ и сямъ березовыя деревца и кустики или даже небольныя ронцицы, тѣмъ скорже можно найти зджсь тетерева, но възгрсную полосу онъ не идетъ дальше ея опушки. Говоря о распространении тетерева въ верховьяхъ притоковъ Кубани, Лабы и Уруна, Н. Я. Данникъ следующимъ образомъ описываетъ эту интересную мѣстность: "Эта мѣстность, читаемъ мы у него, въ высшей степени интересная какъ для естествоиспытателя, такъ и для охотинка, имбетъ самый дикій характеръ. Опа не представляетъ ни одной обишрной равшины, ни одной сплошной возвышенности, а множество глубочайшихъ долинъ и ущелій, которыя отделяются другь отъ друга хребтами, пересъкающимися во всевозможныхъ направленіяхъ. Болье чьмъ до половины высоты склоны ихъ покрыты лѣсами, кое-гдѣ лиственными, а большею частью

хвойными. Эти лъса вполить сохранили евой дъвственный характеръ: здъсь и теперь часто встръчаются сосны, е.ш, пихты и ясень болъе трехъ обхватовъ толицины; до сихъ поръ обитаетъ почти всюду истребленный зубръ; мы сами слышали тутъ ревъ барса, почти ежедневно видъли альнійскихъ козловъ, сериъ, оленей и медвѣдей. Надъ лфсной областью располагаются альнійскія пастбища, покрытыя вначаль высокой, сочной травой и множествомъ разнообразиванихъ цвѣтовъ, а потомъ, по мѣрф приближенія къ спѣжной линін, дѣлающіяся все болье и болье скудными. Воть на этихъ-то настбищахъ и на границъ съ шими лъсной области живетъ кавказскій тетеревъ.— Въ противоположность горнымъ курочкамъ или горнымъ индейкамъ, онъ не встръчается на голыхъ скалахъ, точно такъ же какъ и на самыхъ высокихъ пастонцахъ, покрытыхъ приземистой травой; настоящимъ мъстопребываніемъ его слъдуеть считать альнійскіе дуга, покрытые богатой растительностью, и верхній поясь лівсовъ. Часто онъ держится вблизи узкихъ горныхъ тропинокъ; раза два я видълъ самку, бъгающую по нимъ со всъмъ своимъ семействомъ. Она, въроятно, водить сюда своихъ дътенышей, чтобы пріучить ихъ отыскивать насъкомыхъ, живущихъ въ навозъ. Попадается также этотъ тетеревъ на опушкахъ горныхъ лъсовъ, въ кустахъ инзкорослой березы, въ заросляхъ рододендроновъ и т. д."

Ф. К. Лоренцъ описываетъ мъста, занятыя тетеревомъ въ горахъ около Кисловодска, какъ весьма труднодоступныя, съ крутыми откосами, покрытыми травой и разбросанными по шимъ крупными и мелкими камнями. Но и здъсь онъ живетъ выше полосы лѣсовъ.

Наконецъ въ совершенно подобныхъ же мъстахъ живетъ тетеревъ въ Закавказьъ, какъ это видно изъ слъдующаго описанія г. Михайловскаго: "На (Ахалцихскихъ) горахъ, между селеніями Андрія-Цминда и Уровель, гдф я случайно согналъ нфсколько тетеревовъ, ходьба въ высшей степени неудобна, а стръльба въ летъ связана съ значительными затрудненіями. Вследствіе обрывистыхъ склоновъ, приходится карабкаться держась за пни и корни деревьевъ, мелкіе камни вырываются изъ-подъ ногъ и нужно внимательно следить, чтобы не слетъть въ кручу. На стадо кавказскихъ тетеревей (4 самца и 2 самки) я напалъ еще разъ переъзжая гору Арилянъ-баши, въ 18 верстахъ за Ахалцихомъ. Это было въ началъ мая... Добравшись до пояса горныхъ луговъ, передъ нами открылось небольшое ровное мѣсто, покрытое обветшалой, приклонившейся травой; мѣстами лежали не успъвшіе еще стаять пласты снъга... Легкій туманъ носился надъ обнаженными березами и ольховыми кустами, съ вершинъ отдъльно стоящихъ сосенъ раздавалась скромная пъсня лъсной щеврицы. Мы спускались съ небольшой покатости къ ручейку снѣговой, воды, какъ вдругъ неожиданно слетъла пара черныхъ тетеревей изъподъ сосъднихъ кустовъ. Осматривая мъсто, я замътилъ на небольшой гладинъ, шагахъ въ 50, плотно припавшую въ травъ тетерку, а подальше высовывалась черная голова самца, вытягивающаго шею

и собирающагося улетъть. Остановивъ лошадь, заложивъ поводья на оргалъ съдла, я успълъ только сиять двустволку, прицълиться и промахнуться по вылетъвшимъ птицамъ. Сойдя съ лошади, я пошелъ по тому направленію, куда полетъли тетерева, и нашелъ скопившееся стадо по другую сторону отдълявшей меня кручи, въ такомъ мъстъ, куда нельзя было пробраться. Я наблюдалъ ихъ въ зрительную трубку: они спокойно гуляли по покрытой мохомъ покатости, вытягивая шею и поднимая грудь, или подбирали что-то съ земли, а потомъ скрылись бъгомъ въ разныя стороны къ ближайшимъ кустамъ".

По всімъ своимъ привычкамъ кавказскій тетеревъ является настоящей горною птицею, которая проводитъ большую часть своего времени на землів. Преслівдуемый, онъ большею частью пытается спастись бізгствомъ, поднимается только въ случать очень настойчиваго преслівдованія, и тогда, пролетівть короткое разстояніе, опускается чаще всего опять въ траву. Тамъ, гдів есть деревца, тетеревъ не избізгаетъ садиться на нихъ и, разъ сівть, сидитъ замізчательно крізпко. Вообще, вслівдствіе малаго преслівдованія и жизни въ такомъ поясів горъ, гдіз зимою человізка совсімъ не бываетъ, тетеревъ очень смиренъ или, какъ обыкновенно говорятъ, глупъ и иногда выдерживаетъ 2—3 выстрізла, прежде чізмъ слетитъ съ своего мізста. Поднятый тетеревъ летитъ обыкновенно подъ гору и, несмотря на свои короткія крылья, летитъ очень быстро, издавая особый свистъ крыльями; самка взлетаетъ съ особымъ пискомъ.

Тетеревъ питается почками, цвѣтками, сѣменами, листьями и плодами разныхъ растеній и насѣкомыми, преимущественно жестко-крылыми. Зимою онъ очень охотно кормится березовыми почками, наѣдаясь ими съ утра такъ, что зобъ оттопыривается впередъ.

Наблюденія надъ періодическими явленіями въ жизни кавказскаго тетерева очень отрывочны, но по країней мірь относительно весенняго образа жизни свъдънія достаточны полны. Въ началъ мая на съверномъ Кавказъ тетерева уже токуютъ. Въ это время солнце печетъ такъ сильно, что, оставаясь долго подъ его лучами, съ непривычки можно получить настоящіе ожоги съ пузырями, тогда какъ даже легкій вітерокъ, благодаря обилію снівга въ горахъ, обдаетъ холодомъ. Горные рфики и ручы съ страшнымъ шумомъ и грохотомъ катятся по каменистому ложу, на див ущелій. Горныя птицы, каковы темногрудыя горихвостки, альнійскія галки, желтыя ивночки, бълогрудые дрозды и друг., празднуютъ свой брачный періодъ, оглашая весельми голосами еще скудно покрытые зеленью горные склоны и лъса... На тока тетерева собираются въ количествъ до 20 штукъ, ппогда на очень крутомъ склонъ, покрытомъ ветонью и тамъ и сямъ разбросанными пашнями. Но несмотря на такое количество токующихъ самцовъ, токъ тянется вяло, и большинство птицъ держится почти неподвижно, развъ только переступая съ поги на ногу. Въ токъ участвуютъ какъ старые самцы, такъ и молодые, еще въ сфропестромъ невзросломъ нарядъ, и тутъ же, пританвшись у камней,

держатся самки. Молодые самцы и самки, благодаря своей окраскъ, могутъ быть замъчены только на близкомъ разстояни; старые же самцы черигьють уже издалека. Поза токующаго самца очень оригинальна; онъ откидываетъ назадъ голову, втягиваетъ шею, выпячиваетъ зобъ, опускаетъ крылья и поднимаетъ хвостъ, не распуская его, однако, въеромъ. Никакихъ звуковъ токующій кавказскій тетеревъ не издаетъ, какъ въ этомъ можно убъдиться, наблюдая его изъ-нодъприкрытія на близкомъ разстоянін, но иногда взлетываетъ, поднимаясь съ аришнъ надъ землею, иногда переступаетъ бокомъ. И то и другое вызывается передвиженіями самки: если самка медленно переходитъ съ мъста на мъсто, самецъ бокомъ идетъ за ней; если она быстро перебътаетъ, онъ перелетаетъ следомъ. Только при взлетывании самецъ издаетъ слабый инскъ, въ родъ циръ-циръ-циръ, громко хлоная въ то же время крыльями. По въ противность этому вялому общему ходу тока, кавказскіе тетерева, по паблюденіямъ г. Лоренца, очень драчливы, и дерутся даже съ большимъ ожесточеніемъ, нежели обыкновенные косачи.

Ипогда на токахъ собпраются только молодые тетерева, и обыкновенно молодыхъ на току болбе, чѣмъ старыхъ. Токующій тетеревъ мало обращаетъ вниманія на окружающее, и къ нему не трудно подойти на 60—50 шаговъ, даже безъ всякаго прикрытія. Два-три промаха онъ обыкновенно также выдерживаетъ, не снимаясь съ мѣста. Но самка гораздо остороживе: слетаетъ при приближеніи охотника, и тогда за нею слетаютъ самцы. Спутнутые съ токовища тетерева черезъ какіе-нибудь полчаса снова возвращаются на него и токъ возобновляется, какъ будто инчего не было.

На токъ тетерева слетаются часовъ съ шести вечера, токуютъ до наступленія темноты и почуютъ на томъ же мѣстѣ. Утромъ токъ начинается, едва поблѣднѣетъ небо, и тянется часовъ до восьми, когда тетерева улетаютъ кормиться въ березовыя заросли. Судя по наблюденіямъ Млокосѣвича въ Закавказъѣ, періодъ тока продолжается до конца мая и даже до начала іюня.

Гитвадо кавказскаго тетерева представляетъ неглубокую, едва выстланную сухой травой ямку подъ камнемъ; число ящтъ кладки до 10, но число цыплятъ обыкновенно меньше, 6—7. Время вывода дтей приходится, повидимому, на конецъ іюня и начало іюля, по крайней мтрть на стверномъ Кавказтъ. Ко второй половинъ іюля птенцы становятся ростомъ съ куропатку. Самецъ, естественно, не принимаетъ никакого участія въ воспитаніи дтей, мать же заботится о нихъ и охраняетъ ихъ совершенно такъ, какъ обыкновенная тетерька. Выводки, втроятно, не разбиваются до зимы, такъ какъ осенью молодые тетерева, и самцы, и самки, держатся со старыми самками, образуя стан большихъ или меньшихъ размтровъ. Удивительно, что молодые тетерева и самки зимою вообще строже старыхъ самцовъ.

Зимою, чуть начнеть брезжить, тетерева отправляются на кормежку. Усъвщись на березахъ, они пропускають вътви черезъ клювъ,

обрывая почки, и туго набиваютъ ими свой зобъ, чтобы среди дня отдыхать, не кормясь. Кромѣ почекъ, кормятся листочками и другими растительными веществами, на полянкахъ, гдѣ сиѣгъ сдуло вѣтромъ, добываютъ изъ-подъ сиѣга оставшіяся ягоды и т. д. Неизвѣстно, заканываются ли кавказскіе тетерева на ночь обыкновенно въ снѣгъ, но они дѣлаютъ это, если ихъ настойчиво преслѣдуютъ.

Спеціальной охоты за кавказскимъ тетеревомъ нѣтъ: ихъ бьютъ только попутно, при охотѣ на другую дичь нижней полосы альпійской области, каковы горныя курочки, горныя индѣйки и пр.

74. Тетеревъ косачъ. Tetrao tetrix, L.

Табл. 78.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 493.

Болье распростр. названія: тетеревь косачь, березовикь.

Мъстныя названія: а) самца: тетеревъ, косачъ, черныть, полевой тетеревъ, тетеревъ березовикъ, березовикъ; полюлъ и полякъ (Владимір. губ.); польшикъ, полящъ (Тагилъ), пальшикъ (Богослов. и Сибирь); полешикъ, полютекъ, полюжа (мъстами въ Россіи, по Далю); тетервакъ, косецъ (Малоросс.); б) самки: тетерька, тетерка; касатка, маракуша (Лапландія, Архан. губ., Сибирь); полюшки, рябутка (Екатеринб. у.); пальнюшка (на сѣв. Пермской губ.); дикія куры (Бессарабія).

Польск.: cietrzew, głuszce cietrzew, kniejotek cietrzew.— Эст.— tedder.— Лат.— (самецъ) tetteris, (самка) tettera.— Фин.—teiri.—;Кмуд.—teteres.

Арм.— чолишибъ.— Тат.— куршлюкъ, куртукъ; самка — кари, куртукъ, синда, картоуш.— Кавк. тат.— буджуръ.— Баш.— куръ, куртлукъ, озанъ, узунъ, узонъ, зонъ; самка— босъ-узунъ. — Бараб.— узанъ.— Киргиз.— сонъ-кушъ, куръ.— Хив. и бухар.— хубарычь.— Якут.— уларъ, куртуна, куртуяхъ.— Енис.— ороки; самецъ — кори-куртункъ; самка — тихси-куртункъ. — Калм. — хеаръ йотонъ, бухуршин. — Вотяцк.— туръ.— Морд.— кериплыменъ.— Зыр. — шаръ; самка— кенъ-таръ. — Пермяц.— дозморъ.— Черем. — кюдеръ.— Вогул.— польда.— Сосв. вог. — кольмъ, киплыме, пъллбой, калимъ, шула; самка— іетри. — Берез. ост. — кутуръ. — На Пртинъ — Йиттери. — На Сургутъ. — йетерке. — На Нарымъ—кышъ, кыонъ. — На Енис. — дыттъ. — Тунг. — бульбуки, бурбукъ. — Бир. тунг. — тогетюнъ, тыпаланъ. — На Вилюъ—иибинабки. — Монг.—хоро. — Бурят. — коро. — Самоъд. — лукъ. — Тангут. — сира; самка — симонъ. — Манягр. — тоголанъ, упуне. — Гиляц. — пуйечь, пыйеркъ. — Мангун. — гачи. — Гольдъ. — игиа, асеминиъя.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Распространеніе и общій очеркъ образа жизни тетерева.

Распространеніе тетерева-косача и въ настоящее время у насъ еще очень обширно, а пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, когда лѣса на сѣверѣ уже успѣли достаточно расчистить, степи же не успѣли распахать, оно было еще обширнѣе и птица занимала почти всю страну. Вмѣстѣ съ тѣмъ тетеревъ во многихъ мѣстахъ и былъ и остается

крайне многочисленнымъ, такъ какъ благодаря своему образу жизни и практикуемымъ за нимъ способамъ охоты онъ не подверженъ такому ноголовному истребленію какъ рябчикъ, и потому промысловое значеніе этой птицы огромно.

Любимое м'ьстопребываніе тетерева составляють березовые л'ьса, чередующеся съ хакоными полями; сабдовательно, за коренную область его распространенія можно принять ту пограничную полосу между сплошной лісной областью и областью степи, которую я называю въ своихъ зоогеографическихъ работахъ "полосою островныхъ лъсовъ". Въ степи тетеревъ былъ распространенъ по долинамъ рѣкъ и тамъ, гдв больше или меньине участки степи были покрыты ягодными кустарниками, дикой вишней и дикимъ персикомъ. Въ лъсной области онъ разселился съ одной стороны тоже но долинамъ рѣкъ, съ другой — по горамъ и вырубленнымъ площадямъ, гдф первоначальныя хвоїныя насажденія должны были уступить свое м'єсто бол'є легко развивающимся лиственнымъ деревьямъ. Съ теченіемъ времени, по мъръ того, какъ степи распахивались, распространение тетерева въ южной Россіи становилось все болѣе и болѣе спорадичнымъ, пока, наконецъ, онъ не исчезъ мъстами совсъмъ; на съверъ же вырубка лъса, напротивъ, доставляла птицъ все больше и больше подходящихъ мъстонахожденій и здъсь она постепенно занимала болье обширную площадь. Въ менъе ръзкой формъ шло измънение состава тетеревинаго населенія въ средней полосѣ Россіи: конечно мъстами и здѣсь тетерева значительно уменьшились въ количествъ, благодаря увеличивающемуся населенію и безтолковому пресл'ядованію около наибол'я заселенныхъ центровъ, по здъсь же они и сохранились въ напбольшемъ количествъ, хотя мѣстами, напримъръ, въ восточной части этой полосы.

Вотъ въ какомъ видъ представляется распространение у насътетерева въ настоящее время.

Начиная съ съвера, мы находимъ, что въ Лапландіи онъ доходитъ въ области Энаре до 70° с. ш., но въ очень небольшомъ числѣ; отсюда съверная граница распространенія этой птицы, въ направленіи къ востоку, быстро понижается, такъ что въ русской Лапландін проходитъ черезъ южную оконечность оз. Имандра, подъ $67^{1/2}$ с. ш., обыкновеннымъ же тетеревъ становится только еще юживе, съ 66° с. ш. Приблизительно около 660 идеть эта граница отъ Бълаго моря къ Уральскому хребту, но здъсь опредълить ее крайне трудно, такъ какъ она обусловливается степенью разр'яженности л'яса и, сл'ядовательня, надо думать, въ лесной области между Белымъ моремъ и Ураломъ выбъгаетъ къ съверу языками но долинамъ ръкъ. Спорадичное распространеніе тетерева характеризуетъ всю сіверную Россію и не только губ. Вологодскую, Архангельскую, съверную часть Вятской и Пермской, но даже многіе увзды губ. Олонецкой, Тверской, Новгородской, Костромской и, въ меньшей степени, съверныя части губ. Ярославской Нижегородской и Казанской. Короче говоря, вся лъсная область къ съверу отъ средняго теченія Волги характеризуется тъмъ, что тетеревъ занимаетъ здѣсь какъ бы отдѣльные острова, покрытые отчасти мелколѣсьемъ, отчаети невысокимъ лиственнымъ лѣсомъ, разбросанные среди стараго хвойнаго, отчасти лиственнаго лѣса.

Что касается средней Россіи, то о повсемъстномъ обильномъ нахожденін здась тетерева уже было говорено, но къ этому общему замъчанію надо прибавить иткоторыя подробности. Начиная еть востока, мы видимъ, что тетеревъ въ Уфимской губ. встрфчается повсем'юстно, ги'вздясь по окраннамъ большихъ л'юсовъ, въ маленькихъ лъсахъ или рощахъ и въ заросляхъ винни, какъ въ гористыхъ стеняхъ, такъ и въ ровной мъстности, какъ, наприм., въ Стерлитамакскомъ у. Тамъ, гдф дфсочки или рощицы чередуются съ дуговыми полянами, вырубами или каменистыми осынями, тетеревъ прямо многочисленъ, наприм., въ окрестностяхъ Златоуста. Въ Самарской губ., гдв она граничить съ Уфимской, по словамъ Л. Н. Карамзина, летъ десятьпятнадцать тому назадъ, когда степей съ зарослями вишни, бобовника и чилизника было много, и когда степная трава не только не была вытравлена скотомъ, по и оставалась некошенною по ифсколько л/ытъ подъ рядъ, тетерева летомъ были гораздо многочисление въ южной почти безлъсной части этой области, чъмъ въ съверной лъсистой. Но съ распашкой стеней и ежегодной косьбой травъ положение измънилось: кустаринкъ и клубинчинкъ быль истребленъ, вмъстъ съ тъмъ количество тетеревовъ въ степной части сильно сократилось и теперь они встръчаются въ одинаковомъ количествъ какъ въ лъсной, такъ и въ безавсной части. Въ концъ изтидесятыхъ и началь шестидесятыхъ годовъ тетеревъ, по наблюденіямъ Н. Л. Сфверцова, былъ обыкновененъ по свверному склону Общаго Сырта, по рфкамъ Ику, Салмышу, Чагану п др., доходя л'ятомъ почти до средняго теченія р. Урада, между Татищевой и устьемъ Кендели, а по Мугоджарамъ распространяясь до Каргалы (верхнее теченіе Илека) и Уркача. Зимою тетерева спускались далеко внизъ по теченію рѣки Урала. Въ настоящее время, по словамъ Заруднаго, отъ этого болће или менње сплошного распространения тетерева въ названной мъстности осталось только спорадичное распространение. Такъ, онъ и теперь еще встръчается въ достаточномъ числъ въ Губерлинскихъ горахъ, въ березовыхъ и осиновыхъ лъсочкахъ въ Ветлянскихъ горахъ и т. д., но по Илеку уже редокъ и очень обыкновененъ только въ горахъ Общаго Сырта. Съ переходомъ за Волгу тетеревъ должно быть еще и теперь относительно обыкновененъ въ съверныхъ частяхъ Саратовской губ. (Аткарскій, Сердобскій, Петровскій, Кузнецкій и Вольскій уу.), спускаясь здісь вообще къ югу до 51°-50° с. ш. Зимою доходить до Саренты. По Ергенямъ тетерева нътъ и не было. Еще далъе къзападу тетерева уже въ очень небольшомъ колпчествъ встръчаются спорадично въ южной части Тамбовской губ. (такъ назыв. "Черная Дача" около Усмани) и въ съверной части Воронежской, но что касается южныхъ частей Воронежской губ. и повидимому, всей Земли Войска Донского, то теперь тетерева здѣсь уже нѣтъ, а въ 50-хъ годахъ онъ жилъ здесь постоянно въ небольшомъ количестве

и появлялся ппогда большими стаями зимою. Очень интересны св'яданія о постепенномъ исчезновенін тетерева изъ Харьковской губ. Въ концѣ XVIII и началь XIX стольтія онъ быль здісь обыкновенень и по крайней мфрф отчасти жилъ въ качествф степной птицы. Въ концф 20-хъ и въ 30-хъ годахъ XIX столътія тетеревъ становится уже настолько рѣдкимъ въ Харьковской губ., что даже столь ревностный собиратель и любитель оринтологіи, Криницкій, не могъ ихъ добыть для зоологическаго музея Харьковскаго университета. Однако, повидимому, тетерева еще встръчались здъсь, хотя и въ ничтожномъ количествъ, до 50-хъ годовъ, когда исчезли совершенно. Теперь тетерева уже положительно не водятся въ Харьковской губ. И въ Курской, и въ Полтавской губ. тетеревъ, если можно такъ выразиться, находится наканунъ своего совершеннаго исчезновенія. Въ Кіевскої губ, тетеревъ прежде былъ обыкновененъ на всемъ ея протяженін, равно какъ въ сосѣднихъ Полтавской и Подольской. Такъ дъло обстояло до 50-хъ годовъ, когда тетеревъ довольно быстро исчезъ изъ южныхъ частей названныхъ губернії, безъ сомивнія, въ зависимости не отъ прямого преслѣдованія, а отъ быстро развившейся колонизацін края и распашки степей. Такъ, въ 50-хъ годахъ онъ уже исчезъ изъ Уманьскаго у. Теперь тетеревъ сохранился въ Кіевской губ. лишь въ ея сѣверной, лѣсной части. Въ Подольской губ, тетеревъ можетъ быть еще есть близъ границъ Галицін и въ горахъ с'яверныхъ убздовъ, но на остальномъ ея протяженін не встръчается *). Въ Бессарабін тетеревъ прежде водился во многихъ лъсахъ Хотинскаго, Сорокскаго и Ясскаго уу., но уже къ 70-мъ годамъ сохранился только въ Секурянскомъ лѣсу, Хотинскаго у., а есть ли гдъ тетерева теперь въ Бессарабін-миъ неизвъстно.

Къ югу отъ перечисленныхъ мѣстъ, гдѣ тетеревъ отчасти уже совершенно не встрѣчается, отчасти почти исчезъ, эта птица прежде шла черезъ всѣ степи Новороссійскаго края и черезъ Землю Войска Донского въ губ. Ставропольскую и, южнѣе, до стеней у сѣвернаго подножія Кавказскихъ горъ включительно. О распространеніи тетерева въ Новороссійскихъ стеняхъ Нордманъ писалъ въ 40-мъ году какъ о замѣчательномъ фактѣ, стоящемъ въ противорѣчіи съ мѣстонахожденіями этой итицы въ другихъ частяхъ Европы, и въ тоже время отмѣчалъ новсемѣстность распространенія тетерева въ стенной полосѣ. Однако, едва ли есть основаніе сомнѣваться въ томъ, что тетеревъ въ области Чернаго моря шкогда не переходилъ къ югу за южную границу чернозема и никогда не встрѣчался пи въ степяхъ, ни въ горахъ Крыма.

На съверномъ Кавказъ обыкновенный тетеревъ прежде былъ распространенъ какъ въ лъсахъ Ставропольскихъ и Кумскихъ, такъ и въ стеняхъ Кубанской и, въроятно, Терской области. По дошедшимъ

^{*)} Впрочемъ, такой дъльный охотникъ какъ г. Д—вичъ въ 1876 голу опредъленно высказалъ, что тетеревъ въ Подольской губ. водился до 50-хъ годовъ, но съ тъхъ поръ о немъ не слышно.

до насъ свъдъніямъ, онъ быль здъсь даже обыкновененъ, по крайней мврв мвстами, до 50 — 60-хъ годовъ, послв чего быстро пошелъ на убыль, всябдствіе вырубки явсовъ и распашки етеней. Однако, Ф. К. Лоренцъ, посътивъ Кубанскую степь по Лабф въ началъ восьмидесятыхъ годовъ, имълъ положительныя указанія мъстныхъ охотниковъ. что тетерева и теперь еще водятся въ ихъ степяхъ, являясь осенью и зимою на зеленя стайками до 15—20 штукъ, тогда какъ прежде, когда лъса по Лабъ не были вырублены, тамъ же неръдкость было встрътить стада въ 150—200 штукъ. Г. Стрижевскій сообщить затъмъ Лоренцу, что онъ охотился за тетеревами въ Кубанской степи по р. Бѣлой и притоку Лабы — Улъ; тетерева держались въ степномъ бурьянѣ (осенью) и ничьмъ не отличались отъ нашихъ (г. Стрижевскій, какъ воронежскій пом'ящикъ и хорошій охотшикъ, не могъ не знать последнихъ), кроме своей иесколько меньшей величины. Черкесы говорили г. Стрижевскому, что въ степяхъ ближе къ горамъ тетерева еще многочисленны. На основаніи этого можно заключить, что обыкновенный тетеревъ и до сихъ поръ еще живеть въ степи и въ лъсахъ по верхнему теченію притоковъ Кубани, будучи отділень отъ кавказскаго тетерева широкимъ ноясомъ горныхъ лъсовъ по съверному склону Кавказскаго хребта. Но за исключеніемъ лъсовъ въ нижнемъ поясь съвернаго склопа Кавказскаго хребта, обыкновенный тетеревъ на Кавказт никогда не жилъ: альпійская область Большого и Малаго Кавказа занята кавказскимъ тетеревомъ, въ горныхъ лъсахъ тетеревовъ нѣтъ.

Что касается общирной площади, ограниченной съ съверо-востока линіей, которая идетъ отъ Петербурга къ устью Камы, съ востока— Волгой до Сызрани, съ юго-востока—линіей, идущей отъ Сызрани къ Кременцу, и съ запада—западной границей государства, то здъсь тетеревъ еще весьма обыкновененъ, если не повсемъстно, то на большей части протяженія этой площади. Въ центральной Россіи особенно замътно исчезновеніе описываемой птицы въ Орловской губерніи и вообще около населенныхъ центровъ, о чемъ, впрочемъ, уже было упомянуто.

Что касается Азін, то въ Сибпри на сѣверѣ тетеревъ доходитъ до 68° с. ш. на Енисеѣ и только до 63° на Ленѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ не переходя къ востоку за Лену. Въ южной Сибпри тетеревъ очень обыкновененъ и идетъ къ востоку гораздо далѣе, чѣмъ въ сѣверной, именно до Уссури, спускаясь къ югу до Манчжуріи. Однако, до Тихаго океана тетеревъ не доходитъ. Кромѣ того, тетеревъ распространенъ въ подходящихъ мѣстахъ сѣверной полосы Киргизскихъ степей и въ сѣверо-восточной части Туркестана, на высотѣ отъ 6,000′ до до 10,000′ н. у. м.

Выше уже было сказано, что любимое мъстонахождение тетерева составляетъ область островныхъ лъсовъ, съ извъстнымъ отношениемъ между чередующимися лиственными лъсами и полями. Къ этому необходимо еще прибавить близость ягодниковъ, и именно любовь къ

ягодамъ дълаетъ для тетерева возможной жизнь въ открытой степи, гдъ ягодные кустаринки доставляютъ птицъ одновременно и необходимый кормъ и хорошую защиту. Близость человъка, если только онъ не является безнощаднымъ истребителемъ, не пугаетъ тетерева, который можетъ житъ даже на очень близкомъ разстояни отъ него. И потому при умълой охотъ тетерева можно сохранить даже безъ замътнаго уменьшения въ числъ въ любой части его области, если только этому не пренятствуетъ вырубка лъса и въ степи—распашка послъщей.

По образу жизни тетеревъ—осъдлая птица. Мъстами, безкормица и глубокій снъгъ заставляютъ его глубокой зимой оставлять свои гнъздовыя мъста и переселяться болъе или менъе далеко отъ нихъ, но эти переселенія не имъютъ характера правильныхъ перелетовъ.

Годичный циклъ жизненныхъ явленій у тетерева складывается слѣдующимъ образомъ: съ приближеніемъ весны тетерьки оставляютъ косачей, съ которыми зимою образуютъ обыкновенно смѣшанныя стан, и какъ тѣ, такъ и другіе приближаются къ токовищамъ. Съ начала весны и до конца ея длится брачный періодъ, когда самцы токуютъ, а самки устраиваютъ гиѣзда и откладываютъ яйца. По окончаніи тока косачи, подобно всѣмъ полигамическимъ птицамъ, не принимающіе участія въ семейной жизни, забираются въ крѣпь и линяютъ, тетерьки же по выводѣ дѣтей перебираются вмѣстѣ съ послѣдними на гари, порубы и другія мѣста, изобилующія ягоднымъ кормомъ. Съ начала осени тетерева стадятся и, начиная отсюда и до конца зимы, живутъ общественною жизнью, вмѣстѣ летая на кормежку, на ночлегъ и т. д.

Въ связи съ жизнью въ чрезвычайно различныхъ условіяхъ, періодическія явленія въ жизни тетерева, конечно, измѣняются. На сѣверѣ тетеревъ живетъ по сѣчамъ и гарямъ, въ чернолѣсьѣ по долинамъ рѣкъ, даже по окраинамъ чистаго краснолѣсья. Въ Туркестанѣ п Забайкальт тетеревъ живетъ въ горныхъ, преимущественно хвойныхъ лъсахъ, и какъ тамъ, такъ и здъсь на зиму перебирается въ лъса и кустарники ръчныхъ долинъ и даже острововъ. Иногда эти переселенія изъ горъ въ низменности принимають въ восточной Сибири очень больше разм'єры, складываются въ перелеты на и всколько сотъ верстъ, но эти передеты—лишь до крайности развитыя кочевки, какія наблюдаются въ съверныхъ губерніяхъ Россіп. Въ послъднихъ тетерева, состадившись, еще съ осени неребираются изъ болве отдаленныхъ мѣстъ къ жилью человѣка, собственно къ его паниямъ, замъняя ягодный кормъ хлъбнымъ, а потомъ занимаютъ онушки березовыхъ лъсовъ и начинаютъ кормиться березовыми почками. Наименъе эти перекочевки выражены въ средней Россіи, какъ благодаря характеру м'встности, такъ и благодаря тому, что хлібот не остается надолго въ полъ, а убирается на гумна почти сейчасъ же послъ окончанія полевыхъ работъ. Въ степной полосѣ кочевки тетерева опять выражены р'язче: въ септябръ тетеревиныя стан покидаютъ кустарныя заросли и сваливаютъ въ рфчиыя уремы, или просто въ дубовые и

березовые лъса и рощи, гдъ кромъ березовыхъ почекъ питаются также желудями. Но это все частности, къ которымъ мы еще верпемся при подробномъ описаніи образа жизни тетерева въ разныя времена года. Въ общемъ же приведенная схема смъны періодическихъ явленій въжизни описываемой птицы върна для всякой мъстности и это поможетъ намъ съ большею легкостью слъдить за разнообразіемъ въчастностяхъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ. В **Е С** Н **А**.

Ī

Весенній образъ жизин тетерева.

Описаніе образа жизни тетерева мы начиемъ съ того времени, когда зима подходитъ къ концу и вмъстѣ съ иъсколько удлиняющимися днями тетерева начинаютъ чаще вылетать изъ чащи лъса, гдѣ держались до тѣхъ поръ, на опушку, чтобы погръться на солнышкѣ. Въ полуденные часы ихъ теперь подолгу можно видѣть сидящими на деревьяхъ лѣсныхъ окраниъ, недалеко отъ мѣстъ будущихъ токовъ. Въ то же самое время тѣ стан, которыя улетали далеко отъ своихъ родныхъ мѣстъ, возвращаются къ послъднимъ и, слъдовательно, всюду, гдѣ есть эти итицы, остаются только мѣстовыя.

Спустя еще немного времени смъщанныя стан разбиваются, такъ какъ тетерьки оставляютъ косачей, начиная вести самостоятельную и при томъ одиночную жизнь, а косачи въ свою очередь уже не такъ держатся другъ друга какъ прежде. Такимъ образомъ доживаютъ они въ средней Россіи до половины марта, и вм'яст'я съ первыми признаками весны передъ восходомъ солнца впервые раздается бормотанье самаго стараго самца въ став, ея бывшаго вожака. Сначала онъ бормочетъ какъ-то нервшительно и недолго, но по мърв того, какъ становится теплъе, онъ входитъ все въ большій и большій азартъ, увлекая за собою и своихъ бывалыхъ товарищей. Молодые косачи, еще не фигурировавшие въ прошлогоднихъ токахъ, сначала съ видимымъ недоумфиьемъ относятся къ незнакомымъ звукамъ, не принимая никакого участія въ токованін своихъ болье старыхъ товарищей; но потомъ они также начинаютъ отзываться на нихъ, тъмъ самымъ еще болѣе подзадоривая стараго токовика, и, наконецъ, дружное токованье тетеревовъ оглашаетъ лъсъ, будучи слышно по зарямъ за 2—3 версты. Первое время тетерева токують на деревьяхъ. Съ красными набухшими бровями, вытянувъ шею, распустивъ крылья и присъдая, бормочетъ и чуфыкаетъ старый токовикъ на сукъ, день ото дня все громче и дольше. А тъмъ временемъ весна совсъмъ вступаетъ въ свои права; въ воздухъ звенятъ трели жаворонковъ, по ръкамъ тянутъ утки и нырки, чибисъ назойливо пристаетъ къ каждому проходящему и провъжающему мимо избранной имъ полянки съ своимъ "чьи-вы"... И вотъ токовикъ, войдя въ полный азартъ, слетаетъ на токовище, куда за нимъ слъдуютъ и его товарищи, тъ, которые постарше, держась поближе къ нему, болъе молодые—по краямъ токовища. Токъ теперь въ самомъ разгаръ, и въ средней Россіи это обыкновенно приходится на первую половину апръля. Вмъстъ съ слетомъ на токовище косачи начинаютъ вступать въ драки другъ съ другомъ, токованіе по утрамъ затягивается все дольше и дольше, продолжаясь до 9—10 часовъ, а нослъ этого они улетаютъ въ лѣсъ на кормежку, гдѣ и остаются до вечера.

Въ разгаръ тока тетерева подлетаютъ къ токовищу уже вечеромъ, токуютъ здѣсь, какъ утромъ, только слабѣе, и ночь проводятъ около токовища же, куда вылетаютъ еще задолго до солнечнаго восхода, когда темно. Тетерьки сначала держатся далеко отъ токовищъ, потомъ подлетаютъ къ нимъ и разсаживаются по деревьямъ ближней опушки, охорашиваясь на глазахъ своихъ кавалеровъ, наконецъ слетаютъ на самое токовище.

Вотъ самый общій очеркъ весенняго образа жизни тетерева, необходимый, чтобы болъе детальное описаніе не помѣшало составить объ этомъ важномъ періодъ общаго представленія. Переходимъ тенерь къ подробностямъ.

За правило надо считать, что каждая зимняя стая имфетъ свое собственное токовище; слъдовательно на токовищъ можно встрътить лишь столько тетеревовъ, сколько ихъ было въ стаѣ, или приблизительно столько, потому что хотя обыкновенно зимняя стая тетеревовъ состоитъ изъ самцовъ и самокъ, иногда последнія держатся отдельно н въ такомъ случат на току съ тетерьками будетъ больше особей, чъмъ ихъ было въ стаъ, состоящей исключительно изъ косачей. Такимъ образомъ, въ извъстной мъстности всегда можно надъяться встрѣтить столько же токовъ, сколько здѣсь зимою было стай, и кромѣ того, зная численность зимнихъ стай, опредълить и численность участвующихъ въ токахъ тетеревовъ. Такъ, близъ населенныхъ центровъ, гдѣ тетеревиныя стайки зимою содержать по 10-20 особей, и тока бываютъ столь же малочисленны; напротивъ, въ мѣстностяхъ мало населенныхъ, какъ, напр., въ губ. Архангельской, Пермской, Уфимской, даже Нижегородской и кой-какихъ среднихъ, зимнія стан пер'єдко достигаютъ 50-100 и даже 200 особей, и соотвътственно этому тока очень многочисленны. Но если зимнія стан очень мелки, въ такихъ случаяхъ тетерева одной могутъ соединиться на току съ тетеревами другой; тогда какъ тамъ, гдф зимой стан очень велики отъ тетеревовъ, прибывающихъ изъ другихъ мѣстъ, количество токующихъ особей меньше количества особей зимнихъ стай, отъ которыхъ пришлецы заранъе отбиваются, улетая въ свои родныя мъста. Вотъ почему на Уралъ, гдъ зиминя стан доходять иногда до 500 особей, на токовищъ больше 200 не встръчается.

Мъсто, гдъ токуютъ тетерева, чрезвычайно ностоянио: десятки лътъ слетаются на извъстное мъсто тетерева длиннаго ряда смъняющихся поколтвній и только крайность, т.-е. преслідованіе промышленниками или изм'вненіе характера токовина д'ятельностью челов'ька, заставляеть ихъ перемъщть мъсто тока. При пеосторожной стръльбъ изъ шалашей тока временно также разстранваются, и напутанныя птины обыкновенно собпраются уже въ и/которомъ отдалени отъ постояннаго токовища, на одномъ или изсколькихъ побочныхъ, но своевременное прекращение такой охоты даетъ возможность тетеревамъ опять собраться на старомъ токовищь, если не въ этотъ, то въ следующій годъ. Однако исключение въ этомъ отпошении представляетъ лъсистая часть восточной Сибири: здёсь тетерева токують на пашиб и почти ежегодно перембияють м'всто тока, не выходя, впрочемъ, изъ изв'ястнаго района. Близъ большихъ городовъ, гдв тетерева разбиты преслъдованіемъ и не собпраются зимою въ стан, общихъ токовищъ совстить натъ и каждый косачъ токуетъ самъ по себт, поодиночкъ. Для этого онъ выбираетъ себф небольшую лфсиую полянку или лужайку среди кустовъ и мелколъсья и токуетъ такъ же, какъ токовалъ бы на общемъ токовищъ, лишь безъ столкновения съ соперниками. Сюда же къ нему прибъгаетъ заслышавшая его самочка.

Обыкновенно м'встомъ токовища служить инфокая л'всная опушка, мысками выбъгающая въ лугъ или поле и поросшая ръдкими кустами и деревцами, или лъспая поляна, съ разбросанными по ней тамъ и сямъ березками, и лежащая, конечно, недалеко отъ опушки. Высота м'вста безразлична для выбора токовища: тетерева токуютъ и на низкихъ мѣстахъ, даже на болотахъ, лишь бы токовище посило указанный характеръ. Сравнительно редко токуютъ тетерева на совершенно открытыхъ мъстахъ, но и въ такомъ случат всегда неподалеку отъ лъса. Въ долинахъ лѣсныхъ рѣкъ, заливаемыхъ водою, напр., въ Ярославской губ., тетерева токуютъ на поросшихъ рѣдкими лѣсами песчаныхъ гривахъ. Иногда, въ лъсной мъстности, токовище располагается на вершинахъ лъсного пригорка, гдъ снъгъ сдувается вътромъ и гдъ проталины появляются ран'ве, или въ перел'вскахъ, соединяющихъ два большіе участка лівса. Въ области крупнаго сплошного лівса мівстомъ для тока выбирается лъсное, большею частью моховое болото, съ разбросанными по немъ сосенками, чахлымъ березнякомъ и кустиками, или, наконецъ, ръдкое мелколъсье. Слъдовательно, въ такихъ мъстахъ тетеревиное токовище находится въ непосредственной близости отъ глухаринаго, но и при этомъ мѣста названныхъ токовищъ совершенно различны. Одно изъ самыхъ оригинальныхъ мъстъ токованья тетеревовъ составляютъ чистыя, довольно удаленныя отъ лъса болота, поросшія р'адкимъ камышомъ, иногда совствуь безъ кустарниковъ. Такія токовища указываетъ П. Кирвевскій для Орловской губ., Л. П. Сабан вевъ для южной части Екатеринбургскаго у.

Наконецъ, въ лѣсистой и богатой водой мѣстности, какъ, напр., въ области Мологи и Шексны или Вятки, токованье тетеревовъ въ

половодь в происходить совершенно особеннымъ образомъ-на деревьяхъ. Нормально тетерева токуютъ здёсь въ речныхъ лугахъ, но съ разливомъ последніе затопляются, и надъ водой остаются только самые высокіе прир'вчные бугры или гривы. "Кусты и мелкій л'всъ, говорить про Шексиннскую мъстность Н. Гладковъ, –покрываются такъ, что иногда ихъ вовсе не видно, иногда же торчатъ одић верхушки. Большой лъсъ растетъ какъ бы въ водъ, и странное зрълище представляють высокія лиственныя и хвоїныя деревья, подымающіяся какъ будто со дна озера. Қартина этихъ разливовъ великолъпна, въ особенности въ ясный, теплый и тихій весенній день, послѣ того, какъ разсвется утренній туманъ: какъ огромное зеркало, растилаются они; береговъ не видно, но однообразія изть, вездіз мелькають полупотопленные л'яса и небольние островки... Тучи утокъ, въ особенности черныхъ, покрываютъ открытыя мъста и шнырятъ между полузатопленными кустами и деревьями. Стан гусей, а пногда и лебедей, держатся по краямъ ихъ, и съ крикомъ, въ особенности по зарямъ, перелетаютъ съ мъста на мъсто. По берегамъ разливовъ, преимущественно на островахъ, сосредоточивается всевозможная дичь, и притомъ иногда на небольшомъ пространствѣ: тамъ найдете вы и дупелей, и бекасовъ, и вообще всю куличью породу, множество утокъ и весьма часто даже въ большомъ множествъ запцевъ. Иногда въ числъ мирныхъ обитателей острова попадаются и хищники: лисицы и волки, захваченные врасплохъ разливающеюся водою, принуждены бываютъ искать убъжища на островахъ. На нихъ же скучиваются мъстныя куропатки и тетерева, согнанные туда со всего околотка". При недостаткъ мъста тетерева, какъ косачи, такъ и курочки, размъщаются на вътвяхъ деревьевъ, нависшихъ надъ водой, и первые токуютъ на нихъ, вытягивая шею, опуская крылья и бормоча совершенно такъ, какъ дѣлали бы это на землъ. Но начиная здъсь токовать раньше, чъмъ въ другихъ мфстахъ, тетерева и кончаютъ свое токованье раньше-уже часамъ къ шести.

Размѣръ токовища до извѣстной степени соотвѣтствуетъ количеству токующихъ тетеревовъ, и потому опытный охотникъ, осмотрѣвъ токовище, можетъ до извѣстной степени опредѣлить, сколько на немъ соберется косачей. Обыкновенно размѣръ токовища 10—20 саженей въ поперечникѣ, но есть токовища въ нѣсколько сотъ квадратныхъ саженей. Такъ какъ тетерева въ огромномъ большинствѣ случаевъ, т.-е. всегда, когда могутъ, токуютъ на некосѣ, то токовище всегда можно узнать по вытоптанной ветопи, особенно выбиваемой въ центрѣ, гдѣ происходятъ наиболѣе ожесточенныя драки.

Продолжительность періода токованія изм'вняется въ довольно большихъ пред'влахъ въ зависимости отъ географическаго положенія м'встности и общаго хода весны. Вообще тетеревъ начинаетъ токовать спустя дней 10—14 и даже бол'ве посл'в начала токованія глухаря. Въ средней полость Россіи первое бормотанье раздается около середним марта, въ южной—въ началть, на стверть—въ концть этого

мѣсяца и даже гораздо поздиѣе, въ апрѣлѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ первое время токовикъ или "заводатай", какъ его зовутъ мѣстами, начинаетъ играть сравнительно поздию, часу въ 6-мъ, т.-е. незадолго до восхода солица; поздиѣе, въ кониѣ марта и начатѣ апрѣля токовање начинается около 4-хъ часовъ утра, въ кониѣ апрѣля—въ 3-мъ часу, въ маѣ даже во 2-мъ часу ночи. Въ Лапландіи, гдѣ въ маѣ солнце постепенно почти перестаетъ скрываться за горизонтъ, тетерева, начиная токовать вечеромъ, токуютъ всю ночь.

Въ апрълъ токовање и въ средней Россіи распадается каждый день на два періода: вечерній и утренній, изъ которыхъ первый пачинается часовъ въ 7 и продолжается до заката солица. Послѣ вечерняго токованья тетерева не улетаютъ съ токовища, а почуютъ неподалеку отъ него; иѣкоторые остаются даже на самомъ токовищѣ. Утромъ, еще до свѣта, раздается голосъ главнаго токовика и, заслышавъ его, тетерева опять спѣшатъ на токовище съ своихъ ночлеговъ. Ежедневная продолжительность токованія также увеличивается по мѣрѣ того, какъ развивается любовная страсть птицы. Сначала тетерева перестаютъ токовать уже спустя 2, много 3 часа послѣ восхода солица, но въ разгаръ тока и, непремѣнно при хорошей погодѣ, токованье длится даже до 10 час. утра, послѣ чего тетерева улетаютъ на кормежку въ чащу лѣса, гдѣ остаются до слѣдующаго токованья. Самые азартные косачи въ это время даже совсѣмъ не улетаютъ отъ тока, а остаются у его окраниъ, гдѣ кормятся.

Въ мартъ утренніе морозы, усиливаясь, часто оказываютъ задерживающее вліяніе на токованье тетеревовъ, которые, побормотавъ на деревьяхъ, часто совсъмъ не слетаютъ на землю. Въ апрълъ, когда снъгъ почти сходитъ и нормально сильныхъ утренниковъ не бываетъ, тетерева ежедневно слетаютъ на землю, оставаясь здъсь все дольше, съ тъмъ, чтобы въ матъ уже совсъмъ не садиться на деревья.

Собственно токъ продолжается до послѣднихъ чиселъ мая, но въ послѣднее время на токовище прилетаютъ лишь одни косачи безъ тетерекъ, и токованье продолжается очень недолго, оканчиваясь уже съ восходомъ солнца. Вечернихъ токованій въ это время не бываетъ, но косачи прилетаютъ на токовище вечеромъ между 8 и 9 часами и ночуютъ поблизости отъ него. Послѣдними токуютъ молодые тетерева, которыхъ можно слышать еще въ іюнѣ и даже въ іюлѣ, однако это представляется уже исключеніемъ. Вообще средняя продолжительность токованія равняется 6—7 недѣлямъ и именно въ это время производится весенняя охота на тетеревовъ.

Токованье тетеревовъ разныхъ видовъ, въ томъ числѣ и нашего косача, представляетъ наиболѣе типичную форму этого явленія, наблюдаемаго также у другихъ полигамическихъ птицъ. Въ сущности токъ есть не что иное какъ состязаніе самцовъ изъ-за обладанія самками, для чего самцы, съ одной стороны, стараются обратить на себя вниманіе самокъ, принимая своеобразныя позы и издавая особенные звуки, съ другой—просто стремятся пріобрѣсти верхъ надъ своими

соперниками въ открытой схваткъ. Такимъ образомъ издаваемые токующей итицей звуки заслуживаютъ особеннаго вииманія, но опиточно было бы приписывать этимъ звукамъ только значеніе зова и любовной иъсии: прежде всего въ инхъ выражается вившимъ образомъ половое возбужденіе птицы и то или другое спеціальное значеніе этихъ звуковъ вырабатывается, такъ сказать, на указанномъ общемъ фоиъ.

Надаваемые токующимъ косачомъ звуки называются у охотниковъ "бормотаньемъ" и "чуфыканьемъ" или "чуфысканьемъ", и разнятся между собою какъ по характеру, такъ п по значеню. Бормотанье, повидимому, служитъ именно общимъ выражениемъ полового возбужденія, "составляеть,—по словамъ Л. П. Сабанъева,—какъ бы основной мотивъ весенней изсии", чуфысканье, напротивъ, является призывнымъ звукомъ. Какъ выше упомянуто, подлетающие къ токовищу косачи, сидя на деревьяхъ, сначала только бормочутъ, и передать словами это бормотанье изтъ никакой возможности. Напоминаетъ оно и очень сильное и ръзкое голубиное воркованье, и даже, до нЪкоторой степени, отдаленный барабанный бой, но не слыхавши его, о немъ нельзя составить понятія, а услыхавъ хотя разъ, можно узнать безъ всякаго труда. Чуфысканье болъе или менъе удачно передается звуками "чуф-фы" и Л. П. Сабанвевъ сравниваетъ его съ гусинымъ шипъніемъ, что однако, по-моему, не совсъмъ върно. Прилетввъ на токъ, тетеревъ сначала издаетъ разъ или два звуки "чуффы", затьмъ тоже разъ или два какъ бы варіацію этихъ звуковъ въ родъ "чу-уу-ууфъ". Потомъ опять идетъ простое чуфысканье, опять чуфысканье въ измѣненномъ видь и такъ иъсколько разъ, послъ чего уже слъдуетъ бормотанье. "Чуф" тетеревъ произноситъ сильно и быстро, "фы" — тихо и отрывисто; подобнымъ же образомъ въ варіаціи этого звука "чу" произносится сильно и быстро, а "ууууфъ" тихо и протяжно. Побормотавин, тетеревъ опять чуфыскаетъ и т. д.

Я уже упоминаль, что оба звука, конечно въ тихую погоду, слышны за 2—3 версты; но чуфысканье слышно на меньшемъ разстояніи, нежели бормотанье, конечно преимущественно благодаря тому, что бормочуть тетерева цѣлымъ хоромъ. Тѣмъ не менѣе, не зная мѣста тока, можно сильно ошибиться въ опредѣленіи направленія и разстоянія, откуда несутся звуки. Тетеревъ, токуя, не только поворачивается въ разныя стороны, но еще перебѣгаетъ по току и потому звукъ раздается то глуше, то сильнѣе, то съ одной стороны, то съ другой. Важное значеніе нмѣетъ также и то, что тетеревъ токуетъ, пригибая шею къ землѣ, такъ что звукъ отчасти отражается, отчасти скрадывается растеніями, кочками и т. п.

Старый токующій косачъ съ красными напухшими бровями, опущенными крыльями и развернутымъ вѣеромъ хвостомъ очень красивъ. Точно такъ же красивъ онъ и тогда, когда слетаетъ на токовище, сзывая чуфысканьемъ своихъ товарищей и въ то же время противниковъ. Но и молодые тетерева присутствуютъ на токахъ, воз-

буждаемые примъромъ старшихъ, только они держатся на самыхъ окраннахъ токовища и хотя ходятъ подобно старымъ тетеревамъ, по почти совсъмъ не распускаютъ хвоста въеромъ и не скребутъ но землъ крыльями.

До разсвъта на току бывають только косачи и тъ токуютъ слабо, съ остановками; но какъ только разсвънетъ, на токъ начинають прилетать тетерьки, и ихъ присутствие быстро изм'яняеть характеръ токованья; косачи начинають токовать съ большимъ азартомъ и вступають въ ожесточенныя драки другь съ другомъ. Дерутся косачи клювомъ, ногами и ударами крыльевъ, иногда схватываются по нъскольку вмъстъ, и случается, что въ общей свалкъ какому-инбудь изъ бойцовъ особенно не повезетъ и опъ, сильно истренанный, едва уплетется съ мъста побонща. Однако разсказы, что такія побонща оканчиваются даже смертью одного изъ бойцовъ, относятся къ области преувеличеній. Поводомъ къ драків служить не одно желанье одольть протившика, чтобы овладъть самкой: новидимому, драки часто возникаютъ изъ-за желанія владіть извітетнымъ містомъ, которое ревниво охраняется отъ притязаній другихъ токовиковъ. Опытные охотники утверждаютъ, что каждый тетеревъ имветъ свое любимое мъсто какъ на деревъ, такъ и на землъ, но право сильпаго часто ведеть къ потеръ такового, вслъдствіе столкновенія съ болье сильнымъ противникомъ. Съ этой стороны въ исключительномъ положении находится только токовикъ, который, какъ самый сильный и смълый, можно сказать, владъетъ всьмъ токомъ и токуетъ тамъ, гдъ ему это нравится въ данную минуту.

Пожалуй, все сказанное о тетеревиномъ токъ породитъ миъніе, что токующіе тетерева ничего не видять и не слышать вокругь себя; но это было бы совершенно неосновательно. Напротивъ, токующіе тетерева очень осторожны и, по словамъ г. Ушкова, "подойти къ нимъ близко — невозможно, такъ какъ у нихъ всегда есть сторожъ; въ общей массъ его замътить трудно, но если наблюдать внимательнѣе, то можно видѣть, что онъ всегда находится на своемъ посту и чутко сторожитъ своихъ товарищей. Весной 1873 года, —продолжаетъ г. Ушковъ, – я наблюдалъ за токованьемъ тетеревей изъ шалаша, устроеннаго вблизи токовища, и тутъ я замътилъ, что во все время токованья, одниъ, а иногда и два косача сидъли на деревъ и зорко осматривали окрестность. Когда сторожевой косачъ оставлялъ свою обсерваторію—на его м'єсто вскор'є являлся другой, а можеть быть и тотъ же самый, чего я, къ сожальнію, проследить не могъ. Въ одно утро замѣтилъ я медленно приближавшагося къ токовищу ястреба-тетеревятника, зам'ттилъ его также съ своего дерева и сторожъкосачъ и, рѣзко чуфыкнувъ, слетълъ на токовище, гдѣ моментально водворилась мертвая тишина. Когда съ удаленіемъ ястреба миновала опасность, тетерева затоковали снова". Однако, извъстно иъсколько случаевъ, когда во время драки косачи не только подпускали къ себъ охотника на близкое разстояніе, но даже позволяли схватить себя

руками; все дъло въ томъ, что у этихъ косачей, за ихъ малочисленпостью, не было сторожа, сами же они черезчуръ увлекались ссорой другъ съ другомъ. Одинъ изъ самыхъ интересныхъ случаевъ подобнаго рода разсказанъ Е. Прокудинымъ-Горскимъ, въ следующихъ словахъ: "18 апръля 1862 г., утромъ, часа въ четыре, шелъ изъ деревни Коленовой къ моей деревиъ молодой крестьянинъ. На пути, проходя чрезъ перелъсокъ, опъ услыналъ вблизи дороги чуфысканье двухъ чернышей, что и побудило его остановиться. Притаясь за кустъ и вемотр'явшись, онъ увидълъ на небольшой полянъ, между кустовъ, двухъ тетеревовъ, сидъвшихъ въ оборонительномъ другъ противъ друга положеній съ вытянутыми раздутыми шеями и широко распущенными коспцами. Одинъ изъ нихъ, повидимому, былъ старый токовикъ, а другой прошлогодній. Они готовились на единоборство. Старикъ не трогался съ мъста и только шипълъ, выжидая нападенія молодого сопершика; а этотъ задорился, подпрыгивая, и порывался сцепиться въ драку. Турниръ, какъ кажется, былъ любовный изъ-за красавицы тетерьки, сидъвшей на ближней березъ. По прошестви нѣсколькихъ минутъ, проведенныхъ въ приготовленіяхъ, бойцы распустили крылья и съ яростью кинулись одинъ на другого, и перья полетьли. Старикъ скоро очутился на молодомъ, вибиился ему въ шею и сталъ бить мощными крыльями. Крестьянинъ далъ время птицамъ распалиться какъ можно бол ве и, изловчившись, бросился изъ-за куста на мъсто побощца, проворно схватилъ ихъ объихъ за шеи, и растащилъ. Соперники не испутались внезапнаго сторонняго нападенія и не обращая вниманія на то, что оба попали въ полонъ, все еще усиливались даже въ рукахъ крестьянина снова сцепиться; старикъ однакоже скоро спохватился—онъ рванулся, вырвался и быстро исчезъ изъ виду. Молодой же остался въ рукахъ и какъ ни барахтался, но освободиться не могъ. Крестьянинъ въ то же утро принесъ его ко мит въ совершенной цълости. Я пустилъ его въ комнатъ, и онъ не оказывалъ ни малъйшаго намъренія улетъть, писколько не бился и сидълъ въ утлу, какъ бы сконфуженный. Если подходила къ нему моя лягавая собака и дълала стойку, то онъ распускалъ въеромъ хвостъ и, вытянувъ шею, шипфлъ какъ гусакъ".

На этомъ можно закончить описаніе повадокъ косачей въ ихъ брачный періодъ, по такъ какъ подробное описаніе отдъльныхъ явленій въ жизни птицы не даетъ общей картины этихъ явленій, то я считаю необходимымъ дать именно такое картинное описаніе тока, тъмъ болъе, что оно съ истинно-охотинчьей страстью составлено покойнымъ Л. П. Сабанъвымъ.

"Прежде всъхъ, едва только на востокъ забрезжится бълая полоса утренней зари,—пишетъ г. Сабанъевъ,—прилетаетъ токовикъ. При первомъ чуфысканыя его — десятки косачей, почевавшихъ въближнихъ кустахъ, откликаются на призывъ своего старъйшины и вожака, и вскоръ съ шумомъ, одинъ за другимъ, слетаются на токъ,— сначала на деревья, если они есть здъсь, а затъмъ, въ срединъ весны,

уже прямо на землю. Распустивъ хвостъ, раздувъ шею, безпрестанно наклоняясь къ землъ, токовикъ начинаетъ бормотать—сначала тихо, глухо и съ болве или менве значительными нерерывами; но чаще и чаще, громче и громче, все свободиве льются весенніе звуки-это уже какое-то яростное клокотаніе, прерываемое дикимъ шитвніемъ. Токовикъ растоковался, одинъ за другимъ слетаются на призывное бормотаніе его младшіе товаршци. Со всіхть сторонть во мракті темной весенней почи слышенъ шумъ отъ слетающихся косачей. Свистя крыльями, низко падъ землей летятъ опи; сдълавъ кругъ, садятся на токъ и, въ свою очередь распустивъ крылья и надувнись, принимаются бормотать. Еще изсколько минуть... и всюду забзвали темпыя твии, мелькая своими бъльми подхвостьями. Все громче и громче бормочетъ, все чаще и чаще припархиваетъ токовикъ, какъ бы привътствуя каждаго новаго члена сборища; со всъхъ сторонъ неистово вторятъ ему соперники, стараясь затмить своего опаснаго противника. Это уже цълое море звуковъ, смутно напоминающихъ то отдаленный рокотъ водопада, то гулъ многочисленныхъ барабановъ. Далеко, далеко несутся эти дикіе, по очаровательные звуки—и какой охотшикъ, даже не охотникъ равнодушно слышитъ эту первую пъснь любви оживающей природы!...

"Свътаетъ. Давно померкла утренняя звъзда и заалълъ востокъ, отбрасывая лиловыя холодныя тъни на причудливые выступы облаковъ горизонта. Засинъли темные силуэты ближнихъ елей и сосенъ, забълъли съроватые призраки еще едва распускающихся березъ, ръзче выдъляются ихъ очертанія. Лъсъ пробуждается и вторитъ своимъ запваламъ: защелкалъ въ кустахъ недавно прилетввшій и нераспвышійся соловей, но все могучте и свободите слышится птіснь царя пъвцовъ; на вершинъ ели засвисталъ черный дроздъ, запинькали зяблики—цѣлый хоръ пернатыхъ радостно привътствуетъ просыпающееся утро. Громче и задорнъе, какъ бы подстрекаемые соревнованіемъ, шипятъ и бормочутъ косачи; ихъ черныя, какъ крыло ворона, перья ръзко выдъляются на желтоватомъ фонъ прошлогодней, но уже вытертой и вытоптанной ветоши, сквозь которую пробивается яркозеленая молодая травка. Полныя злобы, разъяренныя птицы съ разинутымъ клювомъ, какъ угорѣлыя мечутся во всѣ стороны, сталкиваются, сцвпляются: всюду слышится трескъ крыльевъ, летятъ перья. Всего же болъе стараются самые старые, самые яркобровые косачитоковики, считающие себя полными хозяевами тока; всюду шмыгаютъ они, сшибаясь съ первымъ встрътившимся противникомъ, отгоняя слабыхъ и юныхъ, только недавно прилет вишихъ самцовъ на окраины токовища. А въ центръ происходитъ настоящая свалка: по три-четыре и болъе задорныхъ самца щиплютъ, наскакиваютъ одинъ на другого, уже не разбирая своего настоящаго антагониста. Это какой-то движущійся безформенный черный клубокъ, изъ котораго отдѣляется то одинъ, то другой побъжденный. Опустивъ голову къ землъ, шатаясь, нерѣдко оставляя кровавый слѣдъ, отбѣгаетъ онъ въ окрестные кусты, или вовсе улетаетъ съ арены; по мѣсто его вскорѣ занимается другимъ бойцомъ. Токъ въ самомъ разгарѣ... еще нѣсколько минутъ—и онъ начинаетъ видимо рѣдѣть: поле битвы остается за токовиками и взрослыми косачами, еще не нашедшими себѣ равносильныхъ соперниковъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ оно расширяется: юные косачи, наученные опытомъ, стараются держаться въ сторонѣ отъ сильныхъ и дерутся поодаль, улетая иногда за нѣсколько сотъ шаговъ на побочные тока.

"Неужели однако тетерьки не винмають этимъ страстнымъ звукамъ, не слынатъ шума драки, не обращаютъ шкакого винманія на ожесточенныя битвы своихъ будущихъ, хотя и случайныхъ супруговъ? Нътъ!.. Онъ уже давно сидятъ поодаль на деревьяхъ или въ кустахъ; здъсь и тамъ — всюду слышится ихъ, сначала тихое и нъжное, кокотаніе, еще болъе подзадоривающее токующихъ самцовъ. Вылетъвъ на разсвътъ съ ночлеговъ, тетерьки сначала лъниво пощинывали надувнияся почки березы и сережки осины, охорашивались и перебирали клювомъ перья, вытянувъ шею, прислунивались къ отчетливо доносящемуся бормотанью своихъ черныхъ, краснобровыхъ кавалеровъ—и, наконецъ, сначала робко, затъмъ смълъе откликаются на ихъ зовъ. Перелетывая съ дерева на дерево, какъ бы притягиваемыя невидимой силой, послушныя голосу природы, все ближе подлетаютъ онъ къ мъсту драки.

"Шпрокимъ заревомъ разгорается утренняя заря. Лучи еще невидимаго солица отражаются въ бълыхъ облакахъ ярко-алыми и розово-фіолетовыми переливами, р'язко отд'яляющимися отъ темной синевы и съроватыхъ тучъ западнаго неба. Скоро царь прпроды появится въ втиной краст своей, позолотятся вершины деревьевъ, побътутъ длинныя, безконечныя тфип... Слабый утренній вфтерокъ слегка защевелиль тяжелыя мохнатыя вътви елей. Пора! Пестрыя красавицы вылетаютъ на окранны зъса, полукольцомъ обхватывающаго широкую поляну съ знакомыми ръдкими кустиками и невысокими березами посрединъ. Отсюда несутся плънившіе ихъ голоса самцовъ — онъ уже видять ихъ и отрывистое кокотапье переходить въ страстные, зазывающіе звуки. Тетерьки хрипло вытягивають последнюю поту — "ростятся", и одна за другой, сначала всегда старыя, ранве всвхъ несущіяся, подлетають къ самому току. Воть одна выбъжала на середину арены: выпрямляя грудь, то изгибая и вытягивая шею и присъдая, проворно бъгаетъ она между бойцами, покуда уклоняясь отъ преслідованія. Наконець, тетерька приближается къ своему избраншику: распустивъ крылья, раздувшись подобно индійскому пътуху, бормочетъ счастливецъ и, ежеминутно кланяясь, принархивая и поворачиваясь въ ту или другую сторону, следить за всеми ея движеніями. Но вотъ нестрая красавица кокетливо подбъгаетъ, какъ бы заигрываетъ съ косачомъ: припадаетъ передъ нимъ, распускаетъ хвостъ, дрожа всёмъ теломъ, и вдругъ, ударивъ его клювомъ по шев, взлетаетъ на воздухъ. Вслъдъ за нею поднимается самецъ — и оба скрываются въ ближнюю рощу, кустарицкъ или осинникъ, гдф и проводятъ весь день почти до заката.

"Огненный дискъ солнца медленно выплываетъ изъ-за лъса. Быстро укорачиваются тъни, исчезаетъ туманъ, на горизонтъ зачернълъ дальній боръ, и яркіе лучи залили окрестности. Одинъ за другимъ покидаютъ токъ косачи, то убъгая, то улетая въ ближніе кусты и опушку лъса, вслъдъ за временными желанными гостями. Токъ съ каждою минутою пустъетъ. Молодые самцы, не подзадориваемые болъе стариками, еще бъгаютъ иъкоторое время, но ръже и ръже слышится ихъ бормотанье. Далеко не каждому выпадаетъ на долю счастье любви, напрасны ихъ ожиданія,— а голодъ даетъ себя чувствовать: черезъ два, много три часа умолкаетъ послъдній и летитъ въ чащу лъса похватать на скорую руку корма, а быть можетъ воспользоваться невърностію какой-либо легкомысленной курочки".

Чтобы покончить съ описаніемъ весенияго образа жизни косача, намъ остается сказать уже немногое.

Тетерька начипаетъ отъ времени до времени приближаться къ токовищу также еще до начала тока, но все-таки поздиће косачей. Сначала она прилетаетъ непадолго и, посидъвъ около токовища, послушавъ бормотанье своихъ будущихъ ухаживателей, улетаетъ прочь. Попозже, когда уже начнется настоящій токъ, тетерьки подлетаютъ къ токовищу обыкновенно незадолго до солнечнаго восхода или на самомъ восходѣ и либо садятся сначала на деревья, либо опускаются прямо на землю. За правило можно принять, что тетерекъ на току бываетъ гораздо меньше, чѣмъ косачей: на токахъ среднихъ размѣровъ одновременно 2—3, рѣдко 5; на самыхъ большихъ, какъ говорятъ, до 10. Причина этого заключается въ томъ, что при осеннихъ и зимнихъ охотахъ, особенно на чучела и съ подъѣзда, тетерекъ добывается, пожалуй, больше и уже никакъ не меньше косачей, такъ что число ихъ къ веснѣ сокращается весьма значительно.

Прилетъвъ къ токовищу, тетерька тихо клохчетъ изръдка, оставаясь на своемъ мъстъ, затъмъ выбъгаетъ на окрапну токовища, продолжая клохтать, но уже громче и чаще, и тьмъ самымъ обращаетъ на себя вниманіе косачей. О томъ, гдф тетерьки понимаются съ косачами, мижнія расходятся: одни утверждають, что туть же на току, другіе—что, напротивъ, всегда вдали отъ тока, куда тетерька улетаетъ въ сопровождении выбраннаго ею самца. По всей въроятности, върно и то, и другое, все зависить отъ полового возбужденія птицы, общаго хода тока и т. д. Какъ бы то ни было, оплодотворение тетерьки происходитъ всегда утромъ, и если она еще не начала класть янцъ, въ такомъ случав остается съ своимъ временнымъ сожителемъ часовъ до 4—5 вечера, забравшись въ кусты, иногда довольно далеко отъ токовища, гдф птицы кормятся. Вечеромъ косачи направляются къ току сравнительно рано, курочки же позднъе и неправильно, т.-е. не каждодневно. Чтобы онъ по вечерамъ понимались съ косачами-сомнительно; если же это и бываетъ, то только до начала кладки ящъ.

Разъ первое яйцо спесено, тетерька утромъ не остается надолго съ косачемъ, а удетаетъ съ тока къ гибзду, гдв и проводитъ все время до слъдующаго токованія.

Вообще говоря, тетерьки даже въ разгаръ тока ведутъ гораздо болбе однообразную жизнь, нежели косачи, проводя помногу часовъ въ чащѣ, гдѣ кормятся или отдыхаютъ, а потомъ и насиживаютъ яйца, тогда какъ у косачей большая частъ времени идетъ на токованіе и лишь немногіе часы на отдыхъ и кормежку. Этимъ и объясняется, что въ то время какъ косачи страшно изнуряются и истренываются, тетерьки, можно сказать, остаются какъ ни въ чемъ не бывало.

Слѣдовательно, косачи кормятся днемъ, но преимуществу въ полуденные часы. Кормъ ихъ, какъ и тетерекъ, въ это время года состоитъ изъ молодой травки, березовыхъ и осиновыхъ почекъ, молодыхъ сосновыхъ и еловыхъ шишечекъ, но, повидимому, никогда не употребляется самая хвоя. Въ серединъ апръля тетерева еще охотно взлетаютъ на деревья, ради любимыхъ березовыхъ и осиновыхъ сережекъ, но поздиъе кормятся исключительно на землѣ, посъщая даже прилегающія къ лъсу озимыя поля.

Передъ закатомъ солнца косачи, оставленные самками, отдохнувшіе и относительно сытые, оставляютъ лѣсъ и одинъ за другимъ летятъ къ токовищу. Тамъ, гдѣ ихъ много и гдѣ имъ приходится перелетѣть черезъ сравнительно большое открытое пространство, этотъ правильный вечерній летъ тетеревовъ невольно обращаетъ на себя вниманіе и хорошо извѣстенъ мѣстнымъ жителямъ. Какъ выше упомянуто, косачи, прилетѣвъ къ токовищу, токуютъ либо на деревьяхъ, либо на землѣ до заката солнца, а затѣмъ перебираются на опушку лѣса, въ близлежащіе кусты, даже въ некошеное болото, поросшее мелкимъ кустарникомъ, и тамъ ночуютъ.

Молодые косачи во всемъ слѣдуютъ примѣру старыхъ, подобно имъ токуютъ, подобно имъ же перелетаютъ для отдыха съ тока въ лѣсъ и обратно, хотя, играя совершенно второстепенную роль въ токѣ, они и не имѣютъ въ этомъ нужды, такъ какъ даже приблизительно не истрепываются въ такой степени, какъ старые самцы. Само собою разумѣется, что пониматься съ самками имъ приходится сравнительно рѣдко въ этомъ имъ мѣшаютъ въ разгаръ тока старые самцы. Но поздиѣе, когда токъ подходитъ къ концу, старые косачи удалятся въ крѣши, а тетерьки, ночему-либо потерявния яйца, спова выбѣгаютъ на токовище, и молодые косачи получаютъ свою долю участія въ про-изведеніи потомства.

Самочка несеть яйно всегда еще до восхода солица, послѣ чего летить на токъ. Вмѣстѣ съ кладкой послѣдняго яйца эти посѣщенія тока прекращаются и тетерька садится на яйца, чтобы ихъ высиживать. Въ средней полосѣ Россіи, при пормальномъ ходѣ весны, это приходится на половину мая и съ этимъ же временемъ совпадаетъ окончаніе наиболѣе горячаго періода токованія.

Теперь перейдемъ къ описанію многочисленныхъ способовъ весенней охоты за тетеревами, при чемъ невольно придется сдъдать кой-какія дополненія и въ описаніи образа жизни этихъ птицъ.

П

весенняя охота.

Охота съ подхода и на манку.—Охота на току.—Съ подътвада на лодкт.—Случайные способы охоты.—Промысловое добываніе тетеревовъ весною.

Какъ только зима начнетъ подходить къ концу, и сиътъ образуетъ хорошій насть, открывается и охота на тетеревовъ, невозможная въ разгаръ зимы изъ-за массы рыхлаго сиъга, недопускающаго охотиться съ подъезда. Въ марте тетерьки отбиваются отъ косачей и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаютъ вести одиночную жизнь, косачи начинаютъ вылетать изъ крфпей на опушку, гдф, разсфвинсь по деревьямъ, прислушиваются къ глухому и еще отрывистому бормотанью бывшаго вожака стан и вифстф съ тфиъ будущаго токовика, но настъ, благодаря утренникамъ, держитъ отлично и, слъдовательно, инчто не мъшаетъ охоти съ подхода. Охота эта и утомительна, и недобычлива, если не обладать исключительнымъ теривніемъ и выносливостью промышленника; поэтому она не должна быть и вредной, но такъ какъ ее производять именно промышленники, то на самомъ дѣлѣ она является одной изъ самыхъ губительныхъ охотъ. Промышленникъ станетъ подходить всегда къ той итицъ, которую легче добыть, а такъ какъ тетерьки вообще смириће косачей, то на охотћ съ подхода онћ и становятся по преимуществу его жертвой, хотя онъ отлично знаетъ, что черезъ 2 мѣсяца каждая изъ нихъ должна принести около десятка цыплятъ. Еще губительнъе становится эта охота позднъе, когда уже косачи слетаютъ токовать на землю, а тетерьки приближаются къ токовищу: тутъ уже почти никогда не удается подойти къ косачамъ и между тъмъ вовсе не трудно добыть тетерыку. Стало быть, охота съ подхода допустима только въ переходный между зимою и весною періодъ и притомъ подъ условіемъ преслъдованія только косачей, такъ какъ гибель нъсколькихъ самцовъ при полигамии птицъ нисколько не отразится на положеніи тетеревятъ. Слѣдовательно, это все равно, что совствить запретить ее, какт и вообще всякую весеннюю охоту; но конечно на промышленника это запрещение не подъйствуетъ, и высокая цѣна на свѣжеубитую птицу заставить его даже съ рискомъ производить охоту съ подхода.

Сущность этой охоты состоить въ слѣдующемъ. Завидѣвъ одного или нѣсколькихъ косачей, сидящихъ на березахъ, охотникъ долженъ подойти къ нимъ незамѣченнымъ на разстояніе ружейнаго выстрѣла. Отсюда во-первыхъ, надо начинать охоту, когда уже станоновится достаточно свѣтло, чтобы можно было разобрать тетеревовъ; во-вторыхъ, надо умѣть подкрадываться незамѣтно и безшумно, и въ-

третынхъ, необходимо им'ять далеко и сильно бьющее ружье. Что касается перваго условія, то, чтобы утро не пропадало, можно начинать подходъ еще до настоящаго свъта, если знать мъсто, куда утромъ вылетаютъ тетерева; или, поздиће, подходить на голосъ бормочущихъ тетеревовъ и даже просто подходить къ току, когда косачи приближаются къ нему. Второе же условіе умізнье незамітно подходить къ птицівдается лишь продолжительнымъ навыкомъ. Какъ извъстно, къ стаъ или вообще къ ивсколькимъ птицамъ подойти трудиве, нежели къ одной. Точно такъ же, къ близко сидящимъ другъ отъ друга трудиве подойти, чъмъ къ ръдко сидящимъ. Поэтому, чъмъ меньше итицъ и чъмъ ръже опъ сидятъ, тъмъ скоръе можно надъяться на удачный подходъ. Затъмъ, надо помпить, что на открытомъ мъсть нечего и думать подходить къ тетеревамъ; нужны деревья или, еще лучие, молоденькія деревца, высокій кустарникъ, и зд'єсь ни на одну минуту не надо выходить на открытое мъсто, а всегда оставаться подъ прикрытіемъ того или другого деревца. Наконецъ, надо не шум'єть и не паступать на сухія вѣтки, чтобы пхъ трескъ не обратиль вниманія тетеревовъ на то мѣсто, откуда послышался. Если же это случилось, надо остановиться и ждать, пока птицы совствить не успокоятся. Но такое обстоятельство является уже очень неблагопріятнымъ для удачной охоты.

Пзъ сказанного само собою понятно, какъ дорого на такой охотъ далеко и сильно быющее ружье. Надо считать, что съ подхода большею частію приходится стрѣлять на 80—90 шаговъ, а не на 50—60, какъ при болотной охотъ. Поэтому, Л. П. Сабанѣевъ совѣтуетъ употреблять для такой охоты далеко и кучно быощія одностволки, я же къ этому прибавлю, что для хорошихъ стрѣлковъ изъ винтовки лучше всего пользоваться послѣдней. Дробь надо употреблять во всякомъ случаѣ крупную, № 4—5. По разъ стрѣляной стаѣ, если возможно, лучше не пытаться стрѣлять второй разъ, такъ какъ, будучи напутаны, тетерева перемѣщаются и уже съ трудомъ вторично подпускаютъ къ себѣ охотника, становясь еще болѣе осторожными. Вотъ тутъ то и приходится иногда исколесить много верстъ и придти съ очень небольшой добычей. Вообще же, взять въ одно утро 2—3 тетеревовъ надо считать хорошей охотой, хотя промышленники добываютъ и больше.

Вибств съ дальнъйшимъ развитіемъ весны, охота съ подхода не прекращается, а только измъняетъ свой характеръ: во многихъ мѣстахъ тетерева или вслъдствіе мъстныхъ причинъ, или вслъдствіе усиленнаго преслъдованія, разстронвшаго тока, токуютъ поодиночкъ и за такими-то одиночками практикуется въ свою очередь охота съ подхода. Время для такой охоты преимущественно апръль, отчасти май; чтобы охота была успъшиве, охотинкъ пускаетъ въ дъло еще манку, т.-е. скрадывая косача, въ то же время и подманиваетъ его, смотря по обстоятельствамъ, то голосомъ косача, то голосомъ тетерьки. Вотъ какъ описываетъ эту охоту г. Гладковъ:

"Рано утромъ отправляется охотникъ въ лесъ и выслушиваетъ: где бормочетъ тетеревъ? Распознавши направленіе, въ которомъ послъдній находится, охотникъ идеть къ нему медленно и старается подкрасться изъ-за лъсу или кустовъ къ той полянкъ, гдъ бъгаетъ токующій косачъ. Рѣдко и по особенному счастію удается этотъ подходъ; гораздо чаще приходится охотнику пустить въ дело подманку. Онъ выбираетъ мъсто, гдъ бы ему самому удобно было скрыться и вмъстъ съ тъмъ можно было бы видъть бъгущаго тетерева. Этимъ мъстомъ обыкновенно бываетъ лъсная дорожка или небольшая прогадина. Затъмъ охотникъ забивается въ можжевеловый или ракитный кустъ и ждетъ, пока тетеревъ перестанетъ бормотать. Тогда подражаетъ онъ ртомъ звуку, который издаетъ тетеревъ въ промежуткахъ бормотанія, звуку, похожему на громкое шинъне н звукоподражательно называемому у охотниковъ чуфиканьемъ. Два или три раза поворяетъ онъ этотъ звукъ и нотомъ примолкаетъ. Косачъ, привыкшій къ одиночному токованью и, въроятно, полагая, что въ его владвнія залетыть другой тетеревъ, и можеть быть съ тетерькой, спъщитъ развъдать о новомъ своемъ товарищъ и, пожалуй, соперникъ. Если охотникъ мастерски умфетъ чуфикать, а тетеревъ еще не бывалъ въ подобной продълкъ, то исторія оканчивается очень скоро. Косачъ чуфикаетъ еще разъ, не оставляя своего мъста, на что охотникъ опять ему отвъчаеть. Это повторяется два или три раза, и тетеревъ, видя, что сосъдъ его не двигается, принимается бъжать по тому направленію, гдф онъ слышалъ чуфиканье; шюй сгоряча ндетъ на манку даже летомъ. Подобжавъ или подлетъвъ на недальнее разстояніе отъ охотника, но никогда на открытое м'ясто, косачъ вытягивается и чуфикаетъ, какъ бы давая знать о своемъ прибытін. Если птица близка, то охотникъ молчитъ; тетеревъ снова чуфикаетъ и потомъ начинаетъ бъгать, отыскивая своего соперника. Въ это-то время онъ и выходить на дорожку или прогадину, гдв иногда и принимается бормотать. Но здъсь выстрълъ полагаетъ предълъ всей этой истории.

"Впрочемъ такой скорый и удачный исходъ имъетъ манка чернышей только у опытныхъ и искусныхъ охотниковъ и притомъ, какъ я уже сказалъ, тогда, когда тетеревъ не былъ еще стрълянъ подобнымъ образомъ, или не разглядълъ самъ обмана. Если же охотникъ ошибется хоть одинъ разъ въ своемъ чуфиканы или тетеревъ хитеръ, то случается, что послъ часового перекликанія охотнику приходится уйти ни съ чѣмъ, потративъ напрасно золотое время. Случается также, что успѣху дѣла мѣшаетъ прилетѣвшая къ косачу тетерька: занявшись своею подругою, чернышъ не идетъ болѣе на манку.

"Само собою разумѣется, что охотнику, неопытному въ манкѣ и избраніи для нея мѣста, нечего и ходить на эту охоту: мастеръ же своего дѣла убиваетъ иногда въ одно утро до 4-хъ чернышей. При этомъ должно замѣтить, что часа черезъ два и много черезъ три по восходѣ солнца охота эта прекращается".

Послѣ этого описанія двухъ близко родственныхъ способовъ

охоты, перейдемъ къ напболѣе извъстной весенией охотѣ на тетеревовъ—*охотив на току* изъ шалаша. У городскихъ охотинковъ эта охота часто считается очень легкой и даже не стоющей названія охоты, до того она будто бы легка и добычлива. Но это одно изъ многихъ заблужденій городскихъ охотинковъ и, чтобы убѣдиться въ этомъ, имъ стоитъ только прочесть виимательно ея описаніе.

Само собою разумфется, что для усифиности охоты на току надо имъть токъ многочисленный и непуганный, по и при этомъ условіи ғлавный залогь успъха охоты лежить во винманін и спокойствін охотника. Охотиться на току отнюдь не следуеть рано, т.-е. вскоре по открытін брачнаго неріода въ жизни птицы: надо дать растоковаться тетеревамъ, когда на ходъ тока уже не вліяетъ дурная погода, и молодые косачи посвидають его такъ же охотно, какъ старые. Стало быть, въ средней Россіи охоту на току можно начинать съ конца первой трети апръля, не ранъе, а лучнимъ временемъ для этой охоты здісь же считается конецъ апрізля и первая треть мая. Когда тетерева токують на земл'в и не напуганы, въ одно утро можеть довестись выстр'ялить до 10 разъ, конечно, если токуютъ н'ясколько десятковъ тетеревовъ, какъ это еще часто бываетъ у насъ вдали отъ населенныхъ центровъ. При этомъ надо помнить, что стръльба на току возможна только пока не разсвътетъ окончательно, слъдовательно въ маф она кончается гораздо раньше, чемъ въ половине апреля.

Собираясь охотиться на току, надо прежде всего ознакомиться съ токовищемъ. Самое удобное то, которое не голо, но и не слишкомъ заросло деревьями. Если токовище покрыто кой-гдф кустиками и тамъ и сямъ отдъльными березками или елочками, оно представляетъ напбольшее удобство для охоты, такъ какъ на слинкомъ открытомъ токовищ'в выстраиваемый для охоты шалашъ долго пугаетъ птицъ, и надо пропустить много времени, прежде чемъ начать охоту, пока тетерева привыкнутъ къ шалашу, а на слишкомъ заросшемъ-темно и кусты съ деревьями мъщаютъ стрълять. Конечно, отчасти съ этими неудобствами можно справиться: при открытомъ токовищь шалашъ можно устроить заблаговременно и можно поставить присады, т.-е. деревца, на которыя садились бы прилетающие тетерева; при токовищ'в очень заросшемъ, напротивъ, можно подчистить его, т.-е. срубить лишніе деревца и кустарники. Но все это значительно осложняеть охоту и требуетъ большой опытности. Такимъ образомъ при охотѣ на нодевыхъ или дуговыхъ токахъ дучие всего устранвать шалангъ еще въ марть, за двъ и даже болье недъль до начала охоты; при охоть на явсныхъ токахъ достаточно сдвлать его за ивсколько дней.

Если токовище представляеть естественныя удобства, тогда охотнику остается только военользоваться ими. Такъ, для шалаша ему надо выбрать одно или два рядомъ растущія деревца, придерживаясь западной стороны токовища, да и самый шалашь въ такомъ случать устроить гораздо легче. Почему шалашъ долженъ находится на западной сторонъ токовища понять не трудно: описываемая охота, какъ

упомянуто, производится въ полутьмѣ, слѣдовательно съ западной стороны етрѣлять удобиѣе, такъ какъ можно стрѣлять на свѣтъ или на зорю. Конечно, если тетерева садятся на деревья, они рѣзко выдѣляются на блѣдномъ небѣ и тогда стрѣльба легка, но это бываетъ рѣдко и лишь ранней веспою; поздиѣе приходится стрѣлять неключительно на землѣ, а эта стрѣльба очень трудная.

То же обстоятельство, что охота производится до полнаго разсв'вта, опредвляеть собою и характеръ шалаша: и втъ никакой надобности устранвать его тщательно, тътъ болже въ верхней части; напротивъ, чъмъ шалашъ ръже, тъмъ лучие, такъ какъ тъмъ свътлъе въ немъ. Нижнюю часть надо забирать болъе густо, нотому что токующіе тетерева могуть, подб'яжавши къ шалашу, открыть въ немъ присутствіе охотніка и тогда охот'в конецъ; верхняя же можетъ быть очень редкой. При постройке шалаша, конечно, надо брать такой матеріаль, который подъ руками, чтобы вивств съ твиъ не увеличивать опасеній косачей. Напр., если на току итть елочекъ, шалашъ отнюдь не надо дълать изъ елокъ, такъ какъ пышныя вътви въ кучъ только будутъ путать итицу. Самое устройство шалаша должно, естественно, изм'вняться въ зависимости отъ разныхъ условій, но им'вя деревцо, а твиъ болве два, рядомъ растущія, шалашъ устроить не хитро. Прежде всего, разм'яръ шалаша долженъ быть возможно малъ: вышина шалаша не должна превышать роста охотника, а то можетъ быть и меньше, если вырубить яму для сидфиья или для ногъ, ширина—такова, чтобы можно было стрълять. Очень удобный шалашъ устранвается такъ: беруть 6-8 березокъ съ обрубленными и заостренными веришиными концами, последними втыкають ихъ въ ямки, сделанныя въ земле, основанія связывають, низъ забирають сучьями, и шалашь готовъ. На свверв, гдв тетерева токують на полянахъ больнихъ елово-лиственныхъ лъсовъ, шалашъ устранваютъ изъ одиъхъ елокъ. Въ Вятской губ., при токованіи тетеревовъ на лугу, для устройства шалаша пользуются такъ называемыми "остожьями", т.-е. загородками изъ жердей, куда л'втомъ ставятъ стога с'ына въ защиту его отъ скота, который обыкновенно пасется здісь безъ всякаго призора. Стонтъ только выбрать остожье поближе къ току, и, разобравъ его съ одной стороны, поставить жерди скатомъ въ видъ крыши, положивъ ихъ однимъ концомъ на жерди той стороны, которая обращена къ току, навалить на эту крышу сфна или что попадется и шалашъ готовъ. Привыкнувъ еще ранве къ остожьямъ, тетерева его не путаются и даже не обращаютъ на него никакого вниманія.

Что касается ямы въ шалашѣ, то при ней удобнѣе сидѣть, да и шалашъ можно сдѣлать меньше; но многіе охотники предпочитаютъ лежать или полулежать на землѣ, нежели вырубать топоромъ въ мерзлой землѣ довольно глубокую яму. Въ этомъ отношеніи приходится сказать, что о вкусахъ не спорятъ, но несомнѣнно то, что при ямѣ не такъ утомляешься и, слѣдовательно, можно вѣрнѣе цѣлить.

Наконецъ, напомнимъ, что при охотъ на току надо одъваться

тентве; всего лучше въ полушубокъ или въ поддевку на мѣху, и брать съ собою иледъ или дорожное одъяло, чтобы не нажить при сидъніи и лежаніи на еще не оттаявшей землѣ ревматизма. Ночи холодны не только въ апрѣлѣ, но даже въ маѣ, а что касаетея сырости, то въ маѣ ночи часто даже еще сырѣе, чѣмъ въ апрѣлѣ. Во всякомъ случаѣ быть излишие тенло одътымъ на этой охотѣ невозможно, такъ какъ приходитея цѣлые часы оставаться безъ движенія.

Устронвъ шалашъ и давъ ему выстояться, можно приступать и къ самой охотъ. Для этого прежде всего надо тщательно ознакомиться съ токовищемъ или, лучше сказать, съ тъмъ, какимъ оно является изъ шалаша: стръляя при слабомъ свътъ, очень легко можно принять за тетерева нень, кустъ и т. п., не имъющее къ тетереву инкакого отпошенія, и потому надо запомнить, єдів что есть на токовищів, чтобы не дізлать глупівіннях выстрізловъ. Затізмъ, надо вітрно узнать, есть ли вечерній токъ, и въ зависимости отъ этого поставить время своего прихода на токовище. Лучше всего приходить съ вечера, если есть вечерній токъ, то довольно много времени спустя послѣ него, и подходить къ токовищу съ крайней осторожностью, чтобы по возможности не пугать тетеревовъ, которые держутся тутъ же въ кустахъ. Кому не улыбается проводить всю ночь въ л'всу, хотя весенияя ночь такъ коротка, можно приходить къ шалашу позднъе ночью, по во всякомъ случать, по крайней мърть, за полчаса и даже за часъ до прилета токовика. Идти къ шалашу поздиве значитъ навърное распугать тетеревовъ и въ лучшемъ случаѣ отсрочить начало тока на полчаса, въ худшемъ даже и совсъмъ помъщать току на это утро. При такой неосторожности тетерева часто вовсе не вылетаютъ на токъ, за исключеніємъ токовика, и можетъ даже статься, что это отзовется на всемъ последующемъ ходе тока. Если же охотникъ пришелъ и забрался въ шалашъ заблаговременно, ему остается только примоститься поудобнѣе, разложить патроны и ждать тетеревовъ. Ружья, заряжающияся съ казенпой части, не представляють никакого неудобства при стръльбъ изъ шалаша; если же приходится стрълять изъ простого ружья, то необходимо заряды приготовить заран ве, какъ въ виду скорости заряженія, такъ и въ виду того, чтобы заряды были правильные. Первымъ, едва черкнетъ зорька, слетаетъ на токовище старый токовикъ и, не тратя понапрасну времени, начинаетъ задорно чуфыкать и бормотать, вызывая соперниковъ. Обыкновенно его совстять нельзя раземотрать въ это время; если же это удастея, то отнодь не еледуеть стрелять въ него: гибель вожака разстранваеть токъ, развъ найдется другой старый и опытный тетеревъ, который замізнить его. Ноэтому вожака надо щадить, а такъ какъ онъ обыкновенно вертится на середнив тока, то лучше всего стрълять въ такихъ тетеревовъ, которые держатся ближе къ краю токовища: въ такомъ едучать попадаются молодые, убыль которыхъ проходить пезамізтно для тока. Нервое время, за темнотою, надо воздерживаться отъ выстръдовъ, чтобы понапрасну не путать птицъ. Токующаго тетерева убить не такъ легко, какъ думаютъ: во-

1-хъ, отъ растоныренныхъ перьевъ онъ кажется больше, чъмъ есть на самомъ дълъ, во-2-хъ, дробь легко скользитъ по оттопыреннымъ упругимъ перьямъ. Если же стрфлять, не видя хорошо цфли, само собою разумъется, убить итицу можно только случайно. Дробь надобрать покрупиве, № 5, чтобы по возможности не было подранковъ, по и при соблюденіи вс'яхъ этихъ условій рапеныхъ птицъ, которыя пропадають для охотинка, бываеть много. Отчасти это происходить еще оттого, что охотинкъ до окончанія охоты никакъ не долженъ показываться изъ шадаша: тетерева боятся не столько выстръда и смерти своихъ товарищей, сколько вида охотника. Непуганные даже совствиъ не обращають винианія на первые выстр'ялы и линь только повтореніе ихъ, да еще если много остается подранковъ, заставляетъ ихъ настораживаться и временно переставать токовать. Даже и стрѣляные косачи, улетъвъ послъ выстръда съ токовища, если еще не разсвъло, почти сейчась же возвращаются на него обратно и принимаются токовать какъ ни въ чемъ ни бывало. Если птицы стали отъ выстръловъ осторожнъе и медлятъ возвратиться на токовище, дъло можно поправить, подманивъ тетеревовъ, подражая чуфыканью или голосу тетерьки. Но какъ только тетерева замътятъ охотинка, токование прекращается. Пользоваться собакой для подбиранія раненыхъ птицъ также почти невозможно: токующіе тетерева боятся собаки, а найти такую вѣжливую собаку, которая просидѣла бы безпрекословно все время охоты въ шалангь, почти невозможно. Ноэтому, надо вдвойнъ стараться сохранить хладнокровіе и бить, по возможности, навърняка, для чего первое средство-стрълять когда уже можно различить птицъ и опредалить разстояніе.

Если охота изъ шалаша начинается ранней весной, когда косачи не прямо слетаютъ на токовище, а сначала садятся на деревья, въ такомъ случаѣ на голыхъ токовищахъ можно ставить присады, т.-е. фальшивыя деревья, на которыя садились бы косачи. Достаточно поставить 3—5 такихъ присадъ, конечно въ зависимости отъ величины токовища. Присады должны быть не очень высоки, снизу обчищены аршина на три и непремѣнно поставлены вертикально: на кривую присаду тетеревъ ни за что не сядетъ. Поэтому, часто приходится подпирать присаду съ трехъ сторонъ. Что же касается искусственныхъ чучелъ, которыя нѣкоторые охотники совѣтуютъ ставить въ это время для подманки тетеревовъ, то это недоразумѣніе: весною такія чучела не только не помогаютъ, а скорѣе вредятъ, такъ какъ тетерева, повидимому, смущаются ихъ неподвижностью и лишь болѣе настораживаются. Другое дѣло осенью, но объ этомъ рѣчь впереди.

Остается сказать о томъ, насколько вредна охота на току, т.-е. насколько велики шансы убить при этой охотѣ тетерьку. Въ этомъ случаѣ не должно преувеличивать вредъ, приносимый охотой: какъ выше сказано, тетерьки сравнительно поздно подлетаютъ къ току, а тѣмъ болѣе выбѣгаютъ на самый токъ. Даже при хладнокровной стрѣльбѣ токъ, навѣрно, разстроится прежде, чѣмъ настанетъ это

время и, слъдовательно, нормально тетерьки не попадаются подъ выстрълъ. Конечно, случайно та или другая курочка можетъ быть застрълена на току, по шансы для такой случайности совершенно ничтожны. Слъдовательно, противъ охоты на току изтъ никакихъ серьезныхъ возраженій, кромѣ большого числа подранковъ, пропадающихъ для охотника и д'влающихся добычей лисицъ и другихъ хищниковъ. На хорошемъ току пногда удается выстрълить въ течение утра разъ десять, но большинство выстриловь у большинства охотниковъ-промахи, до того трудно стрълять въ нервно передвигающуюся птицу въ полумракть весенняго разсвъта. Если удастся добыть 3-4 косачей въ утро—это очень хорошо. Само собою разумвется, что спачала охота должна быть добычливъе, чъмъ поздиъе. Стрълять на одномъ и томъ же токовищѣ два утра подъ рядъ отнодь не должно: надо съ самаго начала стрълять черезъ день, лучше черезъ два, а потомъ пропускать ихъ все болже и болже. Въ мъстностяхъ, гдв тетеревовъ много, и токовища расположены не особенно далеко одно отъ другого, охотятся поочередно то на одномъ, то на другомъ, чтобы не распугать тетеревовъ, но такихъ обътованныхъ мъстъ даже въ нашемъ отечествъ скоро останется немного, да и тъ въ такой глуши, куда не проникнетъ настоящій охотникъ. Около населенныхъ центровъ больпихъ токовищъ поблизости совсѣмъ нѣтъ и не столько вслѣдствіе истребленія косачей, сколько всл'єдствіе ихъ распугиванія неум'єдыми охотниками.

Въ нъкоторыхъ мъстахъ обыкновенная весенняя охота на току замъняется оригинальной охотой съ подъизда въ лодки. Такая охота производится въ общирной низменной площади между Мологой и Шексной въ Ярославской губ., по разливамъ рѣкъ Вятской губ. и, въроятно, также въ другихъ мъстахъ, о чемъ, однако, въ литературъ свъдъній не имъется. Въ описаніи весенняго образа жизни тетерева уже было указано, что обширные разливы ръкъ въ названныхъ мъстностяхъ сгоняютъ дичь и въ томъ числъ тетеревовъ на незалитыя гривы, гдв первоначально и открываются тетеревиные тока; потомъ, когда вода заливаетъ даже эти гривы, тетерева совершенно перебираются на деревья, гдв токують, кормятся и отдыхають, примізняясь волей-неволей къ своеобразнымъ условіямъ жизни. Вотъ на этомъ-то изм'вненій въ образ'є жизни тетеревовъ и основана охота съ подъжзда въ лодкъ. Она всегда производится на небольшихъ легкихъ челнокахъ, которые въ Ярославской губ. наз. "подъфздками", въ Вятской — "ботниками". Въ сущности это хороню извъстная душегубка, вертлявая и не безопасная для тады, особенно при вътръ или сильномъ теченін, по зато им'єющая то неоспоримое преимущество, что на ней можно профхать почти вездь. Такая додченка делается обыкновенно изъ цъльнаго осиноваго, липоваго или вязоваго ствола, который выдалбливается и зат'ямъ илоско разводится надъ огнемъ, очень легка и въ то же самое время можетъ поднять отъ 3 до 5 человъкъ. Обыкновенно на охоту за тетеревами ъздятъ вдвоемъ: одинъ

стрѣляетъ, другой гребетъ (одинмъ весломъ), по конечно про занасъ надо имъть и второе ружье. Перепочевавъ на какой-инбудь уцфатввшей гривъ по близости тъхъ мъстъ, гдъ держутся токующе тетерева, охотники, чуть начиеть свътать, ъдуть сюда или прямо на голосъ бормочущихъ тетеревовъ. Обыкновенно стая разсаживается но высокимъ, еще гольмъ березамъ и осинамъ, чаще по одной птицъ на каждомъ дерев $^{\pm}$, р $^{\pm}$ дко по 2 — 3. Молодые, не токующіе тетерева п тетерьки садятся ближе къ вершинамъ деревьевъ, токовики, напротивъ, на самыхъ пизкихъ сучьяхъ, почти надъ водой. Подъфзжатъ надо, конечно, придерживаясь окраины л'вса, но и при этомъ молодые тетерева обыкновенно довольно рано зам'вчають лодку, обнаруживая вм'юсть съ тъмъ всъ признаки безнокойства: начинаютъ переминаться, ходить по сучьямъ, вытягиваться, присъдать и т. д., что обыкновенно указываетъ на ихъ приготовление взлетъть. Въ такомъ случать медлить нечего и надо стрълять ближайшаго, иначе все стадо сицмется, и хотя перелетить педалеко, по уже не подпустить такъ близко, какъ въ первый разъ. Если птица не напугана, стая сидитъ широко, и погода пасмурная, подъвздъ удается хорошо и въ утро изъ 2-3 стай можно добыть съ полдюжины тетеревовъ. Само собою разумѣется, что стрълять надо всегда нижняго и стараться бить наповалъ, въ такомъ случат тетерева меньше пугаются и легче подпускаютъ во второй разъ. Дальнобойное и крънко бьющее ружье также увеличиваетъ количество добычи. Но главный недостатокъ слабаго ружья тотъ, что лишь подбитая итица, падая, забивается обыкновенно въ такую чащу, откуда ее не добудешь. Вообще охота съ лодки, имъя свои преимущества, им'ветъ и большія неудобства: во-1-хъ, легко застрять въ густыхъ кустахъ, во-2-хъ, -- очень трудно бороться съ быстрымъ теченіемъ, которое въ узкихъ протокахъ достигаетъ необычайной силы. Если убитую птицу достать по тому или другому трудно, лучше совсъмъ бросить ее, нежели тратить время на тщетныя попытки: въ такомъ случат одну пропавшую можно вознаградить подъъздомъ къ другой став; если же время пропущено, охоту приходится прекращать совствить.

Чтобы покончить съ описаніемъ разныхъ способовъ весенней охоты за тетеревами, упомянемъ охоту съ подъвзда. Не отличаясь существенно отъ осенняго подъвзда, о которомъ подробиве въ одной изъ следующихъ главъ, она сравнительно мало практикуется и носитъ скоре случайный характеръ. Главною помехою при такой охоте раннею весною служитъ обиліе сиега, и потому ее приходится начинать въ такое время, когда сиегъ уже сходитъ или почти сошелъ. Но въ средней Россіи тетерева къ этому времени слетаютъ прямо на токъ, не садясь на деревья, а между темъ охота съ подъезда возможна именно по тетеревамъ, которые сидятъ на деревьяхъ. Подъезжать надо по сиегу въ розвальняхъ, поздиве — въ простой телегъ, на одной лошади; тройка совсемъ непригодна при такомъ подъездъ, такъ какъ на тройкъ трудиве проехать, чемъ на одной

лошади, и скорфе можно напугать тетеревовъ. Вирочемъ, въ ифкоторыхъ мфстахъ и въ годы съ малосифжной зимой охота съ подъфзда вполиф возможна и даже добычлива, такъ какъ по неглубокому сифгу въ раниюю весну очень удобно подъфзжать къ тетеревамъ, когда они вылетаютъ на деревыя.

Затьмъ, по словамъ г. Іозофовича, въ Бълоруссіи существуетъ видоизм'вненный способъ охоты на тетеревовъ на току, — охота изъ подвижного шалаша или съ подходной будкой. Это – тотъ же шалашъ, только меньше и аккуративе сдвланный и не прикрвиленный къ вемлів, почему его можно свободно перепосить съ мівста на мівсто. Для устройства такого шалаша его продольныя дуги екрѣпляются поперечными обручами, а образовавнияся оконнечки закрываются мелкими еловыми вътвями. Высота шалаша вершка на 2-3 штже роста охотника; инирина винзу аринина $2-2\frac{1}{2}$. Въсъ аккуратно сдъланнаго шалаша около пуда, неуклюжаго— пуда два. "Находящійся впутри шалаша охотникъ легко перепоситъ его куда угодно, для чего падъваеть на плечо ремень, прикрѣпленный къ противоположнымъ ребрамъ дугъ или къ обручамъ, поддерживаетъ для равновъсія шалашъ руками (куполь шалаша можеть слегка уширать на темя головы), а ружье просовываеть въ боковыя противоположныя окошечки. Каждый деревенскій охотникъ смастеритъ такой шалашъ въ 2-3 часа. Конечно, подвижной шалангь во всякое время можеть пграть роль неподвижного. Но главное его назначение – подойти въ немъ къ тетереву. Для этого охотшикъ долженъ двигаться очень медленно, стушевывая движенія, не колебля шалаша, чтобы посл'ядній казался неподвижнымъ. Если тетеревъ не напуганъ, то подпускаетъ шалашъ шаговъ на 40—30, даже тогда, когда идешь къ нему прямо въ лобъ. Къ тетереву же сторожкому надо подходить, когда опъ не смотритъ на шалашъ: токуетъ, кормится, сзади (отличе отъ подъвзда)... Охота итьсколько тяжеловата... "Съ своей стороны, я долженъ сознаться, что яв этой охоть для меня есть много непонятнаго. Начать съ того, что тетеревовъ даже при обыкновенной охоть на току надо пріучать къ шалашу, котораго они спачала боятся; поэтому, какое преимущество можеть имъть передвижной шалангь, необходимо путающій птицу? Во-вторыхъ, двигаться по токовищу, имъя на себъ такой багажъ, дъло хитрое, а если прибавить ружье, то и тъмъ болѣе. Поэтому, я не вижу въ этомъ способъ охоты вичего удачнаго и развъ только какія-шоўдь неключительно м'ветныя условія заставляють прибъгать къ нему. Но къ сожалънио г. Іозофовичъ инчего не говоритъ O HHIXD.

Теперь переходимъ къ промысловому добыванию тетеревовъ въ течени весенняго періода.

Такъ какъ всѣ промысловые способы добыванія птицъ основаны на изученін ихъ постоянныхъ привычекъ и повадокъ, то понятно, что промышленники особенно пользуются въ своихъ цѣляхъ тетеревинымъ токомъ. Вообще говоря, весенияя промысловая охота гораздо

менте разнообразна, нежели осенняя и зимняя, и сводится лишь къ разной системть петель или сильевъ. Чаще всего берется бечевка, съ навязанными на нее сильями изъ конскаго волоса, которая и укладывается на токовищть между кустами. Иногда сильевъ бываетъ такъ много, что тетереву положительно невозможно избъжатъ ихъ при его движенихъ; но промышленнику этого мало и чтобы еще больше обезнечить себъ поимку итицы, онъ заваливаетъ промежутки между кустами и деревцами хворостомъ, срубаетъ вершины иткоторыхъ кустовъ, втыкаетъ фальшивые кусты и т. д. Благодаря этому тетеревамъ приходится на току двигаться по очень узкимъ проходамъ съ сильями и, конечно, въроятность поимки итицы значительно увеличивается отъ всъхъ этихъ приспособленій.

Въ Архангельской губ, ловля тетеревовъ на току имфетъ еще болье предательскій характеръ. Опредыливь центръ тока, промышленишкъ начинаетъ здъсь дълать *засижи* или *сичи*, т.-е. срубаетъ пебольнія деревья и укладываеть ихъ по токовищу рядами въ вид'в изгороди, доманной диніей въ разныхъ паправленіяхъ. Вся площадь тока также обносится засъкой, чтобы тетерева не разбредались по лъсу. Высота засъки для тетеревовъ около 7-8 вершковъ. Деревья для засъки подрубаются и укладываются рядами, зигзагообразно, такъ что получается какъ бы плетень; въ разныхъ частяхъ засфки оставляются воротца или проходы до 7-8 вершковъ высоты и такой же ширины, и въ этихъ-то воротцахъ закрѣнляются особеннымъ способомъ петли. Число воротъ, а стало быть и петель на токовищѣ отъ 70 до 100; разстояніе между инми отъ $1\frac{1}{2}$ до 2 аришить. Петли дълаются изъ волосъ, и на каждую идетъ $^3/_4$ аришна. Насторожка петель производится такъ: но бокамъ воротецъ вколачиваются тычки въ 7-8 вершковъ вышины, верхніе концы которыхъ слабо соединяются двойной веревкой (съ волосомъ), такъ называемымъ илутивомъ; одинъ конецъ петли привязывается къ тычку, затъмъ вся петля расправляется въ видф круга такъ, чтобы занять всф воротца, при чемъ верхняя часть петли закладывается въ плутиво и его слабо патяпутыми веревками удерживается на въсу (если плутиво патянуто туго, петля къ нему можетъ примерзнуть и птица не будетъ защелкнута).

Чтобы не пугать тетеревовъ, которые уже пачали посъщать токъ, промышленникъ дълаетъ засъку не сразу, а частями, — тогда тетерева легко привыкаютъ къ ней. Все токовище обносится засъкой также постепению. Приблизительно, устройство засъки и насторожка нетель беретъ недълю. Бъгая и гоняясь другъ за другомъ по токовищу, тетерева натыкаются на засъку, бъгутъ вдоль нея, пока не достигнутъ воротецъ, бросаются въ нихъ и здъсь попадаются въ петлю ногой или головой. Замъчательно, что попадающеся въ петли тетерева, начиная биться, ипсколько не пугаютъ своихъ собратьевъ; даже напротивъ, послъдніе иногда съ азартомъ набрасываются на нихъ и принимаются бить. При томъ условіи, что тетеревиные тока въ глухихъ мъстахъ очень многочисленны, такъ что на нихъ слетаются до

150 тетеревовъ, охота съ засъками очень добычлива и ежедневно даетъ отъ 5 до 15 штукъ. Но у промышленинка обыкновенно не одно токовище, а иъсколько, хотя иногда на разныхъ итщъ (тетеревовъ, глухарей и др.), и подчасъ онъ долженъ едълать въ день на лыжахъ до 40 верстъ, чтобы осмотръть вев евои спасти. Само собою разумъется, что часто этого не дълается и потому значительная часть дичи пропадаетъ для промышленника понапрасну, понадая на зубы росомахъ и другимъ хищинкамъ.

Въ Олонецкой губ, обыкновенные силья замѣияются поножами. Этимъ именемъ зовется доска арпина въ 2 длины, на которую прибиваютъ въ 2 ряда 12 нетель изъ конскаго волоса, на разстоянии четверти одна отъ другой. Такія доски разставляются въ разныхъ мѣстахъ токовища, засынаются землей, мохомъ, пыжевникомъ и т. д., тогда какъ петли расправляются надъ этой покрышкой, и тѣмъ дѣло оканчивается. Иногда же петли вплетены въ веревку, которую обвиваютъ вокругъ дерева, тогда какъ на вершинѣ послъдняго укрѣпляется чучело тетерьки. Видя это чучело и принимая его за самку, которая не хочетъ слетать на токъ, тетерева взлетаютъ сами къ ней на дерево и здѣсь попадаются въ петли.

Наконецъ, въ Смоленской, Ярославской и другихъ губерніяхъ тетеревовъ ловятъ *подпружками*, которые были описаны въ статьъ о рябчикахъ, въ Вятской — заячыми тенетами, а въ Саратовской на нихъ даже разставляли капканы. Впрочемъ, послъдній способъ добыванія несомнѣнно чисто случайнаго происхожденія. Что же касается ловли заячыми тенетами, то, по словамъ г. Бѣлова, это очень губительный способъ ловли, и въ удачное утро промышленникъ можетъ переловить почти что цѣликомъ порядочный токъ.

Этимъ мы закончимъ главу, посвященную весениему періоду въ жизни тетерева, и перейдемъ къ лѣтиему образу жизни птицы и къ лѣтией охотъ за нею.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ЛЪТО.

I

Гивздованіе.—Выводъ итенцовъ.— Жизнь выводковъ.— Образъ жизни тетерекъ и косачей. — Линька. — Начало образованія стай.

Въ половнить апръля въ подмосковныхъ губерніяхъ тетерьки начинаютъ приготовляться къ гитадовитію. Прежде всего за это принимаются старыя здоровыя самки, стало быть, въ сущности очень немногочисленныя, такъ какъ благодаря энергичному преслъдованію лишь немногимъ тетерькамъ удается здѣсь дожить до зрѣлаго возраста. Большинство же самокъ, т.-е. всѣ болѣе молодыя, приступаетъ къ гитадовитію поздиѣе—въ концѣ апрѣля и даже началѣ мая, когда

молодая травка усибеть достаточно подрасти на мъстахъ, освъщенныхъ солицемъ, и на деревьяхъ появится молодая листва. Такимъ образомъ, надо принять, что въ среднихъ губерніяхъ большинство тетерекъ садится на яйца въ десятыхъ числахъ мая; въ южной полосѣ—въ началѣ мая, въ сѣверной—въ концѣ мая или даже въ первыхъ числахъ йоня. Въ Уфимской и Самарской губерніяхъ выводъ и ростъ молодыхъ тетеревовъ происходитъ недѣли на двѣ поздиѣе, чѣмъ въ лѣсной полосѣ на правомъ берегу Волги, что объясняется тѣмъ, что въ стеняхъ восточной Россіи весение почные морозы бываютъ чаще и поздиѣе, чѣмъ въ лѣсной области болѣе занадныхъ губерній.

Чёмъ моложе тетерька, тёмъ поздиве она песется и тёмъ меньше кладетъ ящтъ. Если къ этому прибавить, что яйца первыхъ кладокъ часто гибнутъ отъ дождей и почныхъ морозовъ и что тетерька, потерявщая первыя яйца, объкновенно несетъ вторыя, это вполив объяснитъ, почему тетеревиныя яйца можно находить даже до половины йоня.

Мъсто гивадовья обыкновенно находитея недалеко отъ токовища, и лишь въ томъ случать, когда преслъдование заставляетъ тетеревовъ токовать на большомъ разстоянін отъ лівса, наблюдается противное. Но необходимымъ условіемъ для гифздованія тетерекъ является присутствіе ягодинковъ, гдъ выводки кормятся спустя 3-4 недъли по выводъ птенцовъ. При этомъ надо имъть въ виду, что тетерева ъдятъ далеко не безразлично всв ягоды, такъ что ппогда даже въ ягодныхъ м'єстахъ тетеревиныхъ выводковъ н'єть: по зато можно опред'єленно сказать, что тамъ, гдф ифтъ ягодниковъ, ифтъ и тетеревиныхъ выводковъ. На съверъ и въ съверной полосъ средней России тетерьки гивздятся около земляничниковъ и костяничниковъ, въ южной полосв средней Россіи около земляничниковъ и клубничниковъ, въ степи по клубничникамъ и вишенинкамъ. Такъ какъ въ средней России земляника и костяника растутъ преимущественно по березовымъ лѣсамъ, то здѣсь же, конечно, и гнъздятся тетерева, избѣгая при этомъ глухихъ высокоствольныхъ лъсовъ, гдъ низкая трава не можетъ дать тетеревамъ надлежащаго убѣжища.

Однако, не должно думать, что тетерьки гитадятся только по березовымъ лъсамъ. Мъсячные тетеревята уже настолько кртвики и бойки, что безъ труда могутъ совершать передвижение на итъсколько сотъ саженъ, и потому тетерева гитадятся и въ осинникахъ, и въ липнякахъ, гдт названныхъ ягодъ итът или ихъ очень мало, лишь бы только поблизости были хорошие ягодники. Слъдовательно, общирныя площади вырубленнаго лъса, гари и т. п. совершенно обезпечиваютъ кормъ тетерькамъ съ ихъ потомствомъ и даютъ вмъстъ съ тъмъ возможность быть менте разборчивыми въ выборть мъста для гитадовья.

Гнѣздясь по лѣснымъ опушкамъ и въ рѣдкомъ мелколѣсьѣ, тетерева получаютъ и еще выгоду: обыкновенно поблизости такихъ мѣстъ расположены покосы и пашни, и если для перваго періода въ жизни выводковъ это не имѣетъ значенія, зато къ концу лѣта объ-

щаетъ хороній кормъ. Есть прим'ьта, что тетерька всегда гивадится на непаханой земл'в и это не только в'врно, но даже легко объяснимо: на распаханной земл'в и негд'в скрыться тетеревятамъ и мало корма. Поэтому же тетерька въ распаханной степи гивадится не на межахъ, а въ вишепшикахъ, представляющихъ какъ надежное убъжище, такъ и достаточный запасъ корма.

Еще надо им'ять въ виду, что тетерька бол'я многихъ другихъ птицъ нуждается въ еухомъ м'яст'я для ги'язда: сырость губительна для ея ящъ, предохранить же ихъ отъ нея она р'япительно ничъмъ не можетъ. Съ этой стороны весенийе холода вовсе уже не такъ онасны, какъ продолжительные дожди: отъ холодовъ тетерька можетъ защитить яйца сидя на нихъ или даже только закрывъ ихъ травою; если же почва сыра или идетъ продолжительный дождь, въ конц'я-концовъ тетерька не можетъ спасти ящъ отъ нодмачивания.

Обыкновенно гитало располагается подъ кустомъ или деревцомъ, березкой, липой, можжевельникомъ, даже елью, глядя по ингрот в мъста, и лишь очень рѣдко бываетъ ничьмъ не прикрыто сверху. Само гньздо представляеть небольшую ямку въ землѣ, иногда углубленную самой птицей при помощи ногъ и слегка выстланную сухой травой, небольшимъ количествомъ моха и перьевъ. Кладка происходитъ раннимъ утромъ, послъ чего тетерька отправляется на токъ. По дорогъ она кормитея молодой травкой, распускающимися почками и т. д., затъмъ, какъ описано въ предыдущей главъ, сходится на току съ косачемъ, проводитъ съ нимъ время до вечера, а вечеромъ возвращается къ гифзду. Есть указанія, что тетерьки отъ времени до времени поевщають вечерине тока, но для меня неясно при какихъ обстоятельствахъ это бываетъ. Старыя тетерьки, слетая съ гибзда, да еще рано утромъ, когда если и нътъ мороза, то все-таки холодно, закрываютъ яйца сухой травой, которую снимаютъ возвращаясь къ гиваду. На токъ тетерька летаетъ ежедневно въ продолжение недъли-двухъ, пока не снесеть полнаго количества ящъ. Послъ этого посъщенія тока прекращаются и тетерька садится пасиживать, сходя съ гивзда на короткое время съ темъ, чтобы нокормиться.

Количество ящь, откладываемых в тетерькой, варынуеть въ очень больших предблахъ, въ зависимости отъ возраста итицы. Обыкновенно первая кладка состоитъ изъ 4—8 ящь, но неръдко можно найти въ кладкъ то ящъ, а иногда число ихъ доходитъ до 12 (Лоренцъ), 14 (Ушковъ) и даже 16 (Эверсманнъ и Сабанъевъ). Первое количество до 8 ящъ несутъ самки молодыя, то и болъе—совершенно зрълыя,—какъ Сабанъевъ думаетъ, приблизительно иятилътия. Если яйца первой кладки ночему-либо погибли и итица песется вторично, больше 5 ящъ шкогда не бываетъ, обыкновенно отъ 2 до 4.

Однако онибочно было бы объяснять разное количество ящъ въ кладкахъ только разнымъ возрастомъ тетерекъ. Повидимому, на это оказываетъ вліяніе и общій ходъ весны, обусловливающій болбе или менфе правильный ходъ тока и, следовательно, посфценія токовъ сам-

ками, и даже характеръ зимы. Если зима была обильная ентромъ и скудиая кормомъ, то, по енраведливому замтчанию М. Н. Богданова, какова бы ин была весна, будь она хоть очень ранияя и дружная, нельзя ожидать, чтобы тетерьки начали нестись рано и отложили много ящиъ: имъ надо спачала поправиться отъ зимией безкормицы. Вмъстъ съ тъмъ весьма возможно, что именно это объясияетъ то, на первый взглядъ, повидимому, странное обстоятельство, что въ степи тетерева несутся очень часто поздитье, чтомъ въ лъсной области, и откладываютъ ящиъ меньше: въ степи зимою корму меньше, тетерьки сильитье изпуряются отъ его недостатка и могутъ начатъ пестись не прежде, что въ степе весенией растительности. Число же ящиъ непремънно уменьшится въ результатъ зимней голодовки.

Тетеревиныя яйца довольно велики, им'я въ длину отъ 2,1 до 1,9 д. и въ поперечникъ отъ 1,45 до 1,38 д. Основной цвътъ ихъ охристо-бъловатый и по этому фону разбросаны большія и малыя бурыя пестрины. Насиживаніе продолжается три неділи, но съ півкоторыми колебаніями въ разныхъ широтахъ: такъ, въ средней Россіи тетерька сидить на яйцахъ отъ 19 до 22 дней (считая съ того дня, какъ отложено послъднее яйцо), на съверъ 23 и даже до 25 дней. Благодаря тому обстоятельству, что молодыя самки начинаютъ класть позднъе старыхъ, время вывода тетеревятъ тъми и другими уравнивается, особенно при дружной, теплой весить. Если же весение холода и особенно дожди губять янца, въ такомъ случать старыя тетерьки несутся вторично, и тетеревята выводятся недружно, представляя огромную разницу въ величинъ. Вторая кладка бываетъ и въ томъ случаъ, когда гибнутъ уже сильно насиженныя яйца; но если матка потеряетъ тетеревять, которые въ пуху очень чувствительны къ холоду и сырости, то въ тотъ годъ она вторично уже не несется.

Выше уже было сказано, что снесии полное количество ящть, тетерька принимается высиживать, сходя съ гибзда на короткое время, чтобы покормиться. Обыкновенно она дълаетъ это въ полдень, отлучаясь на тѣмъ болье продолжительное время, чѣмъ жарче. Вообще же, въ первомъ періодъ насиживанія тетерька оставляетъ яїца на болъе продолжительное время и сидитъ на гиъздъ не такъ кръпко, какъ позднѣе, когда она сидитъ до того крѣпко, что позволяетъ взять себя съ гитвада руками. Несмотря на это, тетерекъ въ періодъ насиживанія гибнетъ не особенно много: пестрины птицы такъ хорошо скрываютъ ее, что даже опытный глазъ не различитъ сидячую на землъ итищу даже на близкомъ разстояни, а хищные звъри могутъ найти ее чутьемъ только по в'втру. Поэтому, вдали отъ челов'вческаго жилья, тетерька довольно благополучно выводитъ дѣтей, хотя извѣстный процентъ насъдокъ, конечно, попадаетъ на зубы лисъ, хорьковъ и т. п. Но вблизи человъческихъ поселеній, особенно деревень, обстоятельства изм'ьняются: кошки, собаки и ребятишки, бродящие по лъсу, безпокоятъ насъдокъ, спугиваютъ ихъ съ гитадъ, разоряютъ послъднія и вообще

вевми способами вредять насъдкамъ, значительно содъйствуя уменьшению количества тетеревовъ въ извъстной мъстности.

Что касается срока вывода тетеревять, то для разныхь мѣсть можно привести слѣдующія данныя: въ подмосковныхъ губерніяхъ тетеревята выводятся, пачиная съ половины мая въ благопріятные годы и съ конца этого мѣсяца при поздней весиѣ. Въ Поволжьѣ время вывода наступаетъ позднѣе и въ концѣ мая здѣсь можно найти еще только ранніе выводки. Вообще въ средней Россіи большинство тетеревятъ выводится въ пачалѣ іюня, запоздалые же выводки встрѣчаются въ концѣ іюня и, въ видѣ исключенія, даже въ началѣ іюля. На сѣверѣ время вывода, конечно, значительно запаздываетъ противъ средней Россіи. Вообще, не будетъ опшбки, если принять, что первыхъ тетеревятъ можно встрѣтить приблизительно черезъ мѣсяцъ отъ самаго разгара тока.

Къ этому времени тетерьки, отъ недостаточнаго питанія, становятся чрезвычайно худы и еще болье худьють за іюнь, пока выхаживають дътей. Первые 3—4 недъли въ жизни тетеревять являются безъ сомивнія самыми тяжельми для матки, такъ какъ тетеревята глупы и безпомощны и мать должна оберегать ихъ ръшительно отъ всего, хотя птенчики хорошо бъгають уже на второй день по выходъ изъ яйца. Количество тетеревять въ выводкъ, конечно, соотвътствуетъ количеству ящцъ кладки, но только до извъстной степени, такъ какъ въ большиствъ кладокъ одно-другое яйцо обыкновенно не развивается. Въ средней Россіи число тетеревятъ въ выводкъ чаще всего 7—8, изръдка—10, въ видѣ исключенія 12—14. Однако, при счетѣ тетеревятъ надо всегда обращать вниманіе на ихъ возрастъ, такъ какъ у тетеревовъ, какъ и у многихъ другихъ птицъ, вовсе не рѣдкость, что два выводка, при гибели одной матки или если одниъ случайно отобьется отъ своей, соединяются подъ охраной одной старой.

Первые дии своей жизни тетеревята растутъ очень медленно, но спустя педѣлю начинаютъ расти очень быстро. Сначала они покрыты еѣро-желтымъ пухомъ, на 3-й—4-й день у нихъ пробиваются сначала маховыя, потомъ рудевыя перья, и недѣльные тетеревята уже могутъ припархивать и подлетывать, хотя дѣлаютъ это только въ томъ случаѣ, когда бываютъ псиуганы. Черезъ двѣ недѣли птепчики уже могутъ пролетѣть довольно значительное разстояніе, а мѣсячные летаютъ настолько хорошо, что даже не отстаютъ отъ матки. Приблизительно около этого же времени или педѣлей поздиѣе тетеревята сплошь одѣваются рыхлыми, пепрочными птенцовыми перыниками.

Весь первый мъсяцъ тетеревята очень слабы и кормятся спачала исключительно, а нотомъ преимущественно животнымъ кормомъ, насъкомыми, гусеницами, муравыными яйцами. Первый растительный кормъ состоитъ изъ сочныхъ молодыхъ листьевъ, верхушекъ различныхъ растеній, цвъточныхъ почекъ. Въ это время матка держится съ выводкомъ въ густой травѣ и кустахъ, въ частыхъ березиякахъ и даже сосиякахъ около пашенъ, покосовъ и болотъ и на день неръдко

уводить д'ятей въ ближайшіе хліба, гді они гораздо безопаснію отъ преслідованія хищинковъ. Въ половині іюня начинаєть посибвать земляника, въ конці этого мізеяца клубника и тогда выводки начинають выходить по утрамъ и вечерамъ на кормежку въ ягодинки.

По мікрів того, какть тетеревята растуть и оперяются, ихъ обыкновенные враги становятся все мен'ве и мен'ве опасными для нихъ. Особенно важно для нихъ окръпнуть настолько, чтобы взлетать на деревья. По словамъ г. Уникова, тетеревята взлетаютъ на деревья уже на седьмыя сутки; но если это и такъ, все-таки подолгу оставаться на деревьяхъ, а тъмъ болъе почевать на пихъ они начинаютъ не раиже какъ достигнувъ 1 $\frac{1}{2}$ мъсячнаго возраста. До тъхъ поръ тетеревята ночують на земль и туть масса ихъгибнеть какъ отъ четвероногихъ, такъ и крыдатыхъ хищинковъ. Лисицы, волки, хорьки, горностан, собаки, ястреба, совы, сороки, вороны и пр. истребляютъ тетеревятъ во множествъ, особенно лисицы. Однако, тетерькъ удается пногда надуть хитраго звъря и, притворившись больною, отвлечь его за собой. Только бъда, если тетерька сверхъ мъры увлечется стараніемъ обмануть лисицу: неловкое замедленное движение и она сама попадается на зубы лисицъ, а съ ея смертью гибнетъ и весь выводокъ. Часто бываетъ, что продолжительный дождь забиваеть целую семью тетеревять; но особенно губительны, конечно, лъсные и степные пожары, силошь истребляющие тетеревиное население данной мъстности, благодаря осъдлости этихъ птицъ въ лътнюю пору.

Итакъ, съ конца ионя тетеревята переходятъ постепенно на растительный, преимущественно ягодный кормъ. Въ началъ второй трети іюля въ подмосковныхъ губерніяхъ начинается ихъ линька и вифстф съ ней является первое отличе въ оперени самчиковъ и самочекъ. Именно, пробивающіяся на крыльяхъ самчиковъ покровныя перья темнобурыя, почти черныя, на нижней спинъ-синестальныя, по бокамъ грудп-черныя. Тетеревята начинаютъ "мѣшаться", какъ говорятъ, охотники. Но и по складу, и по развитию бровей самцы уже легко отличаются теперь отъ самокъ, которыхъ превосходятъ своей величиной и большею шириною бровей. Вытьсть съ линькой тетеревята продолжаютъ расти очень быстро и въ августъ лишь немного уступаютъ по росту старымъ тетерькамъ. Къ концу августа тетеревенокъ уже почти весь покрытъ перьями второго наряда и только голова и часть шен еще покрыты гитадовыми перьями, но окончательно первый взрослый нарядъ надъвается лишь въ сентябръ. М. Н. Богдановъ говорить, что въ Симбирской и Казанской губ. ему случалось встръчать почти перелинявшихъ тетеревовъ, но еще безъ косицъ, уже въ концъ іюля; самыхъ раннихъ съ косицами на хвость онъ находилъ тамъ же только съ 5 августа, самыхъ позднихъ, выращивавшихъ косицы, еще 14 сентября. Въ центральной Россіи весь процессъ линьки оканчивается въ общемъ позднъе.

Теперь, прежде чѣмъ покончить съ описаніемъ лѣтняго образа жизни тетеревовъ, скажемъ еще о линькѣ тетерекъ. Въ этомъ случаѣ

надо рѣзко различать линьку холостыхъ тетерекъ и матокъ. Первыя начинаютъ линять на мѣсяцъ раньше послѣдиихъ, одновременно съ старыми косачами, т.-е. съ половины іюня. Эти курочки и держатся иногда вмѣстѣ съ косачами, и ведутъ сходный съ ними образъ жизни. Начиная линять съ половины іюня, онѣ оканчиваютъ линьку къ концу іюля. Порядокъ линьки тотъ же, что у тетеревятъ, т.-е. начинается линька съ брюха, оканчивается головой.

Напротивъ, тетерьки, имѣющія дѣтей, начинаютъ линять вмѣстѣ съ послѣдними, т.-е. около половины іюля. За нѣсколько дней до этого у нихъ появляются на брюхѣ, оголившемся при сидѣніи на яйцахъ, пеньки; затѣмъ линянье распространяется на грудь и надхвостье и заканчивается на головѣ, какъ у молодыхъ. Послѣдними смѣняются маховыя и рулевыя перья, въ августѣ или, въ крайнемъ случаѣ, началѣ сентября.

Суточная жизнь тетеревиныхъ выводковъ очень проста. Ранпимъ утромъ, даже съ зори, если иттъ сильной росы, выводитъ матка тетеревять на кормежку въ лъсные покосы, на съчи, гари и т. п. мъста, гдь остается съ инми до 8 9 часовъ утра. Затьмъ весь выводокъ уходитъ отдыхать на лъсную опушку, въ кустарныя заросли и въ маполфеныхъ мфетахъ даже въ хлфба, однимъ словомъ туда, гдф можно спрятаться и спокойно отдохнуть. Въ это время тетеревята любятъ купаться въ землъ, чтобы освободиться отъ паружныхъ паразитовъ, а поздиће, часа въ 4 5, семья опять отправляется кормиться туда же, гдь была утромъ. Къ закату тетерька возвращается въ защищенное мъсто на ночевку, гдъ первые т т¹/₂ мъсяца вся семья ночуетъ на землт. При этомъ, пока птенцы еще очень малы, недълю-полторы, матка прячетъ ихъ подъ крылья. Такъ, однообразно, день за днемъ проходитъ весь іюнь и настаетъ начало іюля. Тетеревята уже подросли, легко могутъ слъдовать за маткой и вмъстъ съ тъмъ весь выводокъ начинаетъ кочевать на большей площади, чтобы потомъ перебраться окончательно въ ягодники, иногда за нѣсколько сотъ саженей отъ первопачальныхъ мфстъ кормежки. Начинающеея въ концф іюня и въ началѣ іюля покосы въ свою очередь заставляютъ выводки чаще перемънять мъста своихъ кормежекъ, а такъ какъ тетеревята, ставиш уже съ голубя, гораздо меньше пуждаются въ защить матери, то весь выводокъ на кормежкъ разсынается и много инфе, чъмъ въ болъе раннее время.

Мъста, гдъ растетъ ягодный кормъ, значительно обусловливаютъ лътнія передвиженія тетеревиныхъ выводковъ. Раньше всего поспъваєть земляника, потомъ клубника,—все ягоды растущія на полянахъ, и потому нонятно, что здѣсь же держатся и тетерьки съ дѣтьми. Когда поздиѣе начиетъ посиѣвать костяника, выводки уходятъ за нею въ лѣсъ, въ стени перебираются въ вишенники. Вообще, въ стени клубника и виния составляютъ исключительный лѣтній кормъ тетеревовъ; въ полосѣ островныхъ лѣсовъ клубника остается, а виния замъняется земляникой и костяникой; въ сѣверной лѣсной полосѣ тетерева корземляникой и костяникой; въ сѣверной лѣсной полосѣ тетерева корземляникой и костяникой;

мятся бруснікої, чершкої, голубикої, полянікої, морошкої и др. Такъ какъ эти ягоды растутъ въ лѣсу, то и выводки выпуждены держаться въ лѣсу, но здѣсь они все-таки бродятъ на извѣстної площади, иногда даже довольно большихъ размѣровъ. Въ средней Россіи къ костяникѣ примѣшивается черная смородина, ежевика и другія ягоды, въ ноискахъ за которыми тетеревята также постоянно перемѣняютъ мѣсто. Однако, это все-таки не мѣшаетъ намъ сказать, что приблизительно въ половинѣ іюля тетеревята становятся совершенно лѣсными птицами, хотя, конечно, первое время держатся чаще въ мелколѣсьѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ липяющая тетерька обпаруживаетъ уже очень мало привязанности къ дѣтямъ: не клокчетъ, не отводитъ отъ нихъ, а будучи вспугнута, молча улетаетъ, иногда очень далеко. Впрочемъ, тетеревята въ это время уже сами взлетаютъ на деревья при видѣ опасности, хотя здѣсь и не умѣютъ еще прятаться.

Въ концъ іюля ягоды начинаютъ пропадать, но за то въ это время мало-по-малу поспъваютъ яровые хлъба, между которыми горохъ и наливающіяся зерна гречи, а поздибе, въ болбе южной полосф, и просо особенно привлекають тетеревовъ. Въ теченіе первой половины августа выводки совершаютъ правильные переходы въ яровые хлъба по утрамъ и вечерамъ, чтобы въ полдень и на ночь отсюда обратно перебраться на лъсную опушку. Во второй половнив августа молодые косачи замътно отбиваются отъ матки, ведя все болфе и болфе самостоятельную жизнь, хотя и держатся поблизости другъ отъ друга; что же касается молодыхъ тетерекъ, то онъ продолжаютъ держаться съ маткой. Въ концъ августа или началъ сентября у молодыхъ косачей вырастають косицы и вытьсть съ тъмъ они окончательно отбиваются отъ семы, часто забираясь даже въ глубину лѣса, на брусничники. Въ это время, по словамъ г. Лоренца, молодые косачи часто бормочутъ, стоя въ позѣ токующаго тетерева, однако, это бормотанье не имбетъ ничего общаго съ настоящимъ токованьемъ. Но вотъ ударили первые морозы и молодые косачи, по два, по три вылетаютъ изъ глубины лъса на его опушку, откуда по утрамъ и вечерамъ слетаютъ на жнивья, подбирая здъсь осыпавшіяся зерна. Молодыя тетерьки и перелинявшія старки въ свою очередь дѣлаютъ то же, и эти вылеты на опушку, вмъстъ съ первыми посъщениями жнивьевъ, заканчиваютъ собою лътній періодъ въ жизни тетеревиныхъ выводковъ.

Теперь намъ надо остановиться на старыхъ косачахъ, которые совершенно не участвуютъ въ семейной жизни и которыхъ мы потому оставили въ сторонѣ, чтобы дать цѣльную картину жизни выводковъ.

По мѣрѣ того какъ тетерьки садятся на яйца и перестаютъ посѣщать тока, косачи также прекращаютъ токованіе и улетаютъ въ крѣпи, гдѣ и перелиниваютъ. Для этого имъ вовсе нѣтъ надобности удаляться на большое разстояніе отъ тока. Все дѣло въ томъ, чтобы мѣсто было глухое, и птица не боялась быть потревоженною. Поэтому, если такой укромный уголокъ находится близъ токовища, косачъ пе-

ребпрается въ него, если же около токовища не находится ничего подходящаго, птица улетаетъ даже на большое разстояніе отсюда. Л. П. Сабанъевъ говоритъ, что въ башкирскихъ степяхъ косачи для линьки улетаютъ верстъ на иять отъ ихъ весенняго мъстопребыванія, въ такъ наз. кардашники, т.-е. почти непроходимый лѣсъ, растущій по болотистымъ и кочковатымъ берегамъ озеръ и рѣкъ. Въ Пермской губ., по словамъ г. Ушкова, косачи для линьки выбираютъ мѣста на окраинахъ болотъ, съ березовымъ мшарникомъ, и въ густомъ мелкомъ березнякъ. Послъднее относится также и къ среднимъ губерніямъ. Въ южныхъ степяхъ косачи во время линьки волей-неволей держатся какъ въ мелкомъ кустарникъ, такъ и въ вишенникъ. На съверъ, въ лѣсной области, многіе косачи часто избираютъ мѣстомъ своего пребыванія густой ельникъ. Вообще несомнѣнно лишь то, что въ описываемое время косачи очень нуждаются въ близости воды.

Такъ какъ старые косачи первые начинаютъ токовать, они первыми же и улетаютъ съ тока. Слѣдовательно линька у нихъ наступаетъ раньше, чѣмъ у молодыхъ, которые вообще во всемъ запаздываютъ. Ф. К. Лоренцъ еще въ 1894 году сдѣлалъ интересное сообщение, справедливость котораго я могъ многократно провърить, что у кончившихъ токовать косачей очень быстро облѣзаетъ голова и горло, гдѣ временно вырастаютъ отчасти болѣе блѣдныя, отчасти пестрыя перья, которыя при общей линькѣ въ августѣ замѣняются нормальными для стараго тетерева перьями.

Такимъ образомъ происходитъ частная линька, съ чего собственно и начинается этотъ крайне болѣзненный и тяжелый для птицы періодъ. Съ тока косачъ улетаетъ въ совершенно истрепанномъ опереніи, и при томъ весьма истощеннымъ; по на обильномъ лѣтиемъ кормѣ онъ быстро поправляется.

Линька начинается слъдовательно въ разныхъ числахъ іюня и длится очень долго: не 1½ мъсяца, какъ думалъ М. Н. Богдановъ и какъ это съ его словъ повторилъ Л. П. Сабанъевъ, а около 2½, такъ что совершенно оканчивается въ сентябрѣ, а у запоздавнихъ даже въ началѣ октября. Положимъ, при поверхностномъ взглядѣ можетъ показаться, что въ августѣ тетеревъ уже совершенно перелинялъ; но не надо больного вниманія, чтобы найти между повыми еще много старыхъ нерьевъ и убѣдиться, что всѣ больнія перья еще пе доросли, съ кровяными пеньками. Линька мелкаго пера у косачей начинается одновременно на плечахъ, зобѣ и надхвостьѣ и оканчивается шеей и головой; послѣдиими смѣняются маховыя и рулевыя.

Тогда какъ обыкновенно линяющіе косачи держутся совсѣмъ въ другихъ мѣстахъ, нежели выводки, кой-гдѣ наблюдается противное. Такъ, въ Симбирской губ., по словамъ Богданова, косачи "проводятъ лѣто по опушкамъ и около полянъ лиственныхъ лѣсовъ и смѣшанныхъ боровъ, по порубамъ, заросинмъ частымъ лиственнымъ лѣсомъ, въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и курочки съ выводками. Такъ же какъ эти на утренией и вечерией зарѣ выходятъ они кормиться на ягод-

ники. Въ полдень косачи забиваются въ частыя опушки, въ густую траву и подъ напоротникъ. Последній они особенно любять, такъ какъ почва подъ шимъ сыровата и не нагрфвается такъ сильно солицемъ. Въ жаркое время косачъ ппогда цълые дин лежитъ на сырой земль въ тып папоротниковъ, или роется въ истлъвшей древесниъ давно упавинихъ древесныхъ стволовъ, и только на утренней зарѣ и въ сумерки выходитъ кормиться на ягодники часа на $1\frac{1}{2}$ —2. Линяющії косачь гораздо осторожить курочки. Сознавая слабость облинявнихъ крыльевъ, онъ никогда не остается такъ долго на ягодникахъ, какъ выводки. И въ продолжение всего линянья опъ не летаетъ добровольно, а поднятый—старается скорфе долетфть до чащи и спасается бъгомъ, пикогда не садясь на дерево. Эта слабость полета, а съ другой стороны обильная инща на ягодинкахъ, и обусловливаютъ полную осъдлость косача льтомъ. Дъйствительно, въ іюнъ и іюль косачъ живетъ на очень небольшомъ участкъ, и суточные переходы его простираются только на итсколько десятковъ саженъ. Въ иткоторыхъ мъстпостяхъ косачи летомъ живутъ поодиночке, въ другихъ же они собираются во время линянья по ифсколько штукъ и вифетф выходятъ на кормежки".

Поздиће, вићетћ съ сокращеніемъ ягоднаго корма, косачи усићваютъ уже настолько перединять, что могутъ выбираться изъ лѣса на болѣе открытыя мѣста, и постененно все далѣе и далѣе улетаютъ отъ лѣса въ яровые хлѣба. Это обыкновенно бываетъ въ началѣ августа и продолжается недѣли двѣ три, а когда хлѣбъ уберутъ съ полей и перевезутъ на гумна или оставятъ въ кладяхъ на полѣ, косачи начинаютъ летать на жинвъя. По утрамъ старые косачи и холостыя тетерьки выбираются изъ лѣса, гдѣ ночевали, на его опушку и здѣсь разсаживаются поодиночкѣ по деревьямъ, чтобы, посидѣвши нѣкоторое время,слетѣть на поле.

Такимъ образомъ и молодые и старые тетерева, перелинявъ, выбираются изъ лѣса на открытое мѣсто и начинаютъ все тѣснѣе и тѣснѣе сходиться другъ съ другомъ, что приводитъ къ образованію первыхъ стаї.

Такова лѣтияя жизнь тетеревовъ. Слѣдовательно, со времени слета на токъ и до конца лѣта, тетеревъ является почти исключительно наземной птицей, избѣгая садиться на деревья. Напротивъ, осенью и зимою тетерева только кормятся и ночуютъ на землѣ, обыкновенно же держатся на деревьяхъ. Конечно, въ разныхъ мѣстностяхъ, въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ условій, образъ жизни тетерева болѣе или менѣе измѣняется, но приведеннаго описанія достаточно, чтобы ознакомиться съ ходомъ лѣтней охоты за тетеревами.

H.

Лътняя охота на тетеревовъ.—Охота за косачами.—Охота за выводкамя.—Охота на манку.

Лътняя охота на тетеревовъ должна рѣзко раздѣляться на охоту за косачами и охоту за выводками. Что касается первой, то, по правдѣ говоря, иѣтъ никакихъ серьезныхъ причинъ ограничивать ее какими бы то ни было сроками, за исключеніемъ, конечно, одной: дозволь стрѣлять косачей, т.-е. пусти охотника на законномъ основаніи въ лѣсъ, такъ охота пойдетъ уже не за косачами, а за всякой лѣсной дичью. Что же касается охоты за выводками, то ее абсолютно нельзя начинать ранѣе половины іюля въ подмосковныхъ губерніяхъ, потому что иначе пойдетъ не охота, а просто безсмысленное истребленіе тетеревятъ. Объ этомъ мы поговоримъ еще позднѣе, а теперь о косачахъ.

Покинувъ тока, косачи, какъ это уже сказано въ предыдущей главѣ, уходятъ въ крѣпи на поправку и для линьки. Истощенные своими похожденіями, они въ это время представляютъ мало завидную добычу, тѣмъ болѣе, что охота за ними крайне трудна и утомительна. Забравшись въ почти непролазную чащу кустарника, въ рѣчныя уремы съ завалами валежника, наконецъ, въ кардашники, косачи сидятъ такъ крѣпко, что не рѣдки случаи, когда собака даже можетъ схватить птицу. Если же косачъ, наконецъ, не выдерживаетъ стойки собаки и взлетаетъ, убить его все-таки трудно, благодаря чащѣ, тѣмъ болѣе, что о выстрѣлѣ съ прицѣла нечего и думать. Изъ этого ясно, что найти косача, когда онъ почти не выходитъ изъ своего убѣжища, очень трудно даже съ собакой, и потому до половины йоля, пока косачи не смѣнятъ большую часть своего пера и не переселятся въ ягодники, мало кто захочетъ тратить время на охоту за ними.

Въ половинъ іюля, переселившись на ягодники, косачъ уже можетъ быть предметомъ охоты, хотя продолжаетъ оставаться очень худымъ, такъ какъ во время энергичной линьки не можетъ отъфсться. Зато эта же самая худоба птицы облегчаеть охоту: косачь, не чувствуя себя уже такимъ безпомощнымъ, какъ въ разгаръ линьки, но нмфя потребность много фсть, не только вылетаеть теперь на ягодники, по исхаживаетъ здъсь большое пространство, оставляя по себъ хороній сл'ядь. Время кормежки птицы—съ ранняго утра до 9—10 часовъ и потомъ съ 4 часовъ пополудии до вечера; полдневные часы и ночь онъ проводитъ попрежнему въ крѣпи. Отсюда вытекаетъ, что охота за косачами ежедневно распадается на два періода: утрешній и послъобъденный, изъ которыхъ первый во всъхъ отношенияхъ представляеть больше преимуществъ. Во-первыхъ, онъ продолжительнѣе, во-вторыхъ, птица, наголодавшись за ночь, неохотно перестаетъ кормиться, даже заслышавъ собаку. Въ худшемъ случат косачъ перебъбъжитъ въ кусты или, послъ неудачнаго выстръла, улетитъ въ кръпь, по и то не надолго: черезъ полчаса, много черезъ часъ онъ почти всегда возвращается на прежнее м'всто кормежки.

Такимъ образомъ, съ половины іюля до начала августа косачи правильно посъщаютъ ягодники и все это время за ними можно усиъщно охотиться на мѣстахъ ихъ кормежки. Въ началъ августа косачи, окрѣпнувши и отъъвнись, начинаютъ летать даже на яровые хлѣба, обыкновенно гораздо болъе удаленные отъ лѣса, гдѣ косачи отдыхаютъ и проводятъ ночь, а еще позднѣе перебираются въ болъе глухіе участки лѣса, преимущественно туда, гдѣ есть брусника. Въ это время косачи, уже сытые и отъъвниеся, гораздо осторожнѣе, чѣмъ были раньше, далеко не такъ близко подпускаютъ охотника и собаку и гораздо хуже выдерживаютъ стойку. Благодаря этому охота на шихъ становится все болѣе и болъе случайной и, наконецъ, совсѣмъ прекращается до тѣхъ поръ, пока тетерева не стадятся, т.-е. до осени.

На взглядъ многихъ охотниковъ охота за косачами въ йолъ и началть августа очень заманчива и интересна, но большинство держится иного мизнія и отдаетъ преимущество охотіз за тетеревиными выводками, которая нормально начинается точно такъ же въ половинѣ іюля. Впрочемъ, то, что нормально, не всегда приводится въ исполненіе и очень многіе начинають охоту за тетеревятами уже гораздо раньше, хотя къ началу іюля тетеревята всего съ перепела и совершенно безпомощны. Такіе дѣльные охотники, какъ Основскій, Ваксель, Гладковъ, Вилинскій и Сабанѣевъ, каждый въ свое время, указывали на всю губительность и непрактичность ранней охоты за тетеревятами, и она все-таки практикуется теперь, какъ практиковалась раньше. Особенный вредъ этой охоты заключается въ томъ, что при маленькихъ тетеревятахъ прежде всего подъвыстрълъ подвертывается матка, безъ которой тетеревята безысходно гибнутъ либо отъ четвероногихъ и пернатыхъ хищниковъ, либо отъ непогоды. Матка при маленькихъ дътяхъ не только не старается скрыться отъ собаки и охотника, но еще старается обратить на себя ихъ вниманіе: вертится передъ ними, притворяется больной, едва-едва перепархиваетъ, и т. д. Иногда матку убиваютъ даже не ради добычи, а чтобы она не мѣшала и не путала собаку, которая чѣмъ хуже дресирована, тѣмъ легче сбивается съ толку отъ хитростей тетерьки.

Теперь познакомимся съ самымъ ходомъ охоты за тетеревятами, при чемъ приведемъ, съ необходимыми сокращеніями, прекрасное описаніе этой охоты, составленное Л. П. Сабанъвымъ.

"Прежде всего,—говоритъ Сабанѣевъ,—понятно, надо знать, гдю искать выводковъ. Хотя мы уже говорили о томъ выше, при описании лѣтняго образа жизни тетеревовъ, но такъ какъ многіе интересуются единственно охотой и, вѣроятно, не обратили вниманія на это описаніе, то мы повторимъ вкратцѣ—гдѣ въ извѣстное время лѣта держатся тетеревиные выводки. Во всякомъ случаѣ, мѣстонахожденія послѣднихъ весьма разнообразны и прежде всего зависятъ отъ мѣстныхъ условій, которыя бываютъ весьма различны и не могутъ быть вполнѣ предусмотрѣны. Настоящій охотникъ самъ очень хорошо знаетъ—гдѣ въ какое время лѣта и въ какіе часы держатся выводки, часто даже

самъ или черезъ другихъ узнаетъ о количествъ выводковъ и имъетъ самыя точныя указанія, гдіз именно держится каждый выводокъ - однимъ словомъ, въ знаніи лівсной охоты не только не уступаетъ, но даже превосходить завзятаго промышленника. Такихъ, конечно, учить нечего; но подобное знаше обусловливается только постоянною охотою въ одной и той же м'встности, въ теченіе мпогихъ лівтъ, а такихъ знатоковъ между охотниками сравнительно немного, притомъ даже они, будучи предоставлены самимъ себъ въ иной — незнакомой мъстности, въ свою очередь встръчаются со многими препятствіями, и для того чтобы оріентироваться нер'ядко тратять понапрасну дорогое время въ безплодныхъ поискахъ и позволяютъ себя сбивать съ толку различными, иногда умышленными ложными показаніями м'встныхъ промышленниковъ, также пастуховъ и т. п. люда. Самое лучшее—прежде всего спрашивать—есть ли гдв по близости гари и свчи и гдв всего больше ягоды и какой именно, а затъмъ, по нъкоторомъ соображении, уже легко составить самому планъ кампаніи, даже отправиться на мѣсто безъ всякаго проводника.

"Іюльская охота, можно сказать, безъ исключенія производится только въ ягодникахъ: повторяемъ, чѣмъ больше ягодъ въ данной мѣстности, тѣмъ болѣе шансовъ (при одинаковости прочихъ условій) найти здъсь выводки. Первое время, именно въ Петровки, вообще же въ первый періодъ своей жизни, - тетеревята держатся вообще въ болѣе или менѣе открытыхъ мѣстностяхъ съ густой и высокою травою. Покосы около опушекъ съ ръдкими кустиками, лъсныя болъе или менфе обширныя поляны, самыя открытыя мфста сфчъ и гарей, иногда даже болотистые луга, поросшіе лозникомъ и тальникомъ *), но все-таки примыкающіе къ лѣсу или сплошному кустарнику, вотъ гдъ первоначальное мъстопребывание выводковъ. Въ это время они (за исключеніемъ болотистыхъ луговъ) кормятся земляникой, а на южной границъ своего распространенія также клубникой, такъ что въ данной мѣстности, гдѣ завѣдомо извѣстно, что есть тетерева — надо искать выводковъ прежде всего тамъ, гдъ всего болъе той или другой ягоды. Такимъ образомъ, проходя мимо ягодниковъ, никогда не мъшаетъ посылать туда собаку. Вообще необходимо руководствоваться тутъ своими соображеніями и не слъдуетъ забывать, что сначала охотникъ руководитъ собакою, а затъмъ уже она ведетъ его. Замътимъ еще, что многочисленность муравейниковъ въ рѣдкомъ лиственномъ лѣсу, кустарникѣ и сѣчахъ также очень часто служитъ указаніемъ на присутствіе выводковъ; по тетеревята, какъ изв'єстно, кормятся муравыными яйцами только первую недѣлю, много двѣ своей жизни и потому выводки въ такихъ мъстностяхъ почти всегда бываютъ очень малы и не заслуживаютъ винманія настоящаго охотника.

"Съ начала съпокоса въ лъсныхъ пустопахъ тетеревиные вы-

^{*)} Тетеревиные выводки очень любять также водиться въ поемныхъ лугахъ съ мелкимъ дубнякомъ, по это относится только къ первому періоду ихъ жизни. Сабан.

водки постепенно выбираются из покосовъ и переселяются въ соевднія еще не сконічныя "пожин" или ближе къ опушкамъ лівса, а иногда перекочевываютъ и въ круппый лъсъ *). Такимъ образомъ, при самомъ началъ лътней охоты приходится опять-таки принимать это въ соображение и искать именио еще некошенныхъ лъсныхъ лужаекъ; но такъ какъ ефнокосная страда мъстами затягивается до конца іюля, то въ крестьянскихъ и владъльческихъ дачахъ, обильныхъ покосами и отдаленныхъ отъ мъста сбыта, выводки переселяются въ лъсъ иногда очень поздно, даже въ началѣ августа, а иногда и вовсе не покидаютъ своего первоначальнаго м'ястопребыванія. Такъ, наприм'яръ, это замъчено нами въ юго-восточной части Екатериноургскаго уъзда Пермской губ., гдф, за избыткомъ травы, лфеныя лужайки остаются неприкосповенными, и выводки до конца августа держатся тамъ, гдф вывелись. Напротивъ, въ Екатериносургскомъ Уралъ и вообще по всему хребту, тетеревята очень скоро переселяются въ лъсъ, часто хвойный и строевой. То же самое замъчается во всей лъсной полосъ Россіи, не отличающейся, какъ извъстно, обиліемъ покосовъ. Но, хотя въ средней полост постъднихъ гораздо болъе, ихъ все-таки недостаточно для густого населенія: въ подмосковныхъ губерніяхъ косятъ даже въ ръдколъсьъ; этимъ объясняется почему здъсь выводки перебираются изъ лужаекъ не сюда, какъ бы слъдовало ожидать, а въ частое мелколѣсьѣ, такъ наз. парусникъ, даже густой кустарникъ, почему охота за выводками здёсь нередко затруднительнее чемъ въ крупномъ, но рѣдкомъ лѣсу. Отсюда слѣдуетъ, что надо опять-таки имѣть въ виду мъстныя условія и, хотя нормально тетеревиные выводки со второй половины іюля, именно съ того времени, когда самчики начнутъ "мѣшаться",—держатся болѣе крупнаго и чистаго лѣса и будучи спугнуты, садятся на деревья, но это правило подлежитъ многочисленнымъ исключеніямъ. Во всякомъ случать выводки перебираются въ менте открытыя мъстности, и стръльба ихъ становится менъе легкою и заманчивою для охотника, не привыкшаго стрълять съ приклада, не цълясь. Что же касается пищи тетеревять-то во второй половинъ іюля она состоитъ изъ тъхъ же ягодъ земляники и клубники, вызръвающихъ въ лѣсу позднѣе, чѣмъ на опушкѣ и лѣсныхъ лужайкахъ; нерѣдко въ это время они кормятся исключительно костяникою, и опятьтаки-чьмъ болье этихъ ягодъ, тьмъ болье въроятности найти выводки **). Наконецъ, въ августъ, выводки, уже значительно поматеръвшіе, снова выбираются изъ лѣсу къ опушкамъ, ближе къ полямъ, особенно къ овсу и гречихъ, ръже гороху, а тамъ гдъ нътъ ихъ поблизости, т. е. въ очень лъсныхъ мъстностяхъ, неръдко перекочевываютъ изъ лиственныхъ въ смѣшанные и хвойные лѣса, гдѣ кормятся брусни-

^{*)} Въ чистомъ сосновомъ бору безъ мелкаго подсъда, слъдовательно очень крупномъ или растущимъ на песчаной почвъ, выводки однако никогда не встръчаются. Сабан.

^{**)} На сѣверѣ, въ хвойныхъ лѣсахъ, тетеревиные выводки часто кормятся голубикой, княженикой и черникой, но въ такихъ мѣстностяхъ уже нѣтъ настоящей охоты на тетеревовъ, тѣмъ болѣе, что ихъ вообще бываетъ гораздо менѣе, чѣмъ глухарей. Сабан.

кой *). Въ Ярославской губерній, напр., также Костромской,—въ август'я тетеревять всего чаще находять въ брусничникахъ.

"Разсмотримъ теперь, когда, т.-е. въ какое время дня, слѣдуетъ отыскивать выводки. Выше, при описаніи жизни посл'єднихъ, мы уже говорили въ какое время дня они выходятъ на жировку. Начиная съ восхода до 9-10 часовъ утра, затъмъ съ 4-хъ часовъ пополудни выводокъ всегда почти уже можно застать на кормежкъ, всегда въ сравнительно болъе открытыхъ мъстностяхъ, а слъдовательно и болъе удобныхъ для охоты. Притомъ тетеревята въ это время дня, особенно начиная съ средины іюля, бъгаютъ очень много и собакъ гораздо легче попасть на сл'ядъ кого-либо изъ нихъ, ч'ямъ въ полдень, когда они (также и послѣ заката) уходять (позднѣе и улетають) въ ближнюю чащу, сидятъ кучею, не давая слѣду, такъ что надо пройти очень близко отъ выводка, чтобы онъ, испуганный шумомъ, разбрелся въ стороны. Такимъ образомъ, собака въ жаркое время дня имветъ меньше шансовъ отыскать выводокъ, да она и ищетъ въ это время очень лъниво, а въ чащъ стрълять крайне неудобно: выводокъ взлетаетъ всегда сразу и трудно замътить, куда онъ перемъстился. Послъднее впрочемъ им'ветъ значеніе только при крупномъ выводків.

"Какое время удобнъе для стръльбы тетеревятъ-утро или вечеръ, рфшить трудно, но утромъ тетеревята голодифе, бфгаютъ болъе и перемъщаются ближе, между тъмъ какъ не задолго до заката вся выводка нер'вдко улетаетъ въ чащу, гдф стр'влять уже почти невозможно. Очень раннимъ утромъ тоже менъе въроятности на успъхъ, такъ какъ тетерева еще не успъютъ разбъжаться широко, когда они велики; когда же они очень малы, то старка ведетъ ихъ попозднъе, а въ сильную росу пногда выходитъ съ ними на жировку часовъ въ 7—8. Вообще лучше всего принаравливать начало охоты къ тому времени, какъ роса уже начнетъ подсыхать, такъ какъ и довольно крупные тетеревята, какъ и всякая лъсная птица, не любятъ мокроты. День на день стало быть не приходится, и то же замѣчается и вечеромъ; выводки уходятъ на ночлегъ тъмъ раньше, чъмъ роса сильнъе. Вообще въ сильную росу тетеревята выходять кормиться гдв повыше, лъсъ почаще, а слъдовательно и суше. Наоборотъ, въ дождливый день—выводки никогда не замъчаются въ лъсу, а выбираются на болъе открытыя мъста, на самый край опушки, и держатся здъсь иногда вышти каны, это от того, что лъсная птица не любитъ непогоды и въ мокроту выбирается на чистыя мъста. "Лучшаго поля какъ моросливый день въ августъ мъсяцъ, —говоритъ Вилинскії, - нельзя и желать для охоты за тетеревами Въ подобную погоду они обыкновенно по лугамъ забиваются въ мелкіе ракитовые кустики: выводокъ не собпрается въ кучу, а тетеревята поодиночкъ

^{*)} Въ сѣверо- и юго-западныхъ губерніяхъ, въ лѣсныхъ мѣстностяхъ, тетеревиные выводки, повидимому, держатся это время исключительно въ дубнякѣ, желудями котораго кормятся. Сабан.

забираются въ средину кустовъ и такъ илотно лежатъ, что ихъ можно брать руками. Смъшно даже бываетъ: возьмень въ руки пъгаго самчика, а опъ наивно попискиваетъ какъ недоростокъ"... Иногда, впрочемъ, въ это время года выводки въ дождъ держатся въ хлъбахъ, да и вообще утромъ и подъ вечеръ ихъ слъдуетъ искать въ овсяныхъ, гречишныхъ и гороховыхъ поляхъ, прилегающихъ къ лъсу или даже кустарнику.

"Послъ всего сказаннаго нами и принявъ въ соображение образъ жизни выводка лътомъ, – намъ уже легко себъ представить, какимъ образомъ производится охота за ними. Прежде всего надо поставить правиломъ, въ тфхъ мфстностяхъ, гдф завфдомо есть выводки или они предполагаются, — идти краемъ опушки, а собаку направлять въ болбе открытыя мъста, т.-е. туда, гдъ ожидаются тетеревята. Это обстоятельство имфетъ особениую важность, когда собака ищетъ у чащи, такъ какъ тогда выводокъ, заслышавъ ноискъ собаки, нерфдко усифваетъ добфжать до крфии, а здфсь стрфиьба уже далеко не представляетъ такихъ удобствъ. Вообще, какъ только собака, почуявъ свѣжіе слъды, начнетъ искать, необходимо сдерживать ее и дать время разбъжаться выводку: черезъ это достигается то, что выводокъ не поднимается весь вдругъ, а тетеревята вскакиваютъ по одному, по два. Опытная и умная собака, какъ уже было сказано, съ этою целью даже обходитъ кругомъ выводка. Еще лучше, какъ только собака остановится и сдълаетъ стойку, -- отозвать ее, отойти шаговъ на 50 въ сторону и снова пустить по слъду минутъ черезъ 10: тъмъ временемъ тетерева часто расползаются врозь, поднимаются поодиночкъ, и въ подманкъ тетеревятъ не имъется настоятельной необходимости. Кого запскала собака-косача или выводокъ-видно главнымъ образомъ изъ большей суетливости ея поиска въ последнемъ случав.

"Въ большинствъ случаевъ, особенно при очень мелкомъ выводиъ, первою выскакиваетъ старка *). Только позднѣе, когда тетеревята уже подрастутъ и разбѣгаются шире, а самчики начнутъ "мѣшаться", послъдніе нерѣдко взлетаютъ ранѣе самки, тѣмъ болѣе что они и отбѣгаютъ отъ нея дальше. Такихъ подростковъ можно отличить и по полету, который сильнѣе, громче и прямѣе, чѣмъ у молодыхъ самокъ. При несоблюденіи указанныхъ выше правилъ почти всегда вслѣдъ за маткой поднимается весь выводокъ; сначала онъ обыкновенно разсыпается въ разныя стороны, и очень недалеко, но позднѣе тетеревята улетаютъ на многіе десятки саженъ и стараются забраться въ лѣсъ или чащу.

"Если они были близко одинъ отъ другого, то при первомъ выстрѣлѣ, какъ бы по сигналу, летятъ прочь отъ этого мѣста и, отлетѣвъ бо́льшее или меньшее разстояніе, камнемъ падаютъ на землю,

^{*)} Тетерька поднимается всегда съ коканьемъ: вылетаетъ молча только холостая самка или же когда тетеревята совсѣмъ поматерѣли. Старая самка клокчетъ замѣтно протяжнѣе и жалобнѣе, чѣмъ молодая. Позднѣе, когда тетеревята достигнутъ, повидимому, величины куропатки, тетерька уже не отводитъ вовсе и улетаетъ безъ голосу. Сабан.

иногда довольно далеко одинъ отъ другого, и обыкновенно вовсе не давая слъду, забиваются подъ кустъ, хворостъ, валежникъ и лежатъ здъсь такъ кръпко, что очень легко пройти мимо не только охотнику, по даже собакв, если вътеръ былъ неблагопріятенъ. Вообще тетеревята, перемъстившись, никогда не сбъгаютъ, и только когда минуетъ тревога, одинъ за другимъ, подаютъ голосъ и собираются къ маткъ. Неръдко случается, что перемъстившійся и пританвшійся цыпленокъ не слетаетъ даже если въ него нивыряютъ камнемъ; часто его видишь подъ стойкой, и собака очень скоро можетъ получить дурную привычку ловить даже довольно крупныхъ тетеревятъ. Впрочемъ, въ болъе крупномъ лъсу выводки величиною съ голуби очень часто, перемъстивнись, садятся уже не на землю, а на деревья и сидятъ здъсь пеподвижно, никогда не подавая голоса, въ течене болье или менве значительнаго промежутка времени. Пногда весь выводокъ размѣщается на двухъ рядомъ стоящихъ деревьяхъ, но это случается рѣдко. Замѣтить притаившагося на деревъ тетеревенка также очень трудно, особенно въ вътреную погоду, когда онъ сидитъ очень близко къ стволу, такъ какъ тогда на въткъ, стараясь сохранить равновъсіе, скоро утомляется.

"Какъ только собака сдѣлала первую стойку, то охотникъ, разумѣется, если увѣренъ въ своемъ помощникѣ, прежде всего выбираетъ удобное мѣсто для стрѣльбы. Въ противномъ случаѣ онъ часто рискуетъ ничего не увидать, особенно въ частомъ лѣсу или кустарникѣ, тѣмъ болѣе во время полуденной "сидки" выводка, къ которому собака нерѣдко приводитъ охотника передъ окончаніемъ утренней охоты.—Вообще, если выводокъ не разогнанъ предварительно вышеописанными маневрами, то очень рѣдко удается убить болѣе двухъ тетеревятъ; а часто и весь выводокъ улетаетъ цѣлымъ и невредимымъ. Но если условія эти соблюдены, то нетрудно перебить большую часть тетеревятъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ они были впервые найдены.

"Но такъ какъ способъ этотъ извъстенъ далеко не всѣмъ охотникамъ и требуетъ отъ собаки большой понятливости и высокой степени дрессировки, то почти всегда необходимо, отозвавъ собаку, обождать нъкоторое время; перемъстившиеся тетеревята, какъ только все угомонится, начинаютъ одинъ за другимъ перекликаться и подаватъ голоса маткъ—"пикатъ", даютъ слѣдъ или слетаютъ съ деревьевъ и, собравшись болъе или менъе грудно, уводятся самкой дальше—иногда въ самую непроходимую чащу. На прежнее мъсто она приходитъ только когда выводокъ еще не напуганъ и не стрѣлянъ "). Изъ этого слѣдуетъ, что можно отправляться искать перемъстившихся тетеревятъ по прошествіи четверти часа или болъе, какъ только они нач-

^{*)} Во всякомъ случаѣ на другой день или въ тотъ же день къ вечеру выводокъ можно найти тамъ же, гдѣ онъ былъ первоначально спугнутъ. Выводки очень привязаны къ мѣсту и мѣняютъ его только въ крайности. Ca6an.

нутъ отзываться. Обыкновенно съ этою цфлью идутъ на голосъ ихъ и описываютъ круги".

Оть обыкновенной охоты за тетеревятами совершенно естественно перейти къ охоть на манку, которая является уже промысловымъ добываниемъ. Сущность этого способа состоитъ въ томъ, чтобы не тратя времени на разыскивание тетеревятъ, что, какъ мы видъли, требуетъ не малыхъ усилий, и къ тому же не всегда сопровождается уситъхомъ, заставить подойти ихъ къ себъ, приманивая, смотря по надобности, или голосомъ тетеревенка, или голосомъ матки. Сдълавъ въ кустахъ шалашекъ или загородку, промышленникъ скрывается въ немъ или за ней и начинаетъ манить.

Многіе промышленники ум'єютъ превосходно манить даже просто голосомъ, но обыкновенно въ этихъ случаяхъ употребляютъ особые пищики или вабики, подобные тъмъ, какіе описаны для подманиванія рябчиковъ. Нищики эти дълаются или изъ толстой гусиной кости, длиною около $1^3/_4$ вершка, или (продажные) изъ кости. Въ первомъ случать кость ровно обръзывается съ двухъ сторонъ и на разстояніи четверти вершка отъ одного ея конца на стънкъ выръзывается небольшое полукруглое отверстіе. Весь короткій конецъ кости отъ края до упомянутаго отверстія заліпляется воскомъ, въ которомъ нглої прокалываютъ наискось другую дырочку; длинный же конецъ пищика сръзывается до половины кости (съ той стороны, гдъ лежитъ отверстіе) приблизительно на ³/₄ вершка. Взявъ въ ротъ залѣпленный конецъ пищика, надо дуть въ него, дотрогиваясь пальцемъ до срѣзаннаго конца, и тогда издается звукъ, похожій на тетеревиный пискъ. Однако, если съ пищикомъ и легче манить, это представляетъ также своего рода неудобства: голосъ тетеревятъ мъняется съ возрастомъ, голосъ матки еще грубъе; слъдовательно, однимъ пищикомъ удовольствоваться нельзя, а надо имъть ихъ нъсколько и пользоваться тъмъ или другимъ, глядя по обстоятельствамъ.

Голосъ тетеревенка походитъ на нѣжный свистъ, въ родѣ фіуфіу! Чтобы не ошибиться, какимъ голосомъ надо манить, слѣдуетъ прежде всего выслушать, какимъ голосомъ перекликаются тетеревята, чтобы приблизительно опредѣлить ихъ возрастъ. Чѣмъ тетеревенокъ меньше, тѣмъ нѣжнѣе, чаще и продолжительнѣе онъ пищитъ. Голосомъ матки манить не слѣдуетъ—тетеревята на него идутъ плохо. Напротивъ на подманку пискомъ тетеревенка тетерька идетъ отлично и безъ труда можетъ быть подманена даже не одинъ разъ.

Подманивъ тетеревятъ, т.-е. дождавшись, когда они начнутъ откликаться и подбъгать къ охотнику, медлить не слъдуетъ, такъ какъ иначе, замътивъ ошибку, они соберутся и уйдутъ съ маткой далеко. Въ такомъ случаъ, надо прямо идти на голосъ ближайшаго тетеревенка, стрълять его изъ-подъ собаки и затъмъ начинать манить снова или идти на голосъ другого. Послъ выстръла тетеревята нъкоторое время держутся молча, а потомъ опять начинаютъ отзываться и идутъ на манку. Надо имъть въ виду, что тетеревенокъ пищитъ только пока одинъ: если же ихъ двое или болѣе вмѣстѣ, они не отзываются на пищикъ. Поэтому, если охотникъ замѣтитъ, что тетеревята откликаются рѣдко или неохотио, или же вмѣсто обыкновеннаго двусложнаго пиканъя прокричатъ быстро и связно, въ родѣ трели, нѣсколько разъ—фю-фю-фю..., это значитъ, что они собрались вмѣстѣ и что ему ничего не остается болѣе какъ разбить выводокъ, чтобы тетеревята или на манку.

Впрочемъ, такая охота на манку ведется настоящими охотниками; промышленникъ же такъ мастерски подражаетъ голосу тетеревятъ, что не двигаясь съ мъста подманиваетъ весь выводокъ, начиная съ матки, которую убиваетъ большею частію первою. Чтобы не тратить времени и не пугать тетеревятъ, онъ остается въ своемъ шалашѣ до тъхъ поръ, пока не перестрѣляетъ всѣхъ и лишь послѣ этого идетъ съ собакой на розыски убитыхъ; до тѣхъ поръ собака удерживается въ шалашѣ на привязи. Чтобы вѣрнѣе обезпечить себъ добычу, промышленникъ иногда даже расчищаетъ дорожки и уминаетъ траву, которая можетъ скрыть тетеревятъ.

На сѣверѣ за тетеревятами охотятся преимущественно въ такое время, когда они уже достаточно подросли, чтобы взлетать на деревья. При этомъ выводокъ разыскивается обыкновенно при помощи собаки, такъ наз. подлайки или лайки, которая употребляется также при бѣличьей охотѣ.

"Спустивъ собаку со сворки, -- говоритъ г. Бъловъ, охотникъ, войдя въ лѣсъ и время отъ времени посвистывая, идетъ себѣ не торопясь или л'всными дорожками, или пробирается по самому л'всу, но тъми мъстами, гдъ нътъ непролазной чащи. Добрая собака на рысяхъ объгаетъ все пространство около него, почти ему не показываясь, и поднявъ тетерева, съ звонкимъ лаемъ бросается за нимъ и неотвязчиво преслъдуетъ его, пока не посадитъ на лъсину, т.-е., другими словами, пока самъ тетеревъ не сядетъ на дерево. Собака скулитъ и лаетъ на него, но при этомъ она не должна все-таки бросаться на самое дерево и скакать на него, потому что въ такомъ разѣ тетеревъ усидитъ недолго. Тетеревъ не только не боится собачьяго лая, но видимо все свое внимание обращаетъ на неотвязчиваго пса, предполагая себя на деревъ, конечно, въ полиънией отъ него безопасности. Онъ даже прогудивается на сучкъ (всегда головою къ собак'ь), протягиваеть къ ней шею, дразнится и улькаеть. Заслышавъ знакомый лай, охотникъ-лѣсникъ опредѣляетъ себѣ откуда приблизительно онъ несется и какъ далеко и, смотря по этой отдаленности, тихо или бъгомъ бросается къ собакъ... Вотъ лай вовсе недалеко. Тихо, высматривая въ одно и то же время и птицу, и мѣсто, куда подступить, безъ малъйшаго шума, осторожно разводя кусты и вътви, охотникъ заходитъ противъ собаки, скрадываетъ птицу и стръляетъ, прислонивъ обыкновенио ружье или винтовку къ какому - нибудь дереву".

Всть эти охоты за молодыми тетеревами прекращаются во второй

половинъ августа, когда нечего думать о манкъ—для этого птицы стали слишкомъ велики, и когда вмъстъ съ тъмъ тетерева уже почти не выдерживаютъ стойки. Такимъ образомъ между лѣтией и осенней охотой за тетеревами наступаетъ нъкоторый пробълъ, когда къ тому же охотники отвлекаются другою дичью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОСЕНЬ И ЗИМА.

I.

Осенній и зимній образъ жизни тетерева.

Осенній періодъ въ жизни тетеревовъ начинается съ ихъ стаденія, что совпадаеть съ первыми числами сентября. Вылетая утромъ съ мѣста ночевки на березнякъ, старые косачи урканьемъ даютъ знать другъ другу, что пора стадиться, и потому первыя стаи всегда состоятъ изъ старыхъ косачей, къ которымъ еще присоединяются бездѣтныя тетерьки. Ипогда старыя тетерьки состаиваются отдѣльно, но обыкновенно стаи бываютъ смѣшанныя. Нѣсколько позднѣе, въ средней Россіи не позже послѣднихъ чиселъ сентября, къ стаямъ старыхъ птицъ, во время ихъ вылета на кормежку, постепенно присоединяются молодые тетерева, которые, какъ говоритъ Ушковъ, "слѣдуютъ за ними повсюду, изучая общественную жизнь и нравы". Численность стай зависитъ конечно отъ общаго количества тетеревовъ въ данной мѣстности, но мы къ этому еще вернемся, ограничившись пока общимъ замѣчаніемъ, что она колеблется въ предѣлахъ отъ нѣсколькихъ десятковъ до нѣсколькихъ сотенъ птицъ.

Ко времени стаденія тетеревовъ уборка хліба оканчивается и его либо свозять съ полей на гумна, либо складывають на мѣстѣ въ скирды и клади; вмѣстѣ съ тѣмъ при наступающихъ утренникахъ и даже болъе сильныхъ морозахъ лъса начинаютъ терять свою пожелтъвшую листву все болъе и болъе, но ягодъ еще довольно много и это опредъляетъ собою характеръ осеннихъ перелетовъ тетеревиныхъ стай. Собравшаяся стая придерживается преимущественно окраинъ болотъ, въ березовыхъ, рѣже въ сосновыхъ мшарникахъ, и отсюда рано утромъ вылетаетъ сначала на ближайшій березнякъ, а затѣмъ на ягоду или овсяныя жнивья. Часу въ одиннадцатомъ нафвшіяся птицы возвращаются обратно въ крѣпь, а передъ вечеромъ опять летятъ на кормежку; этотъ второй вылетъ сначала бываетъ въ четыре, потомъ въ три и, наконецъ, въ два часа пополудни, по мѣрф того какъ укорачивается день. Повадившись летать на овсяныя жнивья и гороховища, тетерева посъщаютъ ихъ до тъхъ поръ, пока ихъ не занесетъ снѣгомъ, послѣ чего они летаютъ за кормомъ на хлѣбныя и овсяныя клади или скирды. Въ такомъ случать, при большомъ количествъ тетеревовъ, ущербъ, наносимый ими, весьма значителенъ, особенно тамъ, гдъ, какъ въ Зауральъ, клади дълаются четырехугольными, достигая 15 и даже до 20 саженъ длины. Спустя ивкоторое время, тетерева такъ обиваютъ крайніе и верхніе снопы, что ихъ совершенно не стоитъ молотить, иными словами, уничтожаютъ отъ 10 до 20 пудовъ хавба. Когда клади обиты или перевезены съ полей на гумна, пищу тетеревовъ составляетъ ночти исключительно березовая почка. Въ мъстностяхъ, гдъ хлъбъ не остается надолго въ полъ и рано убирается на гумпа, тетерева кормятся березовой почкой уже съ октября. Отсюда понятно, что количество березовой почки играетъ огромную роль въ зимнихъ перелетахъ этихъ птицъ. Каждая стая съ ранней осени и до поздней зимы придерживается извъстнаго участка, выбирая такія м'вста, гдв поля и перел'вски расположены педалеко отъ болотистой чащи—ихъ мъста ночлега. Участокъ этотъ занимаетъ нъсколько (отъ 3 до 6) квадратныхъ верстъ, тянется обыкновенно полосой, и тетерева держатся здѣсь очень упорно, лишь съ трудомъ позволяя перегнать себя отсюда въ другое мфсто. Но въ годы, когда на березняк почки мало или нътъ, тетерева сами переселяются изъ излюбленныхъ мѣстъ въ другія, и тогда напрасно искать здѣсь ихъ стай. Съ другой стороны, обиле почки привлекаетъ тетеревовъ въ извъстные участки изъ другихъ, даже очень отдаленныхъ областей, и это отражается на крайне значительномъ увеличении числа особей тетеревиныхъ стай. Въ Екатеринбургскомъ увздв обыкновенный размъръ осеннихъ тетеревиныхъ стай отъ 50 до 200 штукъ, но и Сабанъевъ и Ушковъ говорятъ, что иногда стан доходятъ до 500 штукъ. При этомъ Ушковъ приводитъ, что осенью 1874 года, на Абрамовскихъ поляхъ, въ Нижне-Исетской дачѣ, изъ одной стан было убито на охот в съ чучелами въ 4 раза до 500 штукъ, между тъмъ убыль въ стат была почти незамттна. Новые тетерева прилетали опредъленно съ востока и съ избыткомъ покрывали убыль, произведенную охотой на чучела. Сабан вевъ кром в того подметилъ, что осенью и зимою ближе къ хребту мпогочисленнъе тетерьки, далъе отъ хребта-косачи, что объясияется большею осъдлостью первыхъ и большею подвижностью носл'вднихъ: тогда какъ тетерьки придерживаются своихъ гибодовыхъ мбстъ, косачи улетаютъ сравнительно далеко за кормомъ.

Однако, увеличеніе тетеревиныхъ стай на счетъ новоприбывшихъ мало сказывается на ихъ образѣ жизни, и суточные перелеты каждой стан совершаются съ весьма значительной правильностью.

Всю почь тетерева проводять въ болотистой чащъ, въ густыхъ уремахъ по берегамъ озеръ и рѣкъ, и ночуютъ либо въ густой осокъ, либо подъ хворостомъ и кустами; на сѣверѣ мѣстомъ для ночлега они нерѣдко избираютъ моховыя болота. Вылетая съ восходомъ на кормежку, они подиимаются не всѣ вдругъ, а постепенно одинъ за другимъ. Сначала вылетаетъ и тянетъ на опушку вѣроятно вожакъ стада, за нимъ другой, третій, по 2—5 вмѣстъ, когда стая много-

численна даже по десятку, и такъ перебирается вся стая*). Перелетъ совершается въ изв'ястиомъ постоянномъ направлении, отъ котораго тетерева уклоняются линь въ исключительныхъ случаяхъ. На опушкъ стая разсаживается по деревьямъ (какимъ-объ этомъ пиже), осматривается ибкоторое время и отсюда опять одинъ за однимъ слетаютъ на м'всто кормежки, будетъ ли это жниво, гороховище или кладь. Наввишсь, тетерева обыкновенно летять на паръ, гдв глотаютъ мелкіе камешки и рвуть такъ наз. паровую траву или торицу (Spergula arvensis), отсюда опять садятся на деревья, гдв сидять ивкоторое время, и только посл'я этого прежинить порядкомъ летять на нізсколько часовъ въ ту же крѣпь, гдъ проводятъ ночь. Только въ позднюю осень, при низко стоящемъ барометръ тетерева неохотно садятся на деревья, упорно держась на земл'т; если же погода хорошая, солнечная, они на полдень не улетаютъ въ крѣпь, а забравищсь на березы, здѣсь и остаются все время, до вечерней кормежки, грѣясь на солнцѣ и пощинывая березовыя почки. Такимъ образомъ, тетерева, повидимому, весьма чувствительны къ измѣненіямъ атмосферы, и г. Ушковъ приводить еще примъръ въ доказательство этого, упоминая, что въ 1877 г. тетерева совершенно исчезли за изсколько дней до выпаденія снъга изъ Екатеринбургскаго узда, и зима этого года отличалась крайней малосивжностью; тетерева какъ бы угадали, что имъ негдъ даже будеть укрыться въ снъгу отъ морозовъ, и переселились въ другія мѣста...

При вылеть на опушку, тетерева вовсе не безразлично относятся къ деревьямъ, на которыя садятся. Болье всего они любятъ такъ называемыя "сухары", "подстоины" и "кокоры", т.-е. высокія, сухія деревья съ обломанными и немногочисленными сучьями. Чъмъ ближе такая сухара къ опушкъ и вмъстъ съ тъмъ къ обычному направленію перелетовъ, тъмъ охотнъе садятся на нее тетерева, иногда буквально унизывая собою всъ ея сучья. Каждая стая обыкновенно имъетъ одно или два излюбленныхъ такихъ дерева, отдавая имъ предпочтеніе передъ другими, и этого никакъ нельзя упускать изъ виду при охотъ на чучела. Но само собою разумъется, что характеръ лъса имъетъ значеніе, и въ смъшанномъ лъсу тетерева садятся также на сосны и ели, которыхъ обыкновенно осенью избъгаютъ.

На перелетахъ тетерева держатся опредъленной высоты, именно: въ лъсистой мъстности летятъ нъсколько ниже самыхъ высокихъ деревьевъ, въ открытой, напротивъ, поднимаются очень высоко, какъ и въ чащъ, когда бываютъ вынуждены подняться выше деревьевъ. Сила вътра также имъетъ значеніе для того, на какой высотъ летятъ тетерева: при сильномъ противномъ вътръ они летятъ низомъ и огибаютъ опушки, ница себъ защиты въ близости лъса; при

^{*)} Однако, бываютъ, повидимому, изъ этого правила и исключенія. Такъ г. В. П—кій говоритъ, что подъ Семипалатинскомъ стаи тетеревовъ, штукъ до 200, вылетаютъ изъ лѣсу на кормежку кучно, точно туча. Причина этого кроется вѣроятно въ томъ, что тамъ тетерева улетаютъ отъ лѣса на жнивъя очень далеко, версты на три.

попутномъ вѣтрѣ летятъ открытыми мѣстами и высоко. Непогоду эти птицы также не любятъ и при дождѣ или сиѣгѣ сидятъ въ чащѣ, на нижнихъ болѣе толстыхъ сучьяхъ деревьевъ, которые не раскачиваются вѣтромъ, кормясь березовыми почками, если даже поблизости есть клади или жнивья. При этомъ можно также замѣтить, что въ пачалѣ осени, когда они только что состадились, тетерева не подолгу сидятъ на деревьяхъ, проводя большую часть времени на землѣ; здѣсь они кормятся преимущественно опавшими березовыми сѣменами, а также сѣменами иѣкоторыхъ стручковыхъ растеній. Также не любятъ садиться на деревья послѣ сильнаго дождя, и если садятся, то исключительно на сухары.

Такимъ образомъ, у тетеревовъ въ осеннемъ образѣ жизни, если можно такъ выразиться, наблюдается множество правилъ, которыхъ они держатся весьма постоянно, и основательное знакомство съ ними необходимо для успѣшной осенней охоты.

Прежде чъмъ покончить съ описаніемъ осенняго періода, упомянемъ о такъ называемомъ осеннемъ токованіи. Выше уже было говорено, что въ теплые и ясные осенніе вечера молодые, вполнѣ перебравшіеся косачи нер'ядко бормочуть, какъ бы пробуя голось, стоя въ позѣ токующаго тетерева. Большинство охотниковъ утверждаетъ, что старые косачи въ этомъ не участвуютъ, и даже такой опытный охотинкъ, какъ г. Ушковъ, говоритъ, что осенняго токованія у тетеревовъ не бываетъ, а что многіе принимаютъ за токованіе "осеннее урканье косача", которое въ дъйствительности служитъ только сигналомъ для сбора тетеревовъ въ одну стаю. Однако, повидимому, мѣстами дъйствительно происходитъ осеннее токованіе. Такъ г. Іозофовичъ опредѣленно говоритъ, что ему довелось наблюдать осеннее токованіе тетеревовъ въ Могилевскої, Смоленскої, Витебскої и Виленской губ. При ранней веснъ тетеревъ начинаетъ токовать уже во второй половинѣ августа; лучшее время токованія—съ половины сентября по половину октября; но бываетъ также и въ ноябръ, и въ декабрф, и въ первой половинъ января (слъдовательно по снъту). Начинается токованіе не очень рано утромъ, обыкновенно незадолго до восхода солнца (!) и длится въ теченіе всего дня. Наплучшее время токованія—при восходії солица, а въ глубокую осень—часу въ 10-мъ. Охотиће всего тетеревъ токуетъ на землћ, иногда на голомъ деревћ. Токуютъ почти исключительно старики, даже прошлогодніе токуютъ редко. При этомъ въ большомъ стаде можно одновременно слышать ивсколько тетеревовъ. Чуфыканье осенью бываетъ слышно очень рѣдко, остальная часть пъсни короче и слабъе весенией. Жестикуляція тетерева во время осенняго токованія та же, что и весною, но онъ не такъ сильно оттопыриваетъ крылья и не въ такой степени распускаетъ хвостъ. Самки относятся къ токованію совершенно безразлично.

Чѣмъ толще слой снѣга, который покрываетъ собою землю, чѣмъ холоднѣе, тѣмъ менѣе смысла въ суточныхъ перелетахъ тетеревовъ,

которые дъйствительно теряють свою правильность и въ началъ декабря даже прекращаются совству. Жнивы и пары занесены ситгомъ клади обиты, тетереву нечего взять кром'в березовой почки и онъ. почти весь день держится въ густомъ березнякъ или даже въ сосновомъ лѣсѣ, только въ полдень вылетая на онушку, чтобы наскоро пощинать почки. Выбств съ твиъ стан перестаютъ держаться исключительно одной мъстности и начинаютъ вести болъе бродячій образъ жизни. Въ больние холода тетерева не довольствуются даже прятаньемъ въ чащъ, а значительную часть дня и всю почь проводять зарывнись въ сибтъ. Для этого тетеревъ или съ дерева, или прямо съ полета бросается въ сићуъ и пробиваеть собою его верхній затвердвлый слой. Затъмъ подсовываетъ голову подъ этотъ пробитый слой и, двигая крыльями, образуеть углубленіе, въ родѣ пещеры, куда п забивается. Г. Ушковъ говоритъ, что такимъ образомъ тетеревъ уходитъ иногда подъ сибгомъ на иять саженей и болбе. Вылетаетъ изъ подъ сиъга тетеревъ очень быстро и съ шумомъ. Въ сильныя мятели стая можетъ оставаться подъ ситгомъ по итсколько дней. На этомъ обыкновенін птицы зарываться въ снъгъ основана очень оригинальная зимняя "охота изъ ямокъ", о которой будемъ говорить въ слъдующей главъ.

Однообразно тянутся короткіе зимпіе дин, чередуясь съ безконечно длиниыми ночами. Но вотъ, наконецъ, дли стали длиниъе, веселѣе засвѣтило солнце и хотя зима царитъ попрежнему, уже чувствуется ея переломъ. На тетеревахъ это прежде всего сказывается тъмъ, что ть изъ нихъ, которые откочевали далеко отъ предъловъ родной мъстности, начинаютъ опять мало-по-малу подвигаться къ ней. Это бываетъ въ концъ япваря или началъ февраля. Въ это время тетерева въ своей бродячей жизни подходятъ на очень близкое разстояние къ жилью человъка и залетаютъ даже въ городъ, что, напримъръ, наблюдалось въ 1866 г. въ Архангельскъ, гдъ тетерева появились въ общественномъ саду и, перелетая съ мѣста на мѣсто, разсаживались даже по крышамъ домовъ. Но мъстныя птицы еще весь февраль продолжаютъ держаться въ болѣе густыхъ и, слѣдовательно, лучше защищенныхъ отъ вътра лъсахъ, и только въ первыхъ числахъ марта перемъщаются въ ръдколъсье, поближе къ старымъ токовищамъ. Тогда же тетерьки отдъляются отъ косачей и начинаютъ вести одиночную жизнь. Какъ эта однообразная зимняя жизнь переходить въ шумную весеннюю мы уже видъли, и теперь, покончивъ съ описаніемъ годового цикла періодическихъ явленій въ жизни тетерева, намъ остается только разсмотрѣть практикуемые за этой птицей осенью и зимою способы охоты.

II.

осенняя охота.

Охота на чучела.—Выборъ мѣста.—Шалашъ.—Чучела.—Загонщики.—Стрѣльба.— Осенняя ловля.

Характерной охотой на тетеревовъ осенью служитъ охота на чучела, превосходно описанная Л. П. Сабанъевымъ въ двухъ статьяхъ, изъ коихъ я цъликомъ привожу вторую по времени появленія какъ болье краткую и вмъсть съ тъмъ болье общую (первая подробно трактуетъ объ охотъ на чучела въ Екатеринбургскомъ уъздъ), составившую одну изъ главъ въ монографіи тетерева косача названнаго автора.

"Чучелиная охота, читаемъ мы здъсь, начинается иногда раньше, пногда пъсколько позже, смотря потому-благопріятствовала ли весна раниимъ выводкамъ или нътъ. Во всякомъ случат она начинается не рантье первыхъ чиселъ сентября, а большей частью съ октября, когда тетерева соберутся въ стан и начнутъ "садиться на лѣсину". Въ самомъ разгаръ охота эта въ октябръ, когда листъ окончательно облетитъ, и тетеревиныя стан дълаютъ самые правильные перелеты. Въ такихъ мфстностяхъ, гдф были замфчены старые косачи, которые вообще первыми станваются и садятся на лЪсину, можно начинать чучелиную охоту и въ послъднихъ числахъ августа или въ началъ сентября, по тогда она ръдко бываетъ добычлива: тетерева все еще продолжаютъ садиться на землю, плохо идутъ на чучела, а если и садятся на деревья, то очень далеко отъ шалаша. Въ первыхъ числахъ декабря, когда выпадеть уже довольно глубокій снѣгъ, затрудняющій загонщиковъ, и начнутся сильные морозы, чучелиная охота вовсе прекращается: тетерева упорно держатся въ чащѣ, откуда ихъ почти невозможно выгнать, плохо подсаживаются, и охотникъ только напрасно мерзнеть. Вообще при морозъ свыше десяти градусовъ эта охота, основанная на выжидании, весьма утомительна и непріятна; напротивъ, при теплой и тихой погодъ и при удачномъ выборъ мъста, когда перелеть совершается пепрерывно, и охотникъ пногда не имъетъ времени не только выкурить напироску, по даже не усивваетъ зарядить ружья, — тогда она безспорно бываетъ однимъ изъ самыхъ пріятивіїпихъ препровожденій времени: согласитесь, что охотникъ много бы далъ за удовольствіе въ какіе-шобудь два часа свалить десятка два тетеревовъ, не говоря о неизбъжныхъ подстрълахъ и промахахъ, когда стръзяень изъ-за сучковъ или черезчуръ торопишься. При удачномъ перелетъ и, въ особенности, при двухъ охотникахъ въ разныхъ шалашахъ со стороны не скоро догадаешься, что здѣсь происходитъ безпощадное убіеніе ни въ чемъ невиновныхъ итицъ, а сначала невольно придеть въ голову непріятельская перестръдка, или, по крайней мфрф подумаешь, что цфлый десятокъ охотниковъ забавляется стральбою въ цаль. Выстралы сладують одинь за другимъ: не успаеть

убитый косачъ, считая сучки, свалиться на землю — на его мѣсто садится другой; въ самый разгаръ перелета, когда за разъ къ чучеламъ подсаживается не одинъ десятокъ тетеревовъ, иногда случается однимъ выстрѣломъ убить наповалъ нару, а иногда и цѣлую тройку; но какъ только пролетитъ хвостъ стан—наступаетъ временное затишье, которое продолжается до тѣхъ норъ, пока загонщики не завернутъ стаю обратио; затѣмъ снова молчаніе и снова непрерывная перестрѣлка, и это повторяется до четырехъ, пяти, рѣдко шести разъ, смотря по количеству совершенныхъ перелетовъ.

"Въ чучелиной охотъ самое главное — удачный выборъ мъста. Выполнивъ это условіе, можно почти всегда быть увфреннымъ въ полномъ успъхъ и большой добычъ. Ноэтому, очень важно подмѣтить заранће, гдв держатся тетерева, изъ какого болота вылетаютъ, въ какомъ направленіп летять и на какія деревья пеключительно садятся. Вообще самое лучшее мъсто находится, такъ сказать, въ центръ перелета, въ одинаковомъ разстояніи отъ болота и країнихъ пашенъ, куда долетаетъ вся етая; притомъ оно должно быть непремѣнно видно издалека. Необходимо, чтобы здъсь росли самыя высокія деревья, были такъ называемыя кокоры или сухары; чтобы оно находилось недалеко отъ опушки, или даже выдавалось мысомъ; очень хорошо, если вблизи его лежитъ овсяное поле, гороховище или овсяныя клади. Слѣпая чаща и, наоборотъ, слишкомъ ръдко стоящія деревья одинаково неудобны для шалаша. Въ первомъ случав неудобно стрвлять, во второмъ приходится обстръливать весьма немногія деревья; во всякомъ случать, надо заранъе опредълить, какія деревья находятся въ мъръ выстръла, и на какихъ можетъ быть подстрълъ или промахъ. Вообще выстрълъ на разстоянін большемъ двадцати саженъ — ненадеженъ, тъмъ болъе въ холода, когда отъ упругихъ перьевъ косача дробь буквально отскакиваетъ или скользитъ, не проникая въ тѣло. Необходимо, чтобы на разстояній ружейнаго выстрала находилось по крайней мара 5-6 высокихъ деревьевъ и чтобы они не заслоняли другъ друга. Лишніе мѣшающіе и всѣ низкіе деревья и кусты близъ шалаша, если можно, обрубаются. Радколасье имаетъ ту выгоду, что въ немъ далеко видно, куда падаетъ подстръленный тетеревъ, – а это составляетъ одну изъ немаловажныхъ причинъ большей добычливости чучелиной охоты, напримъръ въ ръдкихъ башкирскихъ лъсахъ Зауральскаго края.

"Весьма удачна бываетъ охота, когда на перелетъ находится небольшая купа деревьевъ, такъ называемый острочъ, деревьевъ въ 15—20. Въ этомъ случаъ, устроивъ шалашъ въ серединъ, легко можно обстръливать почти всъ деревья; такое мъсто видно со всъхъ сторонъ, и тетерева охотно садятся сюда, разумъется если оно недалеко въ сторонъ отъ обычнаго ихъ перелета.

"Охота весьма затрудняется, если въ избранномъ мѣстѣ находится черезчуръ много кокоръ, или самая, такъ сказать, основная кокора, на которую возлагаются всѣ надежды охотника и на которую садится большинство перелетающихъ тетеревовъ, черезчуръ сучковата. Въ

нервомъ случать они садятся за сучками на вътвяхъ, обращенныхъ въ сторону противоположную шалашу, и происходитъ великое множество неудачныхъ выстръловъ и даже промаховъ. Перваго мъста надо по возможности избъгатъ, а во второмъ — необходимо заранъе обрубатъ тъ задніе сучки, которые прикрыты передними. Такія мѣшающія и лишнія вътви надо замѣчать, стоя въ шалашѣ или на томъ мѣстъ, гдъ преднолагается его поставить.

"Въ вътеръ охота вообще бываетъ неудачиа, по это отчасти избътается, когда балаганъ сдъланъ поближе къ чащъ и подальше отъ опушки, въ глубинъ лъса, но все-таки, разумъется, на достаточно видномъ мъстъ. Можно также въ этомъ случат строитъ шалашъ у самаго болота, въ которомъ отдыхаетъ и почуетъ поджидаемая дичь, но тогда приходится часто стрълять только подъ вечеръ и вообще когда тетерева возвращаются въ болото. Здъсь ръдко выждень болъе одного, двухъ перелетовъ и ръдко убъень болъе десятка, почему такое мъсто выбирается только въ крайности: при очень вътряной погодъ или когда очень опоздаень на охоту. Обыкновенно тетерева, вылетъвъ изъ болота, летятъ не останавливаясь далъе и все время держатся въ ближайнемъ лъсу у опушки и полей, и возвращаются въ болото только въ извъстное время дня или вечера.

"Точно такъ же охота бываетъ неудачна и въ сильный иней, когда тетерева сидятъ обыкновенно на нижнихъ сучьяхъ деревьевъ и мало летаютъ. При такой погодъ гораздо выгодиъе стрълять ихъ съ подътвада, тъмъ болъе, что въ это время птица смирна и подпускаетъ охотника очень близко.

"Не слѣдуетъ никогда выбирать для чучелиной охоты такого мѣста, поблизости котораго пролегаетъ очень проѣзжая дорога, или которое, почему бы то ни было, часто посъщается людьми; необходімо также избъгать близости пасущихся стадъ и табуновъ.

"Если все готово заблаговременно, т.-е. заранѣе выстроенъ шаланъ, то необходимо быть на мѣстѣ за полчаса до вылета тетеревовъ изъ болота: этого весьма достаточно для выставки чучелъ и заѣздки загонициковъ. Въ противномъ случаѣ, когда приходится выбирать мѣсто и строить балаганъ, надо пріѣзжать по крайней мѣрѣ за часъ до начала перелета: первое время въ три, потомъ въ два, а въ декабрѣ даже въ двѣнадцать часовъ дия, а утромъ—до восхода солнца, сначала въ четыре, а въ концѣ поября и въ семь часовъ утра.

"Въ одинъ день можно дать двѣ охоты: утреннюю и вечернюю, промежутокъ между которыми рѣдко бываетъ болѣе четырехъ—пяти часовъ, но слѣдуетъ замѣтить, какъ это ни покажется страннымъ, что утренняя стрѣльба на чучела рѣдко бываетъ внолнѣ удачна, отчасти потому, что голодные тетерева плохо садятся на деревья и сначала больше валятся на землю, а потомъ на клади, и вообще торопятся поскорѣе нахвататься корму,—частью потому, что утромъ нерѣдко бываютъ сильные морозы, а съ восходомъ солнца и началомъ охоты подымается вѣтеръ, крѣпчающій все болѣе и болѣе. Послѣ полудня замѣ-

чается совсѣмъ обратное явленіе: тетерева сыты и дѣлаютъ болѣе частые перелеты; лучше садятся на деревья; вѣтеръ постепенно стихаетъ, и морозъ усиливается только передъ закатомъ солица, слѣдовательно по окончаніи стрѣльбы.

"Зам'втимъ здъсь, что при незаблаговременномъ выбор в мъста необходимо обращать вниманіе на клади, смотръть, на которыхъ изънихъ всего бол ве тетеревинаго номету, а на выпавшемъ снът внимательно смотръть, гдъ всего бол ве слъдовъ.

"Устройство шалаша очень просто. Прежде всего выбираютъ для него мфсто, которое должно удовлетворять следующимъ условіямъ: нервымъ дъломъ онъ долженъ занимать центральное положение, а не на самой опушкъ, и слъдовательно, на самомъ виду, чтобы изъ него было ловко прицъливаться во всъ окружающія деревья; если только можно, его следуеть устранвать не на чистомъ месть, между далеко стоящими деревьями, а подъ или между двумя близко стоящими небольшими березами, соснами и елями. Отъ выбора небольшихъ березъ зависить усп'яхъ охоты, такъ какъ большія березы сопряжены съ неудобствами вертикальной стръльбы, которая еще болъе затрудияется обиліемъ сучьевъ; высокія сосны и ели не представляють этого неудобства, потому что тетерева, если есть поблизости березы, на ели мало садятся. Балаганъ долженъ быть не менъе сажени въ вышину и у основанія, пначе въ немъ будетъ трудно пошевелиться и придется стрълять въ согнутомъ лежачемъ положении или на колъняхъ, вообще въ непормальномъ положени, что съ непривычки значительно уменьшаетъ върность прицъда. Хорошо также дълать шалашъ подъ естественной березовою шанкою, густо переплетшимися и нависшими сучьями, что зависить отъ болъзненности дерева-явленіе, очень часто замъчаемое въ лъсахъ, гдъ березы безпощадно обдираются и подсачиваются.

"Если балаганъ сдѣланъ заранѣе, или на этомъ самомъ мѣстѣ или поблизости стоялъ старый прошлогодній балаганъ или полевой шалашъ жнецовъ, — подобныя предосторожности почти совершенно излишни; но надо замѣтить, что при удачной и очень часто повторяемой охотѣ прошедшею осенью, тетеревиная стая обыкновенно измѣняетъ направленіе своихъ перелетовъ и слѣдующею осенью летаетъ большею частью другими мѣстами. Вотъ почему въ маломъ употребленіи постоянные шалаши. Такіе шалаши обыкновенно дѣлаются съ аршинной ямой внутри. Они хотя и представляютъ многія удобства и, что всего важнѣе, не такъ замѣтны, но требуютъ очень большихъ хлопотъ. Хорошо еще, если такой шалашъ сдѣланъ на мѣстѣ и удастся въ немъ сдѣлать три—четыре удачныя охоты, но по большей части яма выкапывается до начала чучелиной охоты и, слѣдовательно, совершенно гадательно.

"Всего лучше и удобнѣе обыкновенный коническій шалашъ изъ нѣсколькихъ (десяти—двѣнадцати) жердей или вырубленныхъ деревьевъ въ четыре—пять аршинъ длины. Вѣтви послѣднихъ не обрубаются,

п всть они укладываются козлами, комлемъ внизъ—къ шпрокому мѣсту. На нихъ кладутся еще другія березки съ необлетѣвшими совсѣмъ листьями, или еловыя и сосновыя вттви и цѣлыя деревца. Много впрочемъ не слѣдуетъ наваливать, иначе наружные оттопырившіеся сучья будутъ только мѣшать прицѣливаться. Надо какъ можно лучше забрать только вериниу конуса и тотъ бокъ, который обращенъ къ главному дереву или кокорѣ, на которой, предполагается, будетъ садиться большинство тетеревовъ. Никогда не слѣдуетъ дѣлать балаганъ изъ сѣна или соломы, развѣ только у самаго стога или хлѣбной клади: тетерева видятъ такіе гораздо далѣе, и первое время болѣе опасаются, но, разумѣется, если онъ сдѣланъ заблаговременно, за нѣсколько дней, то привычка беретъ свое, и стая не обращаетъ на него никакого вниманія.

"Во всякомъ случать, при устройствть шалаша необходимо сообразоваться съ мъстностью. Въ смъщанномъ лъсу всего лучше дълать его изъ молодыхъ хвойныхъ деревьевъ, именно елочекъ; тамъ, гдъ много дуба, т.-е. въ лиственныхъ лъсахъ южной части средней полосы—шалашъ дълается изъ дубовыхъ вътвей, на которыхъ листъ держится всего долъе. Наконецъ тамъ, гдъ тетерева летаютъ на гороховища и имъется обыкновение ставить горохъ на такъ называемые "шиши", т.-е. на сложенныя конусомъ жерди,—тамъ всего удобнъе дълать балаганъ, разумъется на опушкъ поблизости поля—изъ гороховины. Тетерева, которые часто, напр., въ Зауралъть, посъщаютъ шиши—нисколько не боятся подобныхъ шалашей и даже не ръдко садятся на нихъ.

"Наконецъ, если въ охотф участвуетъ двое или болфе охотниковъ, то для каждаго долженъ быть устроенъ отдъльный шалашъ, притомъ на разстоянін не меньше ста шаговъ одинъ отъ другого. Нначе, какъ говорится, два медвъдя въ одной берлогъ не уживутся, и какъ не уговаривайтесь объ очереди, каждый будетъ торопиться и торопить товарища и неминуемо произойдетъ толкотня и суетня, а стало быть-неизбъжные промахи; въ довершение всего, васъ ожидаютъ непэбъжные споры объ убитыхъ. Если шалаши дълать очень близко одинъ отъ другого, то послъ выстръла тетерева будутъ почти всегда перелетать черезъ слъдующій шалашъ, не присаживаясь; если напротивъ, балаганы слинкомъ удалены, то загонщикамъ будетъ очень трудно загонять стаю, и необходимо придется увеличить число ихъ. Притомъ, какъ извъстно, тетерева совершаютъ свои главные перелеты на весьма небольшомъ пространствъ-около версты, рѣдко на двухъ. При двухъ шалашахъ, оба должны быть, по мѣрѣ возможности, въ одномъ направлени съ перелетомъ, а при трехъ-лучше располагать ихъ (тоже ближе къ середнив перелета и не далве 150-200 саженъ одинъ отъ другого) равнобедреннымъ треугольникомъ, острый уголъ котораго быль бы обращень къ болоту, вообще къ ночевкъ стан, и занять самымь ближнимь шалашомь. Какъ извъстно всякому, тетерева, выдетъвъ изъ болотной чащи, сначала летятъ на сосъднія высокія деревья, которыя такимъ образомъ представляютъ какъ бы сборный пунктъ. Затѣмъ, носидѣвъ тутъ иѣсколько минутъ, тетерева летятъ, всегда уже гораздо дружиѣе, на кормежку. Изъ этого, понятно одни шалании (но больнею частью одниъ) ставятся на сборномъ мѣстѣ, а другіе на жировкѣ, гдѣ, какъ извѣстно, тетерева, особенно распуганные выстрѣлами, садятся гораздо шире. Нечего и говоритъ, что при постоянной охотѣ на чучела необходимо имѣтъ нѣсколько шалашей въ различныхъ мѣстахъ, т.-е. для каждой етаи: три раза подрядъ эта охота рѣдко бываетъ удачна, но если стрѣлять, напръ, разъ въ недѣлю—то одинъ шалашъ, разумѣется при большой стаѣ, можетъ прослужить цѣлую осень.

"Покончивъ съ шалашомъ, заготовляютъ такъ наз. подчучельники. Съ этою цълью вырубають надлежащее количество достаточно длинныхъ "), сажени въ полторы—двѣ, но не очень толстыхъ и, по возможности, совершенно прямыхъ жердей. Всъмъ этимъ условіямъ вполить удовлетворяютъ молодыя сосенки, выросния въ чащъ, но за неимъпіемъ таковыхъ, конечно, годится всякое достаточно прямое молодое дерево. Тонкій копецъ каждой жерди (копечно съ отрубленной верхушкой) заостряется, а толстый расщенляется топоромъ и расщелина на концъ немного вырубается, т.-е. дълается пире. Къ тонкому концу привязывается втыкаемое чучело (см. дал.), загонщикъ залъзаетъ на середину выбраннаго, обыкновенно довольно высокаго, издалека виднаго дерева и выставляетъ чучело или два какъ можно ближе къ верхушкв, но не выше ея и не вив сучьевъ, при чемъ толстый расщепленный конецъ каждаго подчучельника закрапляется на одной изъ вътокъ какъ можно ближе къ стволу; иначе чучело будетъ казаться опрокинутымъ набокъ, впередъ или назадъ. Подчучельники закрфпленные такимъ образомъ могутъ выдержать самый сильный вътеръ, особенно если направление его принято въ соображение, и жердь наклонена въ противоположную ему сторону. Привязывание же однихъ чучель къ вътвямъ сопряжено съ большими неудобствами, тъмъ болъе, что очень хитро взобраться на самую верхушку, низко же выставленныя чучела не оправдываютъ своего назначения-служить издали приманкой.

"Количество чучелъ можетъ быть весьма различно, но никакъ не менѣе двухъ, всего лучше три или четыре. Большее количество почти излишне, такъ какъ тогда очень немудрено сбиться съ толку и стрѣлять не въ птицу, а въ чучела ***); по нашему мнѣню не слѣ-

^{*)} Нѣкоторые совѣтуютъ дѣлать подчучельники гораздо длиннѣе, сажени въ четыре и болѣе, но это удобно только когда деревья, предназначенныя для выставки чучелъ, не превышаютъ этой мѣры, вообще когда приходится охотиться въ дровяномъ лѣсу. Если же около шалаша есть хоть одна высокая береза или другое дерево, то все равно неминуемо придется выставить здѣсь хотя одно чучело, а слѣдовательно и влѣзть на иего. Сабанѣееъ.

^{**)} Поэтому весьма странно, какимъ образомъ такой опытный лѣсной охотникъ какъ Кирѣевскій (см. Разсказы лѣсного охотника) совѣтуетъ выставлять до 25 (!!) чучелъ, изъ коихъ впрочемъ половину на землю. Сабаньсевъ.

дуетъ выставлять болфе трехъ чучелъ на одну "лъсину", или, наоборотъ, ставить по одному чучелу на каждое изъ ближнихъ деревьевъ. Несоблюдение послъдняго правила особенно даетъ себя чувствовать въ началѣ осени-по чернотропу, когда тетерева еще плохо присаживаются къ чучеламъ и садятся поодаль отъ нихъ. Поэтому, въ сентябрѣ въ особенности, никогда не слѣдуетъ выставлять чучела на кокор'в и вообще на главныхъ деревьяхъ, а выбирать для нихъ хотя и высокія, но очень разв'ясистыя и сучковатыя березы, неудобныя для стрѣльбы, и, кромф того, помфидать эти чучела на задней сторонф дерева, гдъ птицу застрълить уже весьма трудно. Всъ чучела должны однако группироваться около главнаго дерева и разставляются какъ можно натуральнъе, напр., если ихъ два или три на одномъ деревъ, то не на одной высотъ. Если есть лишнее чучело, то хорошо выставлять его на инзенькомъ деревѣ, надъ шаланомъ или даже на немъ, особенно если послъдній сдъланъ изъ гороховины. Прилетъвшіе тетерева сидять тогда долве и подсаживаются ближе. На землв же чучела совершенно излишни - развѣ только въ началѣ осени, и то когда шалашъ прилегаетъ къ жниву, озими или гороховищу. Однако судя по тому, что тетерева, какъ и глухари, зимой сильно идутъ на "точки", мы полагаемъ, что такіе точки, возобновляемые послѣ каждой пороши, служили бы для тетеревовъ еще лучшей приманкой, чѣмъ сами

"Если мъсто выбрано удачно, и тетерева хорошо летятъ на чучела, если вообще соблюдены всъ главныя условія охоты,—то они, по крайней мъръ первое время, не боятся самыхъ дрянныхъ чучелъ изъ сукна или черныхъ тряпокъ. Въ противномъ случаѣ, тъмъ болѣе когда стая, какъ говорится, настрѣляна—то тетерева, особенно косачи, становятся гораздо осмотрительиѣе и осторожнѣе, и ихъ уже ни за что не приманень деревянной или тряпичной кривулей, выкрашенной черной краской. Тогда, конечно, тотъ, у кого лучшія чучела, и убъетъ большее количество.

"Наиболѣе употребительныя у промышленниковъ "), да и у большинства охотниковъ и самыя долговѣчныя чучела—конечно суконныя. Дѣлаются они слѣдующимъ образомъ: изъ новаго немоченаго чернаго сукна тщательно вырѣзывается выкройка, т.-е. двѣ половинки, которыя аккуратно сшиваются (для шва разумѣется оставляется небольшая закрайка), выворачиваются и чрезъ отверстіе, оставленное въ брюхѣ и головѣ, тщательно пабиваются сѣномъ, а шюгда паклей, и наконецъ выправляются и выглаживаются. Затѣмъ принивается настоящій тетеревиный клювъ и хвостъ, вставляются, вмѣсто глазъ, черныя стеклянныя бусины, надъ ними приниваются красныя, а по бокамъ три бѣлыя полоски. Отверстіе, оставленное въ брюхѣ, обинвается внутри кожей, а къ краямъ этого отверстія придѣлывается тонкая, по прочная бечевка, служащая для привязыванія чучела къ подчучельнику.

^{*)} Впрочемъ, нъкоторые промышленники вмъсто чучелъ употребляютъ деревянныя обожженныя кривули, имъющія весьма отдаленное сходство съ тетеревомъ. Сананневъ.

"По нашему митьнію, однако, гораздо лучне суконныхъ чучела изъ папье-маше, тъмъ болъе настоящия чучела, изъ никурки тетерева. Последиія, при вевхъ своихъ достоинствахъ, им'єютъ то главное неудобство, что весьма недолговъчны, скоро портятся отъ дождя, обиваются и треплются. Но приготовленіе ихъ вовсе не такъ затруднительно, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, да и матеріалъ умэ диар и—вянитохо отвежая у оюзур акоп атэрур акиноокон век выписывать дорого стоющия картонныя чучела, все-таки не слишкомъ приманивающія тетеревовъ и скоро обламывающія хвосты, -- гораздо скорфе и удобиве сдълать таковыя самому или поручить кому-либо содрать шкурку. Разръзъ надо дъдать вдоль брюха, и онъ не долженъ быть очень широкъ; поги, какъ совершенно лишнія, отртзаются; мясо въ крыльяхъ и на черенф, который оставляется, вычищать не стоить. Снявъ шкуру, выворачивають ее на изпанку и затъмъ напяливаютъ на заранъе приготовленное туловище, съ шеей изъ пакли, намотанной вокругъ стараго насквозь пробитаго патрона *). Къ рубчатому концу последняго, который должень несколько выходить наружу, привязывается бечевка; въ отверстіе патрона вставляется заостренная верхушка подчучельника, а концы бечевки обматываются вокругъ какъ можно кръпче. Предосторожность эта крайне необходима, такъ какъ въ противномъ случат вттеръ легко можетъ сорвать или же, что еще хуже, сильно наклопить чучело, а, кром'в того, подобныя чучела могутъ очень часто сдалаться добычей хищныхъ птицъ, которыя очень часто совершенно внезанно для охотника бросаются на нихъ и иногда уносятъ очень далеко или и вовсе скрываются.

"Весьма важная вещь — придать чучелу правильную посадку. Иначе тетерева не только не садятся на то дерево, на которомъ оно выставлено, но даже пролетаютъ мимо. Одинаково не слъдуетъ давать чучелу горизонтальную или, напротивъ, слишкомъ вертикальную позу, съ черезчуръ вытянутою шеею, что тетерева дълаютъ насторожившись и собираясь улетътъ. Чучело, свалившееся набокъ, впередъ или назадъ, также путаетъ птицу; наконецъ, имъя въ виду, что тетерева почти всегда садятся зобами противъ вътра, необходимо принимать въ соображеніе направленіе послъдняго, тъмъ болъе, что сильный вътеръ ерошитъ перья чучела и задираетъ ему хвостъ ***).

"Для чучела необходимо выбирать исключительно старыхъ, совсѣмъ вылинявшихъ косачей или тетерь; къ такимъ молодые тетерева

^{*)} Для большей крѣпости, вокругъ патрона, ближе къ острому концу, нѣсколько отогнутому и отвороченному наружу—завертывается проволока не толще самаго тонкаго карандаша. Одинъ конецъ этой проволоки (соразмѣрно съ длиной тетерева) пускается длиннѣе и, тонко обвернутый паклей, служитъ шеей; патронъ и шейная проволока должны составлять тупой, а не прямой уголъ. Хвостъ слѣдуетъ хорошенько расправить и все чучело хорошенько пригладить и аккуратно высушить въ полуостывшей печкѣ. Сабаннъсвъ.

^{**)} Во всякомъ случать не раціонально ставить чучела зобами въ разныя стороны, какъ сов'єтуеть это Кир'євскій (l. с.). Точно такъ же совершенно несправедливо противор'єчащее мніте послітдняго, что слітдуеть выставлять чучела головами на востокъ, по той причинть, что будто тетерева дізлають это насторожившись. Сананьсег.

подсаживаются охотиће, да кромѣ того невыдинявшія (молодыя) птицы очень дъзуть и, будучи набиты, имѣютъ весьма растрепанный видъ. Для чучелъ черпыни всегда предпочитаются тетерькамъ, такъ какъ ихъ видно гораздо далѣе; только хвосты ихъ гораздо скорѣе мнутся и обламываются. При большомъ количествѣ чучелъ необходимо имѣтъ хоть одну рябушку. Понятное дѣло, чучела какъ суконныя, такъ тѣмъ болѣе настоящія, должно беречь—не оставлять ихъ ночевать въ лѣсу *) и возить отдѣльно отъ убитой итицы, иначе они очень скоро треплются, начкаются и становятся негодными къ употребленію.

"Самый лучній экипажъ для чучелиной охоты: осенью — охотничьи дрожки въ родъ линейки съ ящикомъ подъ сидъньемъ, а зимою— обыкновенныя сани, сзади которыхъ привязывается ящикъ. Вообще необходимо имъть отдъльныя помъщенія для чучелъ и убитой дичи и необходимо имъть съ собой топоръ или два, смотря по тому, загоняетъ ли одинъ возница или кромъ него имъется еще другой или иъсколько загонщиковъ.

"Далеко не всякій можетъ быть хорошимъ загонщикомъ, такъ какъ отъ последняго требуется много спаровки. Во-первыхъ, загонщикъ долженъ быть очень хорошо знакомъ съ мъстностью и не только знать, по нередко и смекнуть — где, въ какомъ болоте или чащѣ должны отдыхать тетерева. Подходя или, что гораздо скорѣе и удобиће, подъезжая верхомъ къ тому месту, где предполагаются сидящія на земль, на отдыхь, или замьченныя на деревьяхь птицы,онъ долженъ дать больной кругъ, обойти это место и ехать потихоньку, шагомъ и въ извъстномъ паправленіи, предупреждая охотника сначала крикомъ "посматривай", а потомъ, когда тетерева начнутъ подсаживаться къ шалашу – "береги шалашъ". Главное дъло, чтобы тетерева слетали одинъ за другимъ, а не поднимались всѣмъ стадомъ за разъ – иначе въ каждый перелетъ сдълаешь два, ръдко три-четыре выстрѣла, да и въ слѣдующіе раза стая, напуганная выстръломъ, иногда летитъ уже мимо, не останавливаясь. Всего лучше разбить предварительно стаю на ифеколько меньшихъ, такъ какъ загонять последнія гораздо легче, и перелеть иногда совершается почти непрерывно. Вотъ здѣсь-то и сказывается необходимость въ двухъ, даже трехъ загонщикахъ и притомъ верхомъ на лонадяхъ, потому что время дорого, а изынему не скоро обойти инфоко разсъвшуюся стаю. Изъ этихъ загонщиковъ одинъ, напболъе опытный, выгоняетъ тетеревовъ изъболота, а другой здетъ въ совершенио противоположную сторону и долженъ неренять птицу, пролетфвицю мимо шалаша или слетввиную съ присады отъ выстръловъ, и гнать ее обратно. На нервыхъ лежитъ также весьма трудная обязанность подгонять тетеревовъ, съвникъ вив выстръла, что требуетъ больной ловкости.

^{*)} Это правило соблюдается далеко не всеми охотниками, подъ благовиднымъ предлогомъ—пріученія тетеревовъ къ виду чучель. Но главная причина тому—лень, темъ более, что. напротивъ, чучела, предоставленныя ветру, дождю и хищнымъ птицамъ, очень скоро становятся не приманкой, а пугаломъ птины. Саоапъевъ.

Въ этомъ случат загонщикъ не подътзжаетъ очень близко къ птицъ и долженъ часто останавливаться: тетерева, видя его постепенное приближеніе, начинаютъ безпоконться и одинъ за другимъ перелетаютъ на итъсколько десятковъ саженъ далъе, т.-е. къ шалашу.

"Отпустивъ загонщиковъ, прежде всего необходимо хорошенько осмотрѣться: замѣтить гдѣ поставлены чучела, надѣлать со всѣхъ сторонъ шалаша окошечекъ, такъ чтобы можно было удобно прицѣлиться на всѣ близстоящія деревья, а также подрѣзать всѣ торчанціе во внутрь сучья. Для удобства не мѣшаетъ возить съ собой коверъ или, еще лучше, небольшую скамеечку, потому что лежать на сырой землѣ, тѣмъ болѣе на снѣгу, не совсѣмъ пріятно и здорово. Затѣмъ заряжаютъ ружья, смотрятъ все ли въ порядкѣ и подъ рукой—и у васъ еще остается много времени, такъ какъ перѣдко проходитъ цѣлый часъ, пока загонщики выгонятъ тетеревовъ изъ болота. Но если вы пріѣхали поздно и застали стаю сидящею на опушкѣ, тогда уже печего медлить и необходимо быть наготовѣ. Впрочемъ, такая охота рѣдко бываетъ удачна: тетерева не очень довѣрчиво летятъ къ тому мѣсту, гдѣ только что видѣли людей и нерѣдко летятъ черезъ шалашъ, не присаживаясь къ чучеламъ.

"Обыкновенно стая все время держится неподалеку отъ шалаша въ окружающей опушкъ и не возвращается въ болото. По этой причинъ главный загонщикъ начинаетъ помогать второму, только подальше отъ него. Если же шалангь, какъ это часто бываетъ, сдъланъ по примфру прежнихъ лътъ, или даже наудачу, — хотя на удобномъ и видномъ м'вств, то въ такомъ случат оба загонщика разъдзжаются въ разныя стороны и дають большой кругъ, версты по двъ или болъе въ діаметръ. Главная обязанность загонщиковъ состоитъ въ томъ, что они не должны давать тетеревамъ нафдаться, такъ какъ голодная птица дольше летаетъ, замъчать куда упала подстръленная, внимательно смотръть, не сидитъ ли гдъ-нибудь тетеря или двъ, куда полетфла вся стая—и на рысяхъ, или даже вскачь немедля отправляться за нею. Незадолго до заката солнца, ппогда менфе чфмъ за часъ, вся стая окончательно улетаетъ въ болото и, посидъвъ нъкоторое время на деревьяхъ, спускается на землю. Выгонять ее отсюда—совершенно напрасный трудъ. Замътимъ кстати, что тетерева, перемъщаяясь, обыкновенно какъ бы кудахчутъ, а садясь кыркаютъ, но ужъ гораздо тише.

"Удача охоты зависить отъ соблюденія всѣхъ вышеозначенныхъ условій, а прежде всего — отъ выбора мѣста, умѣнья загонщиковъ, отъ шалаша, хорошихъ чучелъ и благопріятной погоды. Всего удачнѣе бываетъ охота въ первый снѣгъ — по порошѣ; туманная же погода и сильный иней, напротивъ, удобны только для охоты съ подъѣзда. Во всякомъ случаѣ, никогда не слѣдуетъ давать нѣсколько охотъ нѣсколько дней подъ рядъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, такъ какъ тогда тетерева не только измѣняютъ направленіе своихъ перелетовъ, но даже перекочевываютъ въ другое мѣсто, за нѣсколько

верстъ. Бываютъ также случайныя неудачи, напримъръ, загонщики никакъ не могутъ найти тетеревовъ, а если найдутъ, то послъдние летятъ низомъ, илохо садятся на деревья, и то на нижнихъ сучьяхъэто почти всегда означаетъ, что поблизости летаетъ ястребъ или соколъ, что скоро и не замедлитъ оправдаться, такъ какъ первый рано или поздно не преминеть вибинться съ размаху въ привязанное чучело. Сокола же не такъ опасны для чучелъ, такъ какъ почти никогда не берутъ птицы съ дерева; но кромѣ этихъ хищниковъ много досаждають также луши, пногда даже осовды (Pernis apivorus) и мышеловы (Buteo vulpinus), а подъ вечеръ — большія совы и филины. Первыя тоже часто вігвпляются въ чучела, а ночные хищники большею частію подбирають подстрѣленныхь и убитыхь — иногда подъ самымъ посомъ охотника. На это, впрочемъ, большая мастерица и лиса, но хитрая кумушка редко подходить близко къ шалашу. Какъ извъстно каждому, на этой охотъ, какъ и почти на всякой другой, гдъ приходится стрълять изъ засады, никогда не слъдуетъ выходить изъ шалаша до окончанія охоты и ни въ какомъ случать — подбирать павшихъ птицъ, иначе легко испортить всю охоту. Лучше всего замѣчать, куда упала подстрѣленная птица, а потомъ отыскивать ее съ помощью загонщиковъ. Разумвется, подбираніе убитыхъ и раненыхъ много облегчается при помощи хорошей, очень въжливой собаки, которая не выскакивала бы изъ шалаша при каждомъ выстрълъ; но дъло въ томъ, что комнатный песъ всегда очень мерзнетъ и для него необходимо брать что-нибудь очень теплое.

"Кто касается вооруженія охотника, то нечего и говорить, что здѣсь, больше чѣмъ гдѣ-либо, сказывается преимущество ружья, заряжающагося съ казенной части – передъ шомпольнымъ. За неимѣніемъ же перваго, въ хорошихъ мѣстахъ недостаточно бываетъ и двухъ двухствольныхъ ружей съ заранъе приготовленными зарядами: часто перелетъ разбившейся стан продолжается нѣсколько минутъ подъ рядъ, не останавливаясь, и время тогда очень дорого, такъ что иногда необходимо брать съ собой въ шалашъ еще особаго заатохо триходилось намъ дълать на охот дтохо приходилось намъ дълать на охот дтохо приходилось намъ дълать на охот въ Екатеринбургскомъ увздв. Кромв того, надо имвть въ виду, что ни разу не стръляные тетерева, вообще ненапуганные (исключительно молодые), часто не слетаютъ послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ, при чемъ, разумъется, стръляютъ сначала самого нижияго. Нечего и говорить, что для чучелиной охоты надо брать далекобойное ружье и стрълять крупной дробью, стараясь цълить въ бокъ или голову, но шкакъ не прямо въ зобъ.

"Количество тетеревовъ, убиваемыхъ на чучелиной охотъ, бываетъ ипогда замъчательно велико, и въ этомъ отношении она далеко превосходитъ весеннюю охоту на токахъ, а по качеству добываемой дичи не можетъ сравниться даже съ лѣтней — на выводки. Намъ извѣстны примъры, что въ Зауральскомъ краѣ въ одну вечернюю охоту удавалось убивать до 40, даже 50 штукъ, не считая подстрѣ-

ленныхъ и далеко унавшихъ; но въ среднихъ губерніяхъ и 4-5 шт. считаются весьма хорошею добычею. Нечего и говорить, что охотникъ, по мъръ возможности, щадитъ самокъ, выбивая исключительно косачей".

Другихъ видовъ спеціально осенней охоты на тетеревовъ нѣтъ. Промышленники ставятъ осенью силья на хлѣбныхъ кладяхъ, куда тетерева летаютъ кормиться, но силокъ — общее мѣсто въ промысловыхъ способахъ добыванія дичи. Совсѣмъ не то представляетъ собой зимній сезопъ охоты, еще болѣе разнообразный, нежели весенній, и вмѣстѣ съ тѣмъ неизмѣримо болѣе добычливый.

III.

ЗИМНЯЯ ОХОТА.

Охота съ подътвал.—Охота изъ ямокъ.—Промысловая ловля шатромъ и разными ловушками.

На ряду съ чисто промысловой охотой изъ шалаша осенью же, но особенно въ началѣ зимы практикуется охота за тетеревами съ подъвзда. Охоту это можно начинать уже въ концѣ августа или началѣ сентября, когда тетерева начинаютъ сбиваться въ стан и вылетать на опушки лѣсовъ, къ хлѣбнымъ полямъ, гдѣ любятъ садиться на крестцы сжатаго хлѣба.

Однако, въ это время такая охота носитъ болъе случайный характеръ, такъ какъ взда въ это время года очень трудная, да и другой дичи много. Обыкновенно, зам'ятивъ м'яста, куда тетерева летаютъ кормиться, охотникъ съ товарищемъ или кучеромъ, въ телъгъ въ одну лошадь, вытыжаетъ рано утромъ и, протыжая мимо тетеревиной стан, разсъвшейся на деревьяхъ по опушкъ или на хлъбъ, стръляетъ въ ближайшихъ птицъ. Можно сдълать и такъ; подъѣхавъ на выстрълъ, охотникъ незамътно сваливается съ телъги, чтобы спрятаться за крестецъ или кусты и лучше прицѣлиться, тогда какъ его товарищъ вдетъ дальше. При удачномъ расположении тетеревовъ, такимъ образомъ, удается убить 2—3 штуки, но второго подъезда переместившаяся стая обыкновенно не выдерживаетъ. Кромъ того надо имъть въ виду, что днемъ и подъ вечеръ птицы осторожнъе и не легко подпускаютъ на выстрѣлъ. Изъ этого видно, что такая охота мало добычлива и имфетъ смыслъ только тамъ, гдф тетеревовъ много. Но въ началѣ зимы она пріобрѣтаетъ другой характеръ и становится гораздо занятнъе, являясь въ то же самое время и гораздо болфе добычливой. Тутъ отъ охотника требуется уже гораздо большей ловкости и снаровки для успъха охоты, и чтобы познакомить съ ея общимъ ходомъ, приведемъ превосходное описание этой охоты, сдъланное С. Т. Аксаковымъ.

"Стръльба тетеревовъ въ осень по голу, или черностопу, какъ

говорять охотники, а также но первозимью, по неглубокому еще сибгу, имбеть свой особенный характеръ. Она называется: стрѣльба съ подъбзда. Осение дожди, утрение морозы и вѣтры обнажили деревья. Намоченная земля сдѣлалась мягкая, и подъбзжать къ тетеревамъ стало удобно, не шумно, даже на колесахъ. Но вотъ, наконецъ, первый пушистый снъгъ покрываетъ землю — вотъ лучшее время подъбзда.

"Уже шесть часовъ утра, а еще совершенно темно. Охотникъ давно проспулся, давно всталь и одблея со свъчкой. Ружье и всъ охотипчы вени и припасы съ вечера приготовлены и лежатъ на особомъ столъ, Лонади поданы, Мъста стръльбы не близки, разсвънетъ дорогой, пора жхать. Онъ садится въ невысокія сапи съ широкими наклестками "), чтобы ловко было, прицеливаясь, опереться на нихъ локтемъ, и бережно закрываетъ ружье суконнымъ чехломъ или просто шинелью, чтобы не заметало его сифгомъ изъ-подъ конскихъ копытъ. Полетъла бойкая тройка ***). Вездъ путь по первому маленькому снъгу: горы и овраги не помъха простому и прочному устройству охотипчыхъ саней. Вотъ, наконецъ, и хлѣбныя поля, еще не совсѣмъ занесенныя снѣгомъ, куда тетерева повадились летать за лакомствомъ, сытною пищею, вотъ и опущки лѣса, молодыя осиновыя н березовыя заросли, въ которыхъ тетерева непремѣнно ночуютъ, если большой ястребъ или беркуть не угналь ихъ наканунѣ куданибудь подальше. Здівсь надобно остановиться, лошадямъ вздохнуть н самому охотинку осмотрфться и подождать вылета тетеревовъ. Вотъ уже совству разсвъю, вороны закаркали и полетъли съ ночлега, сороки вдалект щекочутъ, завидя какую-то диковинку... Съ нетеритьніемъ озпрается во всѣ стороны охотникъ и привычный къ дѣлу его кучеръ: ничего не видать. Вдругъ на обнаженныхъ сучьяхъ далекой, старой березы появилось темное, кругловатое тѣло, вотъ другое, третье... Это тетерева подымаются съ ночлега. Охотникъ скачетъ къ нимъ во весь опоръ, чтобы папасть на голодныхъ и еще не собравинихся въ одну большую стаю, ибо большая стая летаетъ иногда за кормомъ очень далеко въ хлібоныя поля, куда повадились они летать съ осени. Охотникъ начинаетъ подътзжать къ тетеревамъ, выбирая

^{*} Загибъ полозьевъ саней долженъ быть пологій, чтобы сани не упирались въ кочки и валежникъ.

^{**)} Подъвзжать къ тетеревамъ въ одну лошадь безъ сомнвнів имъетъ пѣкоторыя преимущества: съ одной стороны, въ одну лошадь удобиве провъжать по мелколѣсью, кустамъ и опушкамъ, съ другой — тетерева скорве подпускають въ одну лошадь, такъ какъ привыкли къ крестьянскимъ телъгамъ и санямъ, провъжающимъ мимо ихъ по разнымъ налобностямъ. Но на одной лошади далеко не увдещь, особенно когда снѣга выпадетъ больше и въда станетъ тяжелѣе. Тройкой же можно изъвъдить въ день нѣсколько десятковъ версть, что съ избыткомъ вознаграждаетъ неулобства болье шумнаго троичнаго подъвзда. Поэтому, въ юго-восточной Россіи, при огромныхъ разстояніяхъ охотничьяго района каждаго охотника, троечный подъвздъ долженъ быть безусловно предпочтенъ одиночному; напротивъ, въ восточной и средней, при островномъ характерѣ лѣсовъ, лучше подъвзжать въ одиночку, на смирной, непугливой, по и нелѣнивой лошади.

ближайшаго или крайняго. Главное условіє подъбзда: шикогда не направлять лошадей прямо на тетерева и никогда не подъфзжать къ нему езади, разумъется, если вынолнить то и другое позволяетъ мъстность; надобно такъ подъезжать, что какъ будто вы едете мимо. Тетерева (да и всякая птица) не любятъ, когда ъдутъ прямо на нихъ, особенно, если ѣдутъ езади. Они начнутъ безпрестанно оглядываться и скоро улетять, не воднустивь въ мфру ружейнаго выстръда. Случается иногда, если имъ почему-инбудь не хочется слетать съ дерева, что тетерева поворачиваются носами къ подътажающему сзади охотнику, но это исключение. Если тетеревъ, сидя на сучкъ, въ то же время хватаетъ древесныя почки или плотно сидитъ нахохливнию, это значить, что тетеревъ смиренъ и не думаетъ улетъть: слъдовательно, охотникъ можетъ подътвзжать ближе. Когда же тетеревъ вытянуль шею, всталь на ноги, безпрестанно повертываеть голову направо и нал'вво, или, д'влая боковые шаги къ тонкому концу сука, потихоньку кудахчетъ какъ курица, то охотникъ долженъ стрълять немедленно, если подъбхалъ уже въ м'юру: тетеревъ сбирается въ путь; онъ вдругъ присядеть и слетить. Безъ крайней необходимости не должно стрълять тетеревовъ далеко, особенно въ летъ: отъ 35 до 45 шаговъ — вотъ настоящая мъра. Конечно, можно убить тетерева на 60 п даже на 70 шаговъ, но это ръдкость; опъ необыкновенно крѣпокъ къ ружью, особенно косачъ; на большую мѣру очень рѣдко убъешь его наповалъ, и не только раненый слегка, но раненый смертельно, опъ удетаетъ на большое разстояние и пропадаетъ. Миъ случалось видать, что у подстраленнаго тетерева каплетъ кровь изо рта (вѣрный признакъ внутренней, смертельной раны) и онъ летитъ. Этого мало: у тетерева такъ расшибенъ задъ, что висятъ кишки, онъ летитъ. Послъднему обстоятельству повърятъ только охотники, которые сами это видъли, или слыхали отъ достовърныхъ самовидцевъ. Изъ всего сказаннаго мною слъдуетъ, что послъ каждаго выстръла, если тетеревъ не упалъ, надобно смотръть за нимъ, пока онъ не улетитъ изъ глазъ. Правило-необходимое и важное для всякой дичи. Весьма часто случается, что тяжело раненый тетеревъ слетаетъ съ дерева какъ ни въ чемъ ни бывало; но, пролетъвъ иногда довольно значительное пространство, вдругъ поднимается вверхъ столбомъ и падаетъ мертвымъ. Очень ръдко бываетъ, чтобы раненый тетеревъ упалъ налету прямо внизъ, не сдълавъ подъема кверху. Надобно весьма хорошо замѣтить мѣсто, гдв онъ упадетъ, и скакать туда немедленно, особенно если снътъ довольно глубокъ, и тетеревъ упаль въ лѣсъ или въ кустахъ; пухлый снѣгъ совершенно его засыплетъ, и потерявъ мъсто изъ глазъ, вы ни за что его послѣ не найдете, развѣ, укажутъ сороки и вороны, которыя сейчасъ налетятъ на мертвую птицу, лишь бы только зам'ятить имъ, что она упала.

"Найденныхъ сначала голодныхъ тетеревовъ охотникъ долженъ преслѣдовать и стрѣлять до тѣхъ поръ, пока они разобьются и разлетятся въ разныя стороны. Потомъ онъ поскачетъ отыскивать дру-

гія тетеревиныя стап на обыкновенныхъ мфстахъ ихъ корма, и если не застанетъ тамъ, то найдетъ гдв-нибудь въ окрестности. Тетерева, утоливъ голодъ, сядутъ отдыхать или на одно больное, развъсистое дерево и облъпятъ его со всъхъ сторонъ, или разсядутся на нъсколькихъ деревьяхъ; но всегда зобами противъ вътра. Тутъ опять начинается та же исторія: если тетерева въ кучъ, то не подпустятъ и, слетая одинъ за другимъ, вев размъстятся вразсынную по разнымъ окольнымъ деревьямъ. Охотникъ начинаетъ подъвзжать всегда къ країнему тетереву и предпочтительно къ одному или двумъ: нбо чѣмъ меньше тетеревовъ на деревъ, тъмъ они смирнъе и подпускаютъ ближе. Такая стръльба можетъ продолжаться до вечера, разумвется, если мъстность удобна и тетеревамъ некуда улетъть далеко. Не стръляныя тетеревіння стан, сидящія вразсынную, бывають очень смирны. Одного убъещь, а другіе сидять кругомъ спокойно; но напуганныя частой стрізльбой становятся очень сторожки, и подпускають въ міру только рано утромъ, пока голодны. Такую напуганную стаю надо на время оставить и отыскать другую; черезъ недалю можно опять воротиться къ ней: она сдълается смириће. Вообще курочки смириће косачей; и тѣ и другіе смирнѣе въ туманную, мокрую и тихую погоду, чъмъ въ ясную, сухую и вътреную. Кръпость къ ружью тетеревовъ растетъ съ морозами и доходитъ иногда до такой степени, что приводитъ въ отчаяние охотника; по крайней мъръ я и другие мои товарищи испытали это не одинъ разъ на себъ. Не одинъ разъ думалъ я, что мое ружье разстрълялось или погнулось, что слабъ порохъ или невърны заряды; миъ случалось дълать до 25 выстръловъ, и убить трехъ или четырехъ тетеревовъ. Даже подбитыхъ было мало. Воротясь домой, я отвертывалъ казенникъ, прикладывалъ стволъ на струну, проходилъ его легкимъ шустомъ, и все оказывалось исправно. Пробоваль въ цѣль—ружье било хорошо, какъ прежде. Сдѣлавъ тщательно заряды самъ, отправлялся я за тетеревами, и ружье било опять очень плохо. Съ другимъ и третыимъ ружьемъ повторялась та же исторія. Между тімъ эти же самыя ружья весною начинали бить, попрежнему, хорошо. Настоящая причина этой неимовърной кръпости, особенно косача, происходить отъ того, что перья, покрывающія его зобъ и верхиюю часть хлупи (не говорю уже о большихъ перьяхъ въ крыльяхъ), делаются отъ холода такъ жестки и гладки, что дробь, въ извъстномъ разстоянии и направлении, скользитъ по нимъ и скатывается"... Поэтому въ позднее время года надо стрълять тетеревовъ даже гусиной дробью и при этомъ все-таки не цѣлить въ зобъ птицы. Впрочемъ, когда сиъга выпадетъ много и морозы усилятся, охота на тетеревовъ съ подътвада прекращается, какъ потому, что тада по глубокому сићгу очень трудна, такъ и потому, что тетерева, собравнись въ больния стан, становятся очень строги и, къ тому же, держатся болъе внутри лъса, гдъ имъ тенлъе, но гдъ стръльба затруднительна ").

 $^{^*}$) Г. В. П—кій, описывая охоту на тетеревовъ съ подъ $^{\pm}$ зда въ Семипалатинской области, рекомендуетъ стр $^{\pm}$ лять изъ малопульной винтовки, такъ какъ при этомъ можно

Зато, витсто прекративнейся охоты съ подътвада, зимою практикуется особый, спеціально-зимній способъ охоты на тетеревовъ изъямокъ или изъ лунокъ (Вятская губ.). Впервые она упоминается И. Шведовымъ въ Журналѣ охоты Мина за 1860 г. и тамъ же описана тъмъ же прекраснымъ охотикомъ и наблюдателемъ (къ сожалънію рано умеринимъ) въ 1862 г. Поздиже этотъ же способъ охоты описанъ г. Бъловымъ для Вятской губ. Сущность этой охоты состоитъ въ слъдующемъ.

Зимою тетерева, патвиниеь, спускаются въ сибгъ, зарываясь въ глубокіе сугробы, гдт почуютъ и даже проводятъ иткоторую часть дня. Обыкновенно стая слетаетъ въ сибгъ тамъ же, гдт кормилась, и при этомъ каждый тетеревъ дълаетъ въ сибгу ямку, откуда и названіе этой охоты. Чаще всего стая запрятывается въ сибгъ на небольномъ пространствт и каждая ямка отстоитъ отъ другой на итсколько шаговъ. Свтъжая ямка всегда одиночна, продолговата, съ итсколько разсыпавнимся впереди сибгомъ; если же въ разстояніи полуаршина отъ нея находится другое болте широкое углубленіе, по сторонамъ котораго на сибгу замѣтны слъды крыльевъ птицы, это значитъ, что тетеревъ уже вылетъль изъ своего временнаго убъжница.

Зная гдъ тетерева кормятся и провърнвъ это по свъжеосыпавнимся березовымъ сережкамъ и шелухъ березовыхъ ночекъ, или просто прослъдивъ, куда спустилась тетеревиная стая на ночлегъ, можно надъяться найти и тетеревиныя ямки, которыя, къ тому же, видны на гладкой поверхности снъга уже на разстояни пъсколькихъ десятковъ саженей.

Такъ какъ искать тетеревовъ по рыхлому сп'вгу п'вшкомъ країне утомительно, это обыкновенно д'влаютъ подъ'взжая въ саняхъ, или разнообразя охотою изъ ямокъ охоту съ подъ'взда. Удачн'ве всего охота бываетъ къ сумеркамъ, когда тетерева, уснувъ въ сн'вгу, не слышатъ шаговъ охотника и вылетаютъ поодиночк'ъ. Кром'ъ того, они кр'впче сидятъ въ бол'ве глубокомъ сн'вгу.

бить на разстоянін до 200 щаговъ, конечно съ сошекъ. Онъ же говоритъ, что погода при охоть съ подъезда «первое дело. Въ слишкомъ сильные морозы тетерева или вовсе не выдетають, отсиживаясь подъ снъгомь, или же забираются въ средину самыхъ густыхъ сосенъ; въ сильный, особенно съверный вътеръ, они не сидятъ, постоянно перелетають и подпускають плохо. Лучшая погода-или ясный тихій солнечный день, при умфренномъ морозѣ, или же сумрачный, но теплый и опять-таки тихій день, хотя бы со сньгомъ. Въ такую погоду тетерева разсаживаются по вершинамь сосенъ; въ вътеръ же садятся преимущественно на сухари». При обили тетеревовъ въ Семипалатинской области тремъ охотникамъ въ два дня съ подъезда удавалось брать до 150 штукъ. Л. М. Ушковъ также совътуетъ при охотъ съ подъъзда стрълять изъ винтовки, такъ какъ тетерева часто не подпускають даже на дальній выстрель дробовика. Главная трудность при стрельбе изъ малопульной винтовки заряжение ея на морозъ; но зато бъетъ она превосходно, подранковъ не бываетъ и даже порядочный стрълокъ всегда обстръляетъ охотника съ дробовикомъ. Г. Ушковъ считаетъ лучшей винтовкой для такой охоты—винтовку центральиаго боя, калибръ № 380, работы Лебеды. Можетъ быть она бьетъ и не такъ точно, какъ обыкновенная малопульная, но зато ее легко заряжать. Однако на всякій случай надо съ собою брать и дробовикъ, особенно, чтобы перегонять тетеревовъ изъ лѣса въ лѣсъ.

Вся охота должна производиться такъ. Отыскавъ ямки, охотникъ оставляетъ сани и, держа ружье наготовъ, направляется къ ближайшей ямкъ. Заслышавъ опасность, тетерева подпимаются изъ снъга, но
чтобы оправиться, имъ все-таки пужно нъсколько секундъ и этого
охотнику достаточно, чтобы стрълять въ летъ удачно. За выстръломъ
поднимаются и другіе тетерева, и вся охота по одной стаъ оканчивается обыкновенно послъ очень немногихъ выстръловъ. Но въ нъкоторыхъ случаяхъ, именно совсъмъ подъ вечеръ и при стръльбъ
непутанныхъ тетеревовъ, удается убить штукъ 5—6, конечно при
стръльбъ изъ ружья, заряжающагося съ казенной части.

Такъ какъ стрълять приходится на близкомъ разстоянии и на сравнительно открытомъ мѣстѣ, можно употреблять дробь не такую крупную, какъ при стрѣльбѣ съ подъѣзда, именно №№ 4 и 5. Къ этому можно прибавить, что, смотря по свойствамъ спѣга, къ тетеревамъ иногда лучше подходить на лыжахъ, и если охотятся вечеромъ, когда тетерева забрались въ снѣгъ на ночлегъ, надо пропустить около часа, чтобы птицы могли обсидѣться и задремать (тетерева зарываются въ спѣгъ на ночь рано, такъ что времени для охоты остается еще довольно). Охота изъ ямокъ прекращается, когда спѣгъ начинаетъ подтанвать и образуется настъ; тетерева тогда забираются въ чащу, гдѣ спѣгъ рыхлѣе, и тамъ охота за ними уже положительно невозможна.

Теперь мы переходимъ къ описанію ловли тетеревовъ шатромъ, что представляєть собою какъ бы переходъ къ настоящимъ промысловымъ добываніямъ этой птицы, и еще разъ приведемъ описаніе этого способа охоты со словъ Аксакова, сдълавъ къ нему лишь нѣкоторыя дополненія, настолько полно и хорошо сдълано это описаніе.

"Въроятно, двъ трети тетеревовъ и сърыхъ куропатокъ (особенно послъднихъ), потребляемыхъ въ Россіи въ огромномъ количествъ, крыты шатрами. Хотя эту охоту положительно можно назвать добычливою, въ промышленномъ значеніи этого слова, но въ скучное безконечное зимнее время, въ отдаленной деревнъ, за отсутствіемъ всъхъ другихъ охотъ, можно и ею заняться съ удовольствіемъ. Я знавалъ многихъ людей, большихъ охотниковъ "крыть тетеревовъ и куропатокъ". Я самъ въ ранней молодости горячо имъ сочувствовалъ и много ъзжалъ со стариками, несмотря ни на какую погоду, не только крыть уже приваженную итицу, по даже разставлять привады,—что, въроятно, не многимъ можетъ понравиться. Эта охота имъетъ свои тонкости, свое знанье дъла, свое умънье, свои удачи и неудачи, слъдственно имъетъ свой интересъ.

"Шатромъ пазывается сѣть, связанная изъ суровыхъ, посконныхъ и преимущественно конопляныхъ крѣпкихъ нитокъ. Эта птицеловная снасть представляетъ подобіе колпака или воронки, или, всего ближе— островерхой палатки, шатра, отчего и названа очень вѣрно этимъ послѣднимъ именемъ. Квадратныя ячейки шатровой тетеревиной сѣти имѣютъ въ поперечникѣ, вверху шатра, одинъ вершокъ, а внизу—

полтора вершка; эта ширина необходима для того, чтобы накрытая птица могла свободно просупуть голову и шею до самыхъ крыльевъ; чтобъ, обманутая этой свободой, она ностоянно пробивалась, лъзла впередъ, а никакъ не вздумала вынуть голову назадъ и выбъжать изъподъ шатра. Цънность сътки зависитъ отъ топины интокъ и ширины петель или ячеекъ. Чъмъ интки топьше, а петли ингре, тъмъ лучше: само собою разумъется, что интки не должны рваться, а сквозь ячейки не должна пролъзать птица. Величина шатра можетъ быть произвольная; но, по большой части, окружность его, когда шатеръ поставленъ и растянутъ, бываетъ въ десять саженъ.

"Охотникъ, зашимающійся ловлею шатромъ, еще съ осени наблюдаетъ за тетеревами и знаетъ: много ли ихъ, гдѣ они предпочтительно держатся и куда летаютъ кормиться. Какъ скоро выпадетъ порядочный сивгъ, онъ ставитъ привады именно на тѣ мѣста, куда тетерева повадились детать за кормомъ. Привада состоитъ изъ ифсколькихъ овеяныхъ необмолоченныхъ сноповъ, воткнутыхъ въ снѣгъ стоймя, разумъется кистями кверху, и непремънно изъ кучи какой-нибудь соломы, сложенной конною въ четырехъ или пяти саженяхъ отъ привады: эта куча соломы впослъдствін преобразится въ шалангь, въ которомъ будеть сидъть охотникъ, когда придеть время крыть тетеревовъ. Разставивъ ифсколько такихъ привадъ, охотникъ, дня черезъ два, начинаетъ ихъ осматривать, наблюдая следующія предосторожности: 1) Онъ осматриваетъ привады на лошади, въ санкахъ, а не пѣшкомъ, и преимущественно въ полдень, когда тетерева уже побывали на кормовыхъ мъстахъ и улетъли на такія, гдъ они обыкновенно отдыхають, сидя на деревьяхь, или на земль, если сиъть еще мелокъ. 2) Такъ какъ иногда случается, что тетерева полднюютъ недалеко отъ привадъ, то надобно приближаться къ нимъ весьма осмотрительно, то-есть не подътзжать прямо къ привадъ, не вылъзать изъ саней и не подходить къ ней, а профхать мимо поближе (ибо человъка, ъдущаго на саняхъ, тетерева не боятся), такъ, чтобъ можно было разглядъть: бывають тетерева на привадъ или нътъ. 3) Если слъдовъ тетеревиныхъ много и снопы растрепаны, обиты и обдерганы, то надобно ихъ оправить и прибавить свѣжихъ; но если тетерева сидятъ близко, то-есть въ виду, то ни подъ какимъ видомъ на приваду не ходить и даже не останавливаться. Оправку старыхъ сноповъ и прибавку новыхъ можно сдълать на другой день; а если опять тетерева будутъ сидъть не подалеку, то сдълать все это рано ноутру, то-есть на зарѣ, до ихъ вылета, или поздно вечеромъ, когда они сядутъ на ночевку. Въ свътлыя, мъсячныя ночи оправляютъ привады даже по ночамъ; впрочемъ многіе охотники дѣлаютъ это всегда на утренней зарѣ, для того, чтобы къ прилету тетеревовъ привады находились въ хорошемъ видъ: это имъетъ свою полезную сторону. Въ снъжную, буранную (по-оренбургски) погоду необходимо каждый день задить на привады и отряхивать снопы отъ снѣга, чтобъ они были виднѣе и приманчивъе. Необходимо также отряхивать снъгъ съ копны содомы для того, чтобы тетерева привыкали постоянно видѣть будущій шалангь.

"Если привада стоитъ педбли двъ, не посъщаемая тетеревами, и даже поблизости ихъ не видно, то надобно ее перенесть на другое мъсто; какъ же скоро на ивкоторыхъ привадахъ тетерева начнутъ фсть, то всф другія около нихъ следуетъ уничтожить совершенно и закидать сибгомъ, чтобы онв тетеревовъ не развлекали въ разныя стороны. Ходъ тетеревовъ на привады загадочное дфло! Въ иной годъ идутъ очень хорошо, а въ другой очень плохо; бываютъ года, что нейдуть совствы: такъ, что сдъ крыли въ зиму паръ по двъсти-не покроютъ и двухъ десятковъ. Иногда это можно объяснить случайнымъ изобиліемъ кормовъ (если хліббъ остался въ полів не сжатымъ), малоси вжностью зимы, отсутствиемъ сильныхъ морозовъ "); но иногда ивтъ ни одной изъ вышесказанныхъ причинъ, тетеревовъ много, а тетерева нейдутъ на привады, да и только! Не одинъ разъ видалъ я, какъ большія тетеревиныя стан сидять кругомъ привады и щиплятъ себф тощія березовыя почки или ольховыя шишки, поглядываютъ умильно на желтыя кисти овсяныхъ сноповъ и-не приближаются къ нимъ! Мало этого: изъ стан паръ въ сорокъ, два или три тетерева всякій день слетятъ на приваду и ѣдятъ овсяныя зерна до сыта, а всѣ другіе только смотрять. Последнее обстоятельство темъ удивительнее, что тетерева имъютъ, всъмъ охотникамъ извъстное, баранье свойство: куда полетътъ и гдъ сълъ одинъ-туда полетятъ и тамъ сядутъ всъ. На этомъ-то основании, для большаго привлеченья тетеревовъ, сначала къ привадъ, потомъ подъ шатеръ, употребляютъ тетеревиныя чучела; въ первомъ случат ставятъ ихъ на длинныхъ шестахъ около привады; а въ послъднемъ на снопы, лежаще на самой привадъ. Иногда такая приманка бываетъ очень полезна.

"Привада, на которой таятъ постоянио тетерева, получаетъ по немногу свой окончательный видъ, то-есть: въ серединъ привады становится шестъ, аршина въ три вышиною, на которомъ будетъ держаться сътъ; около него, правильнымъ кругомъ, набиваются колышки, каждый четверти въ полторы, къ которымъ будутъ привязаны веревочками нижніе подборы шатра,—и, наконецъ, куча соломы превращается въ шалашъ, въ которомъ могли бы помъститься два человъка. Если, послъ встъхъ этихъ добавленій, сдъланныхъ не вдругъ, а постепенно, чтобъ измъненіемъ вида привады не испугать тетеревовъ, станутъ они ежедневно и смъло теть кормъ—слъдуетъ немедленно крыть итицу. День для сего выбирается не спъжный и не вътреный: спътъ заноситъ приваду, налинаетъ на съть и можетъ даже новалить

^{*)} Въ малосифжныя зимы хлѣбныя жнивы и озими иногда до февраля мало бываютъ покрыты сифгомъ, и тетерева по привычкѣ продолжаютъ летать на нихъ, для отыскиванья корма. Въ теплыя же зимы, по мифнію охотниковъ, тетерева мало фдять и довольствуются одними древесными почками. Въ обоихъ случаяхъ, они не собираются въ большія стаи. Что холодъ возбуждаетъ аннетить у всфхъ животныхъ—это дфло извъстное. Аксаковъ.

шатеръ, а вътеръ качаетъ его и также можетъ уронить; и то и другое обстоятельство, особенно последнее (то-есть качка шатра), путаеть тетеревовъ и опи подъ шатеръ не пойдутъ; одинмъ словомъ: чѣмъ морозъ еплытье и погода тише, тъмъ лучше. На заръ, за долго до выдета тетеревовъ съ ночевки, охотникъ съ товарищемъ являются на привадь и разставляють шатеръ: узкимъ концомъ надъвають его на шесть, подложивъ подъ самый узель верхушки небольшую круглую дощечку; нижніе подборы или края привязываются тонкими и крфикими веревочками къ кольникамъ (которыхъ бываетъ до двадцати), шатеръ растягивается во всф стороны и совершенно представляетъ фигуру круглой, островерхой, огромной палатки. Нижне края евти поднимаются отъ поверхности спъга (пъеколько утоптаннаго) четверти на двъ, чтооъ тетеревамъ было свободно и не странию подходить подъ шатеръ. Къ шесту, на которомъ держится верхушка шатра, въ самомъ низу привязана веревка, протянутая въ шалашъ: она засыпается слегка сибгомъ, чтобъ ее не было видно. Шестъ, до того времени кржико воткнутый острымъ концомъ своимъ въ снфгъ или землю, тогда обрубается гладко и устанавливается на маленькой дощечкъ, для того, чтобы дернувъ за веревку, легко было его уронить и мгновенно накрыть тетеревовъ упавшею на нихъ сътью. Устронвъ все хорошенько и затрусивъ евои слъды, дощечку и веревку на самой привадъ мякиной, а около нея сибгомъ, - охотникъ еъ товарищемъ садятся въ шалашъ, затыкаютъ входъ изнутри соломой и, притаясь, смирно дожидаются прилета тетеревовъ.

"Долго тянется зимній разсвітть и долго царствуєть глубокая тишина. Скучно и душно сидъть въ темномъ шалашъ. Наконецъ, свътъ проникаетъ въ его скважины, и на дворъ наступаетъ бълый день, какъ говорится; послышится карканье воронъ и щекотанье сорокъ; потомъ заскрипять сингири и зазвенять произительно голоса зеленыхъ и голубыхъ синицъ (бѣсковъ—по-оренбургски), также привыкшихъ кормиться около привады. Қакъ, бывало, обрадуешься голосу живой твари! Но вотъ зардълся юго-востокъ, солнце готово выкатиться изъ-за горы; наступило время прилета тетеревовъ на приваду, которое, впрочемъ, иногда можетъ замедлиться отъ разныхъ причинъ. Вдругъ прошумълъ сильный вътеръ... стая тетеревовъ пронеслась надъ шалашомъ и разсълась около него по деревьямъ, а если ихъ нътъ поблизости (что бываетъ на привадахъ полевыхъ), то по сиъгу; даже садятся иногда на шалашъ и на шатеръ *). Вотъ самая интересная минута! Видъ шатра такъ иногда поражаетъ тетеревовъ, что они, посидъвъ итсколько минутъ на деревьяхъ, или побродя по ситгу около привады, — вдругъ улетаютъ, какъ будто чѣмъ испуганные; иногда остаются довольно долго, но не подходять подъ шатеръ; иногда

^{*)} Однажды при мить тетеревъ сълъ на верхушку шалаша, провалился ногами и сталъ биться; охотникъ принужденъ былъ схватить его за ноги и протащить въ шалашъ, чтобъ онъ хлопаньемъ кртпкихъ своихъ крыльевъ не перепугалъ тетеревовъ. Аксаковъ.

подойдуть два-три тетерева (въроятно посмъдъе другихъ) и досыта набдятся, а веб остальные или смотрять, или клюють древесныя почки, точь въ точь, какъ это бываетъ съ первоначала, или въ такіе года, когда изтъ хода тетеревамъ на привады. Впрочемъ, такіе случан-отступление отъ обыкновеннаго порядка. По большей части тетерева, привыкине безъ опасенія ежедневно нафдаться на привадь, не смущаются видомъ шатра и, осмотрѣвшись, черезъ иѣсколько минутъ, одинъ за другимъ, вев подойдутъ подъ шатеръ. Тогда охотникъ сильно дергаетъ за веревку, шестъ падаетъ, съ нимъ вмъсть падаетъ съть, н-тетерева покрыты. Это дъйствие называется: "уронить шатеръ". Охотникъ съ товарищемъ выскакиваютъ изъ шалаша и, если тетеревовъ очень много и они, взлетывая, поднимають на себф сфть высоко, такъ что шижніе тетерева, не успѣвшіе запутаться, выбѣгають изъподъ шатра и улетаютъ, — охотники бросаются на шатеръ, опускаютъ его къ низу и придерживають нижніе подборы до тіхть поръ, пока всь покрытые тетерева увязнуть въ ячейкахъ съти. Тогда колять ихъ въ голову перьями, тутъ же выдернутыми изъ крыльевъ, или простымъ желфзнымъ гвоздемъ, или заостренной, крфпкой деревянной палочкой, которыми запасаются заранъе. Чуваши, мордва и татары, въ Оренбургской губерній, очень усердно занимающіеся ловлею тетеревовъ натрами, съ покрытыми управляются безъ церемоніи, т.-е., не колятъ, а быотъ ихъ налками. Если тетеревиная стая съ перваго раза покрыта не вся, что по большей части бываеть, то приваду надобно оправить: перья всть собрать, утоптанный и окровавленный ситьгъ заметать свіжнить и положить новых вовсяных сноповъ. Пногда случается, что остальные тетерева, часть которыхъ была покрыта, черезъ нъсколько времени опять станутъ прилетать на приваду и ъсть кормъ, такъ что въ одну зиму, на одной и той же привадъ кроютъ тетеревовъ раза три; но иногда, послѣ перваго покрытія, уже ни одинъ тетеревъ на приваду не прилетитъ. Замъчательно, что оставшееся, иногда пебольшое число тетеревовъ, посъщая попрежнему приваду, неръдко приводитъ съ собою новую тетеревиную стаю.

"Важною пом'яхою въ приваживании тетеревовъ бываютъ большіе ястреба и орлы; они ловятъ тетеревовъ и часто угоняютъ далеко съ привады; если это повторится и всколько разъ, то тетерева совствиъ бросаютъ приваду, хотя бы и привыкли къ ней. Въ такомъ случатъ, самое лучшее средство — застрълить ястреба или орла, но крайней мъръ ранить. Для этого надобно поставить недалеко отъ шалаша чучело, сдъланное изъ настоящей тетеревиной кожи съ перьями, привязавъ ее кръпко къ присадъ (т.-е. къ длинному шесту). Орелъ или ястребъ, повадившийся летать на приваду, принявъ чучело за настоящаго тетерева, визъпится въ нее, и охотникъ, карауливший хищника въ шалашъ, можетъ легко застрълить его.

"Все до сихъ поръ сказанное мною относится къ тетеревинымъ привадамъ въ началъ зимы, которыя становятся иногда на хлъбной жинвъ, даже въ изкоторомъ отдалении отъ лъса; но когда выпадаетъ

много сп'ягу, и глубокіе сугробы совершенно закроють самую высокую жинву, тетерева перестапуть детать въ поля и постоянно держатся около д'всныхъ м'ясть и даже въ середнить д'ясовъ, по небольшимъ полянамъ; тогда и привады перепосятся именно на такія поляны и на д'ясныя опушки. Въ буранныя зимы тетерева скоро свадиваются въ уремы *), что обыкновенно бываетъ въ конц'я зимы: тамъ для нихъ тепл'я и сытнъе; охотшки и тамъ пресл'ядуютъ тетеревовъ своими привадами и, несмотря на изобиліе ольховыхъ пишекъ, соблазняютъ овеяными спопами. Ловля шатромъ производится т'ямъ же порядкомъ.

"Если почему-нибудь уже приваженные тетерева не прилетять именно въ то утро, когда шатеръ поставленъ, и охотникъ сидитъ въ шалашѣ, или прилетятъ, по подъ шатеръ не пойдутъ, то иъкоторые охотники шатра не снимаютъ и оставляютъ его до слъдующаго утра, а иногда и на иъсколько дней, будто бы для того, чтобы тетерева къ шатру присмотрѣлись, а въ самомъ дѣлѣ изъ лѣни; по я слыхалъ отъ самыхъ опытныхъ охотниковъ, что этого шкогда дѣлать не должно. Не говоря уже о томъ, что шатеръ можетъ упасть отъ многихъ причинъ и закрыть приваду, а если упадетъ въ присутстви тетеревовъ, то непремѣню ихъ напугаетъ,—шатра не должно оставлять потому, что онъ весь опушится инеемъ и скроетъ совершенно приваду отъ глазъ тетеревовъ. Къ этому должно прибавить, что лежащий на сиъгу шатеръ очень часто нортятъ мыши.

"Должно сдълать общее замъчаніе, что курочки идутъ на приваду и подъ шатеръ гораздо скоръе и охотитье косачей; это въроятно происходитъ оттого, что курочки вообще смирить. Если стая состоитъ изъ одитъхъ курочекъ, то ее привадить къ корму и покрыть несравненно легче; самыя упорныя и осторожныя бываютъ стан изъ однихъ косачей; среднее между ними составляютъ стан смъщанныя, въ которыхъ курочки всегда первыя слетаютъ на приваду и подходятъ подъ шатеръ: за ними, иногда очень не скоро, послъдуютъ и косачи".

Послѣ ловли шатрами на первомъ мѣстѣ стоитъ ловля фальшивыми кладями, уже чисто промысловый способъ добыванія тетеревовъ, не имѣющій ничего общаго съ охотой. Устранваются фальшивыя клади всегда поблизости настоящихъ еще съ осени слѣдующимъ образомъ: вбиваютъ два ряда кольевъ, одинъ отъ другого на разстояніи не болѣе аршина, съ промежутками между кольями около полутора вершка: колья должны быть вбиты возможно крѣпко и выставляться изъ земли на 1½ - 2 аршина. Всѣ бока такого сооруженія забираются, а потомъ еще обкладываются соломой, верхнее же отверстіе закрывается большими, необитыми овсяными снопами, которые расположены вдоль въ горизонтальномъ положеніи и соприкасаются попарно своими колосьями;

^{*)} Мит случилось одинъ разъ видёть свалившихся тетеревовъ въ ольшняковую урему по ръкт Усень (Оренбургской губерніи, Белебеевскаго увзда), въ такомъ множествт, что только своимъ глазамъ можно было повтрить. Это случилось въ половинт ноября. Аксаковъ.

основанія споповъ крѣнко привязываются къ кольямъ. Обивъ верхушки кладей, тетерева замѣчаютъ еще свѣжіе спопы, слетая на нихъ, садятся на ихъ верхушки и проваливаются, а колосья опять принимаютъ горизонтальное положеніе.

Этотъ способъ ловли очень распространенъ въ Нермской губ. и въ Западной Сибири, гдъ его иногда видоизмъняютъ такимъ образомъ, что вмъсто устройства фальнивыхъ кладей, углубленія, покрытыя слегка колосьями, оставляются въ настоящихъ хлъбныхъ кладяхъ.

Затімь слідують такь наз. вентеля, ковши пли тынки, садки, морды и кузовы. Все это довуниц, которыя устранваются на земль заблаговременно и всл'ядствіе своей громоздкости, конечно не могутъ быть переносимы съ мъста на мъсто. Типомъ ихъ можно взять вентель, устройство котораго следующее. Тамъ, где зимой держатся тетерева, въ землю вонвается колъ съ развилкомъ на вершинъ, и къ вътвямъ послъдняго прикръпляется поперечная перекладина съ подвъшенными на ней снопами овса и гречихи. Вокругъ кола въ землю вбиваютъ тонкія жерди на разстоянін $^{1}/_{2}$ вершка другъ отъ друга такимъ образомъ, что получается подобіе вентеля для рыбной ловли; устье его вверху должно нить въ поперечникъ около аршина, а чтобы жерди не раздвигались, ихъ укрѣиляютъ прутьями. Затѣмъ въ устье вентеля вставляются два обруча, вложенные одинъ въ другой, на подвижной оси, которая привъшивается своимъ центромъ къ перекладинъ такимъ образомъ, чтобы обручи даже отъ маленькаго груза опускались внизъ и затъмъ принимали свое прежнее горизонтальное положеніе. Величина країняго обруча должна быть такова, чтобы между нимъ и жердями оставался нѣкоторый промежутокъ, по крайней мъръ съ ладонь руки. Обручи эти обиваются немолоченной соломой съ колосьями. Завидъвъ хлѣбные колосья, тетерева слетаютъ сначала на перекладину, потомъ на обручи, которые повертываются подъ ихъ тяжестью, и провалившись въ вентель уже не могутъ выбраться изъ него всл'ядствіе т'ясноты пом'ященія. При этомъ перекладина должна пом'вщаться на такомъ разстоянін отъ обручей, чтобы тетеревъ никакъ не могъ достать съ нея приманку и непремънно бы слетваъ на нихъ.

Ковить или тынокъ отличается отъ вентеля тѣмъ, что колья или жерди вбиваются не отлого, а вертикально, и овсяные или гречишные снопики привязываются косо къ концамъ кольевъ, колосьями винзъ. Тетерева, садясь на снопы, не могутъ удержаться, съѣзжаютъ въ полость ковща и тоже не могутъ выбраться отсюда. Морда отличается отъ вентеля тѣмъ, что ни кола, ни перекладины на немъ иѣтъ, снопы для приманки привязываются прямо къ концамъ кольевъ, а устъе морды закрывается соломенной крышкой изъ четырехъ лопастей на вращающейся оси. Садясь на эти лонасти, какъ на крылья мельницы, тетерева падаютъ внутръ морды. Кузовъ отличается отъ морды только формой и отсутствемъ крышки, которая замънена неустойчивой перекладиной. Наконецъ, садокъ почти не отличается отъ вентеля, только

устранвается не вокругъ кола съ нерекладиной, а подъ одиниъ концомъ перекладины, устанавливаемой на двухъ кольяхъ.

Переходя теперь къ перепоснымъ довушкамъ, мы встрѣчаемся съ такъ наз. кошами, коробами или корзинами, кльтушками и сач-ками. Конгъ устранвается на землѣ и состоитъ изъ двухъ обручей: шижияго до 2-хъ и болѣе аршинъ въ діаметрѣ и верхияго въ г¹/4 г¹/2 арш. По окружности этихъ обручей прикрѣиляются прутья, толщиною съ больной палецъ, длиною до сажени, настолько часто, чтобы между ними могла пройти только голова птицы. Въ отверстіе вкладываются двѣ крестообразно сложенныя палки, изъ которыхъ одна своими цилипарическими концами вставляется въ край верхияго обруча и служитъ подвижною осью, а другая, нокороче, служитъ для прикрѣпленія приманки изъ овса или гречихи. Чтобы совершенно лишить тетеревовъ возможности выбраться изъ коша, въ него иногда вкладываютъ еще воронку изъ прутьевъ, не достигающую по крайней мѣрѣ на аршинъ до земли.

Коробъ, корзина или клътушка все тотъ же кошъ, только меньшихъ размъровъ и устанавливаемый или на интъ или на деревъ. Клътушка—четырехугольная въ $1-1^{1}$ аришна ширины и вышины, коробъ—въ видѣ боченка изъ прутьевъ съ подвижной крышкой.

Кромф этихъ ловушекъ тетеревовъ ловятъ также давушками, слощами и пастями, типъ которыхъ былъ описанъ въ статъф о рябчикъ, и сильями и пружками, описанными и изображенными тамъ же.

Въ Олонецкой губ, промышленники измыслили еще такой способъ ловли тетеревовъ: изъ рыболовныхъ сътей устраивается сакъ для чего на обручъ, имѣющій г½ арш. въ діаметрѣ, прикрѣиляется сѣть, средина которой привязывается къ длинному шесту; такимъ образомъ выходитъ сакъ-мѣшокъ на обручѣ, подобный тому, которымъ сачатъ—ловятъ рыбу. Днемъ промышленники, ходя по лѣсу, примѣчаютъ, гдѣ тетерева выканываютъ себѣ въ снѣгу почевки, въ которыхъ они укрываются цѣлыми стаями. На эти мѣста ловцы приходятъ ночью вдвоемъ; одинъ несетъ пукъ горящей лучины, а другой держитъ сакъ, которымъ и накрываетъ всю ночующую въ одной ночевкѣ птицу, попадающую изъ снѣжнаго отверстія въ сѣтку.

Уже одного этого перечисленія разныхъ снастей для ловли тетеревовъ, изъ коихъ въ нѣкоторыя ловится сразу по десятку штукъ, достаточно, чтобы составить себѣ нѣкоторое представленіе о количествѣ этихъ птицъ, добываемомъ ежегодно въ цѣляхъ продажи. Если же къ этому прибавить всѣхъ стрѣляныхъ тетеревовъ и тетеревятъ, погибающихъ отъ несвоевременной охоты, намъ станетъ совершенно ясно, что тетеревъ роковымъ образомъ долженъ уменьшаться въ числѣ. Не будетъ удивительно, если въ той или другой мѣстности тетеревъ даже совершенно исчезнетъ. Но пока еще въ этомъ, какъ говорится, съ полгоря, потому что тетеревятъ легко воспитать и, слѣдовательно, тамъ, гдѣ эта птица истреблена, ее можно развести вновь.

О прирученій и одоманинваній тетеревовъ у насъ им'вется очень длишая статья Хватова, изъ которой мы и заимствуемъ все существенное, относящееся до восинтанія тетеревять, отсылая желающихъ заияться собственно прирученіемъ тетерева къ самой стать в *).

Тетеревята, выведенные курицей, сейчасъ же по выводѣ нуждаются въ водѣ, которую имъ надо ставить въ садокъ въ неглубокихъ цвѣточныхъ поддоникахъ. Затѣмъ, на второй день, или еще съ вечера, надо набросать имъ маленькихъ таракановъ и муравьевъ, обваренныхъ кипяткомъ, червей, свѣжихъ муравыныхъ янцъ и т. п. На такомъ кормѣ тетеревятъ надо продержать съ мѣсяцъ, послѣ чего къ указанному корму надо прибавлять постепенно мелко-пскрошеннаго мякина бѣлаго хлѣба изъ 2-го сорта крупчатки, а когда поспѣютъ ягоды, то давать тетеревятамъ столь любимыя ими чернику, клубику, землянику и бруснику. Мѣсяца черезъ два насѣдка бросаетъ тетеревятъ, и для послѣднихъ наступаетъ самое тяжелое время: оставшись одни они теряются и плохо ѣдятъ, и въ это время ихъ больше всего погибаетъ. Однако, черезъ 2 з дня тетеревята привыкаютъ къ своему одиночеству и перестаютъ страдать отъ отсутствія руководительства.

Когда въ полѣ начнетъ созрѣвать зерновой хлѣбъ, надо, нажавъ еще зеленоватаго овса, пшеницы и гречихи, ставить ихъ снопики въ садокъ, чтобы постепенно пріучать тетеревятъ къ зерновому хлѣбу. Отнюдь не слѣдуетъ только давать стручковъ зеленаго гороха, которыми тетеревята давятся. Если зимою кормить тетеревовъ только зерновымъ кормомъ, они не выживаютъ; поэтому отъ времени до времени, хотя раза два въ педѣлю, имъ надо давать того же бѣлаго хлѣба, который давался раньше, изрѣзаннымъ на кусочки въ кедровый орѣхъ величиною, а также кочней свѣжей капусты, березовыхъ банныхъ вѣниковъ и моченой въ водѣ брусники.

Воспитанные такимъ образомъ тетерева весною приступаютъ къ размножению, даже находясь въ садкъ, при чемъ самцы токуютъ, какъ обыкновению, только поздиъе.

Но если не задаваться нам'вреніемъ держать тетеревовъ на дому, а воснитать ихъ только съ т'ямъ, чтобы подновить тетеревиное населеніе въ изв'ястной м'ястности, тогда передъ наступленіемъ весны ихъ надо просто выпустить въ л'ясъ.

Вирочемъ, вивсто того, чтобы разводить тетеревовъ, привозя изъ другихъ мѣстъ, проще, конечно, принять мѣры къ сохраненію уже имѣющихся. Въ этомъ случаѣ достаточно совсѣмъ прекратить охоту на тетеревовъ въ извѣстномъ районѣ на иѣсколько лѣтъ, преслѣдуя въ то же время возможно энергично хищинковъ, которые могутъ уничтожить тетеревовъ и тетеревятъ, и цѣль будетъ достигнута. Тетерька даетъ хорошій приилодъ, и даже 2—3-лѣтнее воздержаніе отъ охоты должно принести хорошіе результаты.

^{*)} Акклиматизація, 1860 г., вып. IV, стр. 145—153. "18-лѣтніе опыты прирученія и одомашненія тетеревовь-березовиковъ".

Теперь, чтобы закончить эту статью, намъ остается только сказать о промысловомъ значенін тетерева.

Вив всякаго сомивия, съ этой стороны тетеревъ занимаетъ второе м'всто, уступая только рябчику. Вообще можно принять, что тетеревовъ добывается не болъе $\frac{2}{3}$ всего количества рябчиковъ, върнъе же только половина, при чемъ восточная и съверо-восточная Россія съ Сибирью доставляють около 3/4 изъ всего числа тетеревовъ. Дѣтомъ и осенью Москва, Нетербургъ и другіе ментье значительные населенные центры преимущественно средней Россіи потребляютъ тетеревовъ, добытыхъ въ ближайнихъ мъстахъ, при чемъ особенно высоко цѣнятся тетеревята ранняго возраста: за нихъ платится даже дороже чѣмъ за взрослыхъ, которые въ свою очередь идуть оптомъ до 2 руб. за пару. Въ сентябръ, виъстъ съ увеличениемъ количества добываемыхъ тетеревовъ, а можетъ быть въ зависимости отъ обширной осенней торговли другою дичью, цъна на тетеревовъ падаетъ до 1 р. 20 к. за пару, спускаясь еще шиже въ октябръ, когда начинается подвозъ изъ ближайнихъ Владимірской, Нижегородской и Вологодской губ. Въ декабръ начинаютъ прибывать въ Москву транспорты дичи изъ болъе отдаленныхъ мъстъ и цъна на тетеревовъ спускается ниже гр. за пару.

Въ продажѣ тетеревъ цѣнится еще и потому, что его легко сохранять; по прочности его мясо уступаетъ только глухариному, которое однако далеко не пользуется такимъ почетомъ, какъ мясо косача, наиболѣе цѣнимое послѣ фазана и рябчика.

75. Глухарь. Tetrao urogallus, L.

Табл. 79.

И

76. Глухарь бѣлобрюхій. Tetrao urogallus uralensis, Menzb.

Табл. 8о.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. 1, стр. 502 и 510. Болѣе распростр. названія: глухарь, глухой тетеревъ.

Мъстныя названія: а) самца: *мухарь, мухой тетеревъ; моховикъ, моховой тетеревъ, мотишкъ, мошенъ* (на съверъ, между проч. у поморовъ); *мустиви* (мъстами, напр., Осташков. у.); *мухарь* (въ Арханг. губ. и Лапландіи); б) самки: *мухарка, мушица* (мъст. на съверъ и въ Сибири), *копало* (Олонецк.), *кополуха* (Пермск. губ. и больш. ч. Сибири), *пеструха* (Папланд.), мошная тетера (Петербург. губ.).

Польск.: gluszee, gluszee pospotity, gluszee wlásciwy, kniejotek gluszee.— Эст.— metsis, möllus.—Лат.—meddenis, mednis—Фин.—(самець) metso. mehto, (самка) koppelo.—Лапланд. на Пмандрѣ—(самець) lontj, (самка) kuapel.— Въ Муоніониска—(самецъ) tschaftscho, lsuftsa, tschuktscha, (самка) goappel, koappil.

Тат.—паръ. суаръ.—Томек. тат.—ееле. бараб. тат.—еоеръ.—Башк.—
суеръ. суяръ. союръ; самецъ—кора-суэръ, самка—боеъ-суэръ.—Киргиз.—суаръ
кашъ.—Калм.—хурръ, урла.—Бурят.— юрръ. юръ: на среди. Пркутъ—хойеръ.
хоро, также (самецъ) тори-хуаръ, (самка) хара-хуаръ.—Монг.—хорръ.—Зыр.
и пермяц.—дотмаръ; зырян. также (самецъ) чукчи. (самка) кондошмаръ.—
Мордов.—ейиси.—Вотяц.—дукъя. дукуя.—Чуваш.—узапъ, кутюръ.—Вогул.—
шемуль-пьялбу, козма; верхотур. вог.—маншинъ; сосв. вог.—шюмлольмъ.—
Ост. берез.— питилукъ. (самка) хонженъ-луки. на Сургутъ—кончамъ-лунсъ.
изисъ-луюъ.—Па Нарымъ сене, (самка) сунва.—Ост. денг.—дидъ. остяцк. (гдъ?)
кайрышъ. сения. уаръ-сеная.—Юрац.—сенъ.—Тунг. и мъст. якут.—ороки.—
Якут.—кара-уларъ.—На Вилюъ—чакыръ-уларъ.

Если тетеревъ-косачъ характеризуетъ собою такую мѣстность, гдѣ лѣсъ чередуется съ полемъ, какъ это лучше всего выражено въ средней Россіи, глухарь является типичнымъ представителемъ глухого

хвоїнаго лібеа, удаленнаго отъ жилья и мало постацаемаго человіткомъ. На второмъ мівстії, какъ станція въ біологическомъ емыслії, для глухаря стоить смізнанный лібеъ, зашмающій большую нлощадь, и уже на третьемъ—обширный старый лиственный лібеъ.

Безъ сомивнія, это и объясняєть намъ, почему глухарь сравнительно мало извъстенть охотникамъ и хорошо извъстенть промышленникамъ. Охотники заинтересовались глухариной охотой линь за послъднія 20—30 лътъ, и хотя это, съ одной стороны, значительно обогатило наши свъдънія объ образъ жизни описываемой итицы, зато, съ другой, повлекло за собою во многихъ мъстахъ ея быстрое истребленіе.

Какъ предметъ промысла, глухарь значительно уступаетъ не только рябчику и куронаткамъ, по и косачу: дѣло въ томъ, что мясо его, будучи прочнымъ, грубо и далеко не такъ пѣжно, какъ у названныхъ птицъ. Но, несмотря на меньшій спросъ, промышленники очень цѣнятъ глухаря за его величину, и противъ него ими измышлена масса снастей, отчасти употребляемыхъ также на косача и рябчика, отчасти спеціально глухариныхъ. Такимъ образомъ, если принять во вииманіе, что глухаря ловятъ снастями, охотятся на него ради самаго интереса охоты и, наконецъ, сравнительную малочисленность итицы, такъ какъ глухарь численно никакъ не можетъ сравняться съ своими болъе мелкими сородичами, совершенно понятно, что этотъ лѣсной красавецъ долженъ исчезнуть вмѣстѣ съ истребленіемъ силошного глухого лѣса.

Пока область распространенія глухаря очень велика и представляется въ следующемъ виде, если взять вместе типичную (Т. urogallus) и белобрюхую форму (Т. urogallus uralensis).

Съвернымъ предъломъ распространения глухаря служитъ съверная граница высокоствольнаго лъса. Въ Лапландін глухарь и въ горизонтальномъ и въ вертикальномъ распространении связанъ съ сосной. Въ Архангельской губ. онъ не пдетъ такъ далеко къ съверу, и въ Мезенскомъ у. съверная граница глухаря лежитъ около 65° с. ш.; однако, далъе на востокъ эта граница опять поднимается къ съверу, находясь на Печоръ между 66°—67° с. ш., чтобы еще далъе къ востоку, на Уралъ опять спуститься къ 65°. Отсюда во всей области тайги, т.-е. къ югу до 56° , глухарь обыкновененъ, но еще южиће становится спорадичнымъ, за исключеніемъ обширной лѣсной области по истокамъ Волги и Дибпра. Приведемъ болбе подробныя свъдънія о распространенін глухаря въ южной полось его распространенія. Въ Уфимской губ. это еще обыкновенная птица, при чемъ здѣсь встрѣчается и типичная и бълобрюхая формы, чередующияся слъдующимъ образомъ (по свъдъніямъ П. П. Сушкина). Въ Уралъ Златоустовскаго у. и на западъ отъ него живетъ типичный глухарь. Въ Уралъ Стерлитамакскаго у., во всякомъ случать начиная съ широты Стерлитамака и южнѣе, за предѣлы Уфимской губ., а также въ лѣсахъ, окаймляющихъ эту часть Урала, живетъ бълобрюхій глухарь. Идя далѣе на с.-з. по окраинъ лъсной области Уфимской губ., т.-е. приблизительно слъдуя теченію р. Бѣлой, встрѣчаемъ бѣлобрюхаго глухаря въ окрестностяхъ

Уфы, гдв настолько же многочисленны или даже преобладають особи переходнаго характера. Далъе на западъ, въ Бирскомъ и Мензелинскомъ увадахъ, живетъ типичный глухарь и переходные отъ него къ бѣлобрюхому. А. Н. Карамзинъ говоритъ, что и въ Белебеевскомъ у. и прилегающихъ частяхъ Самарской губ, преобладающею является бълобрюхая форма. Въ Белебеевскомъ у, глухарь водится въ сосновыхъ лъсахъ по выходамъ пермскаго известняка, въ Бугульминскомъ утадь въ борахъ и чернольсьт близъ Сулы, Глазова и въ верховьяхъ р. Кондурги, откуда переходить въ лъса съверо-западнаго угла Бугурусланскаго у. Наконецъ, совершенно особиякомъ отъ этихъ лѣсныхъ площадей и вывств съ твыть напболве далеко къ югу въ Самарской губ, стоить нахождение глухаря въ Бузулукскомъ бору. Н. А. Зарудный говорить, что бълоброхій глухарь въ большомъ числів гивадится въ борахъ и частью лиственныхъ лъсахъ на съверномъ склонть Общаго Сырта, близъ верхияго теченія Самары, и очень обыкновененъ въ лъсахъ Оренбургской Башкиріи. Вдоль лъваго берега Волги М. Н. Богдановъ проследилъ глухаря по сосновымъ борамъ до Царева кургана—холма около р. Сока. На правомъ берегу Волги глухарь обыкновененъ въ лѣсахъ Самарской луки. Отсюда его южная граница идетъ черезъ Сызранскій у. Симбирской губ., Кузнецкій и Петровскій Саратовской, Кирсановскій и Тамбовскій Тамбовской губ., проходить немного съверные Тулы черезъ Одоевскій у., затымъ переходить въ Калужскую губ, и черезъ Козельскій и Жиздринскій уу. последней направляется въ Брянскій и Трубчевскій уу. Орловской губернін. Қъ югу отъ этой границы спорадичное распространеніе глухаря можетъ быть указано для Хвалынскаго и Вольскаго уу., Саратовской губ., но упоминаемое Богдановымъ распространение этой птицы по рр. Сердобъ и Хопру до села Надовъ, Балашовскаго у., не нодтверждается: въ описанін Падовъ, по країней мъръ, глухарь совершенно не упомянутъ. Въ Симбирской, Саратовской и Пензенской губ, живетъ форма переходная къ бълобрюхому глухарю, еще болве темн'вющая въ Тамбовской губ. Въ Қазанской, Нижегородской, Рязанской и отсюда на западъ-типичная, спорадично распространенная и въ Тамбовской губ. Нътъ никакого сомивнія, что теперь глухарей нътъ ни въ Воронежской, ин въ Харьковской губ., но изтъ сомивнія и въ томъ, что прежде они здъсь водились. По крайней мъръ для Харьковской губ. они упоминаются въ ея описаніяхъ, сдъланныхъ въ семидесятыхъ годахъ XVII столфтія.

На западъ отъ Орловской губ. южная граница распространенія глухаря сначала идетъ въ юго-западномъ направленіи, отрѣзывая сѣверныя части Черниговской и Кіевской губ., а затѣмъ на западъ черезъ Волынскую губ., гдѣ глухаря уже нѣтъ въ южныхъ уѣздахъ, папр., въ Староконстантиновскомъ. Въ Польшѣ глухарь рѣдокъ и спорадиченъ. Въ Ковенской губ. почти перевелся, но въ другихъ западныхъ мѣстами еще многочисленъ. Въ прибалтійскихъ губ. довольно многочисленъ еще въ разныхъ мѣстахъ Курляндіи и Лифляндіи.

У южной границы своего распространенія глухарь быстро сокращается въ числѣ въ губ. Орловской и въ южной части губ. Рязанской. Въ послѣдней мѣстности окончательному истребленію штицы предшествовало любонытное измѣненіе ея привычекъ: переселеніе въ старые березовые лѣса, о чемъ шиже.

Вив Европ. Россій глухарь распространенть въ лъсной области Сибири до 67° с. ш. къ етверу и до Забайкалья къ юго-востоку. Гдъ лежитъ его восточная граница на пространствъ между Еписеемъ и Леной, къ сожальнію, не выяснено. Кромъ того, глухарь распространенть въ Алтайскихъ и Саянскихъ горахъ и въ Семиръченскомъ крать. Въ Алтат и Саянскихъ горахъ обыкновенный глухарь сталкивается съ такъ называемымъ длиннохвостымъ (Т. urogalloides), который замъняетъ его въ восточной Сибири (за исключенемъ Камчатки), въ Амурскомъ крат, на Сахалинт и въ съверныхъ частяхъ Китайской имперіи. Въ Камчаткт живетъ особая форма каменнаго глухаря (Т. kamtschaticus).

На западъ отъ Европ. Россін глухарь водится въ горахъ центральной, западной и даже отчасти южной Европы. Въ нашихъ горахъ, напр., на Уралъ, глухарь положительно предночитаетъ влажныя долины горнымъ склонамъ, по, конечно, въ зависимости отъ разныхъ мѣстныхъ условій привычки птицы мѣняются, и являясь на протяженіи большей части занятой имъ области итицею инзменности, онъ мѣстами вполнѣ заслуживаетъ названіе горнаго обитателя.

Глухарь—птица осъдлая, не предпринимающая даже такихъ кочевокъ, какъ тетеревъ-косачъ. Еще въ концъ зимы, уже въ февралъ, перебираются глухари изъ своихъ зимнихъ мъстообитаній къ будущему мъсту тока, и въ приготовленіяхъ къ токованію и въ самомъ токованіи для пихъ проходитъ вся весна, по май мъсяцъ. Затъмъ съ мая по сентябрь протекаетъ одиночная жизнь самцовъ и семейная жизнь самокъ съ выводками, а въ сентябръ начинается осенній и зимній періодъ. Особенный интересъ для охотника представляетъ весна, съ ея характерной охотой за токующимъ глухаремъ съ подхода, наименъе интересна зима. Лътняя охота за глухарятами мало своеобразна и потому естественно, что въ дальнъйшемъ описаніи намъ придется обратить особое вниманіе на весенній періодъ въ жизни глухаря. Къ глухарю болье чъмъ къ другой птицъ относится, что успъхъ охоты обусловливается лишь основательнымъ изученіемъ всъхъ ея повадокъ и привычекъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Весенній образъ жизни и весенняя охота.

Ī.

Переселенія къ токамъ. — Постоянство токовъ. — Площадь токовища. — Кормъ и мѣста кормежки. — Собственно токованіе или игра глухаря. — Голосъ глухаря. — Драки токовиковъ. — Продолжительность періода токованія. — Начало и конецъ утренняго токованія. — Вліяніе погоды. — Вечерній токъ. — Образъ жизни глухарокъ. — Глухарь въ чернолѣсьи.

Весенній періодъ въ жизни глухарей начинается съ того же, съ чего пачинается и у косачей: съ приближенія зимнихъ стай къ токовищамъ, "Еще бълая пелена сиъга лежитъ во всей своей неприкосновенной цівлости, різжо отдівляясь отъ темнозеленой хвои краснолівсья, пишетъ Л. П. Сабанвевъ, — а стайки глухарей выбираются изъ чащи ельниковъ, гдъ онъ держались въ теченіе глухой зимы, и приближаются къ обычному мъсту тока. Въ ясный февральскій день, на окраппахъ моховыхъ болотъ, у лѣсныхъ покосовъ уже можно наблюдать этихъ огромныхъ птицъ, тамъ и сямъ чернѣющихъ на вершинахъ высокихъ елей и сосенъ, — върный знакъ ихъ скораго вылета на ближніе тока". Проходить еще нѣсколько дней, солнце грѣетъ все сильнъе и сильнъе, и оживая подъ его лучами, глухари начинаютъ вылетать на свое старое токовище. Сначала держатся также исключительно на деревьяхъ, а потомъ спускаются на сибгъ и ходятъ, чертя крыльями по насту. Первые дни они совсемъ не подаютъ голоса, потомъ начинаютъ слабо текать и все ръже и ръже слетаютъ на землю.

Если лъсъ, гдъ зимою держались глухари, не великъ, это переселеніе къ токовищу происходить совершенно незамѣтно и легко можеть быть принято за обычную зимнюю кочевку птицъ. Но при большой л'ясной площади постоянство, съ которымъ глухари держатся въ одномъ мѣстѣ, не можетъ не броситься въ глаза. Впрочемъ, глухариные тока чрезвычайно постоянны, гораздо постоянные даже тетеревиныхъ, и потому наблюдательному человъку хорошо извъстны сами по себъ. Излые десятки лътъ токуютъ глухари на одномъ и томъ же токовинф, и только вырубка лфса и лфсиые пожары заставляютъ ихъ перемъщть излюбленное мъсто. Преслъдованія охотника и промышленника въ этомъ отношении не им'єють больного значенія, особенно если поблизости изтъ другихъ токовищъ. Но въ томъ случав, когда на одномъ токовищъ глухарей очень преслъдуютъ (особенно неум'ялые охотинки, которые не столько бьютъ, сколько путаютъ птицу), и въ изсколькихъ верстахъ отсюда есть другое, совсъмъ нетревожимое, глухари обыкновенно кончають тъмъ, что одинъ за одинмъ перебираются на послъднее.

Мѣсто глухаринаго тока совсѣмъ не похоже на токовище косачей. Чаще всего это окрапны мохового болота, поросшаго рѣдкими,

искривленными сосенками и окруженнаго глухимъ старымъ лъсомъ, на свверв исключительно еловымъ. Тамъ и сямъ среди болве мелкихъ деревьевъ должны находиться высокія сосны и ели, на которыхъ чаще всего токуетъ глухарь, или же болье высокія деревья подымаются среди обширной мшары, зароешей верескомъ, багульникомъ и низкорослыми сосенками, отдъльными купами, точно островками. Кром'в того, глухари токують въ борахъ, въ болотистыхъ доготинахъ, по склонамъ небольшихъ уваловъ, обращенныхъ на югъ и востокъ, и даже въ болъе инфокихъ долинахъ лъсныхъ ръчекъ. Однако, послъднія м'яста токовъ не характерны для глухаря и бол'я связаны съ гористымъ характеромъ мъстности, т.-е. объясняются спеціальными особенностями страны. Кром'в того, съ одной стороны, у насъ на Урал'в, съ другой, —въ горныхъ странахъ западной Европы, глухари и всколько перем'вщаются даже въ течение одного періода токованія: начинаютъ токовать сравнительно высоко, на склонахъ, а потомъ спускаются все ниже и ниже, до самыхъ логовъ.

Площадь токовища колеблется въ размѣрахъ очень сильно: тамъ, гдѣ глухарей собирается много, до 30 и даже до 50 штукъ, она занимаетъ нѣсколько квадратныхъ верстъ, не менѣе двухъ; среднее токовище, гдѣ токуютъ штукъ 8— 10, занимаетъ квадратную полуверсту или $^3/_4$ версты; наконецъ, маленькіе тока въ 3—5 штукъ занимаютъ всего четверть квадратной версты. Такая общирная площадь токовища и столь большое колебаніе его размѣровъ объясняется прежде всего тѣмъ, что разстояніе между токующими глухарями бываетъ большею частію отъ 100 до 250 шаговъ; лишь въ видѣ исключенія глухари токуютъ въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ другъ отъ друга, и наперечетъ тѣ случаи, когда видѣли двухъ токующихъ глухарей на одномъ деревѣ.

Такъ какъ глухарь держится отчасти на токовищѣ и во всякомъ случать около него въ теченіе всего весенняго періода, само собою разумвется, что въ выборв мвста тока руководится не исключительно присутствіемъ деревьевъ, на которыхъ онъ токуетъ, а соображается такъ же съ условіями безопасности и добыванія корма. Поэтому рѣдко гдъ удается встрътить глухариные тока на разстояни около пяти верстъ отъ города, да и то развъ въ захолустьъ, съ ръдкимъ разбросаннымъ населеніемъ; обыкновенно же надо ѣхать за нѣсколько десятковъ верстъ отъ большого центра, а чтобы найти большой токъ, такъ и того дальше. Затѣмъ, кромѣ мохового болота, поросшаго клюквой, глухарь выбираетъ близость осинниковъ или олешняковъ и брусничниковъ, т.-е. такія мѣста, гдѣ эти птицы находять себѣ обильный кормъ весною. Въ началъ весны пища глухарей далеко не разнообразна: пока снъгъ не стаялъ, имъ нечего взять кромъ хвои, преимущественно еловой, да самыхъ вершинокъ молодыхъ сосенокъ и елочекъ, и потому въ это время зобъ описываемыхъ птицъ набитъ только иглами. Кромѣ того, надо зам'єтить, что глухари предпочитають хвою, тронутую пожаромъ, потому будто бы, какъ говорятъ промышленники, что она "слаще". Но

ноздиће, когда сићгъ растаетъ, глухари на цѣлые дни переселяются изъ ельниковъ въ болота, гдѣ кормятся уцѣлѣвшими старыми ягодами клюквы и брусники, которыя очень любятъ, а въ разгаръ весны пища ихъ становится еще богаче и разнообразиће: начинаетъ цвѣсти осина, ольха, ива, пробивается зеленая травка, и потому-то какъ глухари, такъ и глухарки на цѣлые дни забираются въ осиникъ, тальникъ у болотъ и по берегамъ рѣкъ, въ олешиякъ и т. п. Вмѣстѣ съ тѣмъ, само собою нонятно, что такія мѣста до крайности трудно доступны, такъ какъ иногда вода на цѣлые поларшина покрываетъ моховое болото, служащее токомъ для глухарей.

Характерною особенностью глухаря служить то, что онъ токуетъ на деревьяхъ, а не на землъ. Изъ этого, конечно, не слъдуетъ заключать, что онъ совсѣмъ не спускается на землю: слетаютъ на токъ н бѣгаютъ по землѣ глухари нерѣдко, но токуютъ на землѣ они очень рѣдко и, повидимому, только въ самый разгаръ тока, при чемъ начинаютъ токовать все-таки на деревъ. Весьма укоренившееся митие. что глухарь токуетъ только на хвоїныхъ деревьяхъ, должно считаться ошибочнымъ. Будучи распространенъ преимущественно въ области краснольсья, глухарь, конечно, во многихъ мъстахъ не можетъ токовать ни на какомъ другомъ деревъ, кромъ хвойнаго, прямо за отсутствіемъ лиственныхъ. Такъ, въ Вышневолоцкомъ и Валдайскомъ уу., по словамъ г. Дмитріева, глухарь токуетъ только на хвойныхъ деревьяхъ, потому что другихъ на токахъ здѣсь нѣтъ. Въ Богородскомъ же у., гдѣ кромѣ сосенъ и елей на токахъ растутъ березы и осины, по словамъ того же наблюдателя, вовсе не ръдкость стрълять токующихъ глухарей на деревьяхъ двухъ послъднихъ породъ. Однако, внъ всякаго сомнъпія, сосна съ ея горизонтальными и толстыми сучьями представляетъ наибольшія удобства для обычныхъ эволюцій токующаго глухаря и потому, конечно, избирается предпочтительно передъ другими деревьями.

Очень высокихъ деревьевъ глухарь избъгаетъ, можетъ быть потому, что таковыя обыкновенно растутъ среди другихъ и не такъ вътвисты, глухарю же для токованія нужно дерево вътвистое, слѣдовательно, не стъсненное другими. Выбравъ себъ подходящее дерево, глухарь сначала гокуетъ на высотъ двухъ третей его и ближе къ стволу, затъмъ постепенно спускается ниже, къ половинъ высоты дерева, наконецъ, играетъ уже на самыхъ нижнихъ сукахъ, всего въ нѣсколькихъ аршинахъ отъ земли, и на довольно большомъ разстояніи отъ ствола. Однако, иногда глухарь токуетъ даже на чахлой сосенкъ, и потому никакъ нельзя утверждать, что лишь деревья извъстной величины и породы служатъ для его товованья.

Темъ не менъе, нъкоторые охотники идутъ еще далъе и даже утверждаютъ, что на ръдкомъ токовищъ нътъ такого дерева, на которомъ изъ году въ годъ не удавалось убивать нъсколькихъ старыхъ глухарей, которые одинъ за другимъ запимали мъсто своихъ товарищей и подвергались ихъ участи. "Промышленники разсказываютъ

даже,—пишетъ Л. П. Сабанфевъ,— что перфдко на току бываетъ настолько облюбованная глухарями ель или сосна, что можно быть увфреннымъ, что каждое утро, на той же самой толстой вфтви, увидишь новаго глухаря".

Г. Ушковъ также говоритъ, что глухарь, прилетая на токъ, всегда садится на свое "завътное" дерево. Такъ какъ оба названные наблюдателя говорять объ одной и той же мъстности (Пермской губ.). можетъ быть въ приложении къ ней это и върно, тъмъ болъе, что отрывочныя однородныя показанія можно найти и у другихъ авторовъ; но что касается Тверской, Новгородской и Московской губ., то г. Дмитріевъ пишетъ объ этомъ следующее: "глухари играютъ по всему току, гдв придется, и по разнымъ деревьямъ; сегодня, напримъръ, на одномъ деревъ, завтра на другомъ, - смотря по мъсту, на большихъ и среднихъ деревьяхъ, и даже изрѣдка случается видѣть на самыхъ маленькихъ, хилыхъ сосенкахъ; но такихъ любимыхъ деревьевъ, на которыхъ каждое утро можно бы услышать глухаря, -нътъ. Охотясь постоянно за глухарями и посъщая нъкоторые тока нзъ году въ годъ, я хорошо знаю мъстность этихъ токовъ и долженъ сказать, что до сихъ поръ ничего подобнаго не замъчалъ. Часто случалось бить старыхъ глухарей и на высокихъ и на низкихъ деревьяхъ, но такихъ "центральныхъ" деревьевъ, на которыхъ садятся всегда старые глухари, ни на одномъ току не замѣчалъ. Спрашивалъ объ этомъ и промышленниковъ, съ которыми приходилось охотиться, но и тъ ничего подобнаго не замъчали. Точно такъ же во все время моей охоты за глухарями ни на одномъ току не было такого дерева, на которомъ каждое утро можно было бы увидъть глухаря. Я перебывалъ на многихъ токахъ; знаю мфстность большинства изъ нихъ и никогда ни на одномъ току не убивалъ на одномъ деревѣ не только по нѣскольку глухарей въ одну весну, но даже и по два глухаря въ разное время. Чтобы еще болъе убъдиться въ этомъ, на нъкоторыхъ токахъ, я нарочно старался запоминать деревья, на которыхъ убивалъ, и въ слѣдующій разъ шелъ прямо къ нимъ, но никогда не замѣчалъ на нихъ новыхъ глухарей. Я полагаю, если бы въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдъ я охотился, были такія деревья, то, безъ сомнънія, промышленники знали бы о нихъ и мнъ бы сказали навърное, такъ какъ я плачу имъ всегда хорошо; но, сколько я ни спрашивалъ ихъ объ этомъ, всѣ отвъчали, что ничего подобнаго не замъчали".

Г. Разевигъ, такъ же хорошо знакомый съ глухариною охотой, и притомъ наблюдавшій и внимательно изучавшій образъ жизни глухарей, какъ у насъ въ разныхъ губерніяхъ (Пермская, Тверская, Рязанская и др.), такъ и за границей, въ свою очередь ничего не говоритъ объ этихъ излюбленныхъ глухарями деревьяхъ. Напротивъ, онъ даже говоритъ, что въ выборѣ дерева для токованія, глухарь обращаетъ вниманіе на первомъ мѣстѣ на расположеніе сучьевъ дерева, на второмъ — на его высоту. "Въ этомъ отношеніи, — глухарь крайне непостояненъ, —пишетъ г. Разевигъ, и мнѣ приходилось стрѣ-

лять его съ такихъ строевыхъ сосенъ, съ такой высоты, что глухарь, сидъвний въ двухъ третяхъ дерева, на брезжущей зарѣ, казался не болѣе ворона; наоборотъ, и съ чахлыхъ хилыхъ сосенокъ, въ сажень вышины, съ которыхъ глухаря легко бы было столкнуть ружьемъ; гдѣ не видавъ самъ, никогда бы и не повѣрилъ, что на нее глухарь вообще сядетъ, а не только что будетъ токовать. На такую сосенку онъ садится въ самую вершину и сидитъ въ ней, какъ въ гнѣздѣ; токуя, только поворачивается кругомъ, какъ на стержнѣ, какъ флюгарка".

Въ средней Россіи въ послъднихъ числахъ февраля или въ первыхъ марта, на съверъ двумя недълями позднъе, раздается первое "щелканье" или "теканье" старыхъ глухарей - токовиковъ, какъ бы робко заявляющихъ этими еще негромкими отрывистыми звуками о наступленіи весны. День ото дня это щелканье раздается громче и чаще (особенно въ теплыя, пасмурныя утра), въ то же время брови самновъ надуваются и краснъютъ, и, наконецъ, отдъльные звуки сливаются въ общую своеобразную трель, оканчивающуюся такъ назыв. "скирканьемъ"; токовикъ затоковалъ или заигралъ,— какъ говорятъ охотники,—а за нимъ начинаютъ играть и болъе молодые самцы. Въ половинъ или двадцатыхъ числахъ марта начинается настоящій токъ, а вмѣстъ съ тъмъ и крайне оригинальная весенняя охота за глухарями.

Жизнь глухарей даже и въ періодъ токованія идетъ довольно правильно. Днемъ эти птицы кормятся поблизости тока, или на болоть, или вължеу, а съприближениемъ вечера, точнъе, передъ закатомъ солнца, летятъ на тока, однако, не всф: нъкоторые, большею частію молодые или юные, прилетаютъ сюда лишь рано утромъ, еще до разевъта или на разевътъ. Такъ какъ глухари возвращаются съ мѣстъ своихъ кормежекъ къ току всегда по прямой, этимъ вечернимъ перелетомъ ихъ можно съ удобствомъ пользоваться для опредъленія въ незнакомой мъстности мъста тока. Прилетъвъ сюда, глухарь почти всегда садится на дерево, въ половину его высоты, и только въ очень ръдкихъ случаяхъ на землю. На дерево опускается съ большимъ шумомъ, такъ наз. "лопотаньемъ", которое въ тихую погоду можно слышать за полверсты, садится почти подлѣ самого ствола на толстый гладкій сукъ и буквально зампраетъ въ одномъ положеніи, внимательно присматриваясь и прислушиваясь ко всему подозрительному. Въ это время очень легко спугнуть глухаря, хотя промышленники и увфряютъ, что спугнутый вечеромъ глухарь утромъ возвращается на токъ снова. Если все спокойно, глухарь дізлаетъ шеей особыя движенія, какъ бы отрыгиваетъ что-пибудь, и при этомъ издаетъ своеобразные звуки, которые у охотниковъ извъстны подъ назвашемъ "хрюканья". Г. Кирфевскій сравниваетъ ихъ съ хрюканьемъ разсерженнаго барсука, по мизнію г. Дмитріева, они скоръе напоминаютъ хрюканье поросенка. Во всякомъ случать эти звуки трудно поддаются опредъленію, такъ какъ, несмотря на кажущуюся простоту, довольно сложны. Что выражаютъ собой эти звуки, такъ же трудно сказать, такъ какъ едва ли можно думать, что ими глухари перекликаются другъ съ другомъ, — это не въ обычат токующей итицы. Какъ бы то ни было, нохрюкавъ, глухаръ успоканвается до разсвтта, если только не токуетъ вечеромъ, о чемъ будетъ говорено ниже.

Переночевавъ на деревѣ, глухарь утромъ, еще до свѣта, начинаетъ токоватъ; сначала тихо, робко, какъ бы нехотя, потомъ, по мѣрѣ приближенія разсвѣта, все зарче и зарче. Первымъ всегда начинаетъ самый старый и сильный самецъ, а за нимъ и всѣ остальные члены тока. Находяся на одномъ изъ толстыхъ, гладкихъ суковъ, на высотѣ въ полдерева, токующій глухарь развертываетъ хвостъ вѣеромъ, немного приподнявъ его кверху, распускаетъ крылья такъ, что они царапаютъ своими концами по суку, далеко вытягиваетъ впередъ въ горизонтальномъ направленіи шею, поднимаетъ голову нѣсколько кверху, распушаетъ всѣ перья и начинаетъ свою любовную пѣсию. Сначала пѣсня состоитъ изъ рѣдкаго теканья, затѣмъ теканье становится все чаще и чаще, и, наконецъ, переходитъ въ глухое шипѣнье, къ которому присоединяется особое стрекотанье, вродѣ стрекотанья сороки.

Окончивъ пѣсню, глухарь останавливается и прислушивается, не отзывается ли гдѣ глухарка; затѣмъ опять, но уже громче и энергичиѣе, заводитъ ту же пѣсню. Первая часть пѣсни называется у охотниковъ, какъ уже сказано, теканьемъ или щелканьемъ, вторая — скирканьемъ, стрекотаньемъ и щебетаньемъ. Начиная пѣсню, глухарь тихо передвигается по суку, затѣмъ передъ скирканьемъ обыкновенно останавливается, окончивъ же пѣсню, бокомъ возвращается на прежнее мѣсто.

Однако, надо им'ять въ виду, что теканье прямо переходитъ въ скирканье только въ разгаръ тока, обыкновенно же между тѣмъ и другимъ существуетъ промежутокъ, когда глухарь, остановившись, чутко прислушивается. Въ началѣ токового періода скирканья даже совсѣмъ не бываетъ, и глухарь ограничивается какъ бы прелюдіей пъсни.

Хотя передать скирканье и теканье звукоподражательно очень трудно, однако, можно сказать, что глухарь начинаетъ свое пъніе, повторяя разъ 10-15 подобіе слоговъ теке! теке! Повторяясь съ постепеннымъ учащеніемъ, эти звуки сливаются, наконецъ, въ глухую трель, которая оканчивается щелканьемъ, и уже затѣмъ, съ промежуткомъ или безъ него, все заканчивается скирканьемъ. Тогда какъ первая часть или прелюдія п'єсни длится минуту—дв'є, скирканье беретъ секунды 3—4. Пока глухарь текаетъ, онъ отлично слышитъ и видитъ, когда же скиркаетъ — не обращаетъ никакого вниманія на происходящее кругомъ. Нъкоторые думаютъ, что во время скирканья глухарь дъйствительно ничего не видитъ и не слышитъ, такъ какъ закатываетъ глаза и, открывая ротъ, закрываетъ вслъдствіе этого отросткомъ нижней челюсти входъ въ слуховой проходъ. Но и то и другое, какъ показали наблюденія надъ глухаремъ въ неволѣ (Бремъ), совершенно невърно: глухарь и видитъ, и слышитъ, но находясь въ высшей степени возбужденія, не обращаетъ вниманія на окружающее, будучи занятъ совершенно другимъ.

По наблюденіямъ Ф. Қ. Лоренца, шея глухаря въ періодъ тока раздувается отъ прилива крови до того, что перья не покрываютъ болье голыхъ мьстъ кожи, и послъднія выступаютъ тамъ и сямъ. языкъ же птицы, убитой во время токованія, оказывается втянутымъ такъ глубоко въ глотку, что его совсемъ не видно во рту. Не этимъ ли обстоятельствомъ объясняется то, что голосъ глухаря далеко не такъ громокъ, какъ этого надо бы ожидать, судя по величинъ птицы? Въ тихое утро и по насту скирканье глухаря можно слышать шаговъ за 225-250, не далъе; щелканье же гораздо глуше и потому слышно всего шаговъ за 150-200. Въ пасмурное утро и когда сойдетъ сибгъ пънія глухаря нельзя услышать даже на такомъ разстояніи. Если же в'втрено, и притомъ темно, чрезвычайно трудно опред'ьлить не только разстояніе, на которомъ слышится п'ясня глухаря, но и направленіе звуковъ. Къ тому же даже на опытнаго охотника дъйствуетъ несоотвътствіе между величиной птицы и силой ея голоса: слыша слабое скирканье, все думаешь, что глухарь далеко и кончаешь тъмъ, что даже проходишь мимо того дерева, на которомъ сидитъ глухарь.

Прибавимъ еще, что, по словамъ Ф. К. Лоренца же, глухарь иногда токуетъ, находясь въ совершенно обыкновенномъ положении.

Такъ какъ весенняя охота за глухарями основана на томъ, чтобы подойти къ птицъ, пользуясь секундами, когда она скиркаетъ и не обращаетъ никакого вниманія на то, что дълается кругомъ, знаніе разныхъ оттънковъ глухариной иъсни безусловно необходимо для охотника. Продолжительный навыкъ и внимание позволяютъ охотнику безошибочно опредѣлить, когда щелканье замъщтся скирканьемъ, и нъкоторые виртуозы этого дъла начинаютъ подходить съ послъднимъ щелканьемъ, совершенно върно разсуждая, что звукъ шаговъ дойдетъ до птицы тогда, когда она уже начнетъ скиркать. Точно такъ же очень важно знать, старый или молодой глухарь играетъ, потому что молодые никогда не входятъ въ такой азартъ, какъ старые, и ихъ легче испугать. Въ этомъ случать опять-таки пужна практика, такъ какъ больного различія между голосомъ стараго и молодого глухаря нѣтъ, хотя можно сказать, что молодой имжеть не такой хриплый голосъ, какъ старый. Къ тому же и манера играть у молодого глухаря нѣсколько другая.

Токующії глухарь, какъ сказано, обыкновенно во время токованья спускается постепенно на ниже лежащія вѣтви. Но иногда, что, повидимому, бываетъ при затянувшемся утрениемъ токѣ, его, напротивъ, можно видѣть на сучкѣ лежащемъ выше, чѣмъ въ полдерева. Какъ въ промежуткахъ между игрою, такъ и въ промежуткѣ между щелканьемъ и скирканьемъ, токовикъ внимательно прислушивается, не раздается ли клохтанье глухарки, прилетѣвшей на токовище, и въ такомъ случаѣ слетаетъ на землю и подходитъ къ ней. Если же онъ заслышитъ ея голосъ на болѣе далекомъ разстояніи, тогда онъ съ теканьемъ летитъ къ ней. Въ разгаръ тока глухари слетаютъ на

землю даже безъ самокъ, просто для пгры или токованья, но обыкновенно ихъ приманиваетъ сюда самка. Если случайно два или болъе самцовъ бросятся къ одной самкъ, между ними сейчасъ же возгарается драка. Глухари дерутся съ большимъ азартомъ, то наскакивая другъ на друга, чтобы ударитъ ногами, то схватясь за шен, и при этомъ сильно гремятъ крыльями. Существуетъ не одинъ разсказъ, что такихъ пичего не видящихъ и не слынащихъ въ пылу битвы бойцовъ ловили руками, по для этого необходимо, чтобы они были равносильны; въ противномъ случатъ слабтйний обращается въ бъгство, а побъдитель перъдко празднуетъ свою побъду тъмъ, что, взлетьвъ на сукъ, тутъ же начинаетъ пграть. Самка отпосится совершенно безучастно къ драктъ самцовъ и обыкновенно отдается побъдителю, если только ей не надоъстъ выжидательное положение и она не уйдетъ съ случайно подвернувшимся свободнымъ глухаремъ.

Чтобы составить себѣ болѣе вѣрное представленіе о токѣ, надо помнить, что сначала глухари играютъ, дѣлая довольно продолжительные перерывы между отдѣльными пѣснями, въ $^{1}/_{4}$ часа и болѣе. Но потомъ пѣсня слѣдуетъ за пѣсней все чаще и чаще, сосѣдніе токовики, какъ бы подзадоривая другъ друга, не ждутъ пока кончитъ свою игру тотъ или другой сосѣдъ, и потому въ извѣстное время на току одновременно слышится нѣсколько глухарей.

Энергія токованія изм'єняется и въ разное время періода тока и въ разное время дня. Въ средней Россіи тока глухарей обыкновенно начинаются въ первыхъ числахъ марта, при ранней и дружной веснъ даже въ концъ февраля, и обыкновенно оканчиваются около 9-го мая и при поздней веснъ затягиваются даже до 20-го числа этого мъсяца. Первую недълю токованіе пдетъ слабо, п даже до Благовъщенія глухари поютъ такъ вяло, что подходъ къ нимъ печти невозможенъ. Разгаръ токовъ бываетъ въ апрълъ, съ начала этого мъсяца и числа до 23-25-го, что совпадаетъ съ вылетомъ на токъ глухарокъ. Всего разгаръ тока длится три-четыре недѣли, а затѣмъ тока начинаютъ ослабъвать, ръдъть и при нормальной веснъ къ 10-му мая, при поздней къ 20-му, прекращаются совсѣмъ *). Слъдовательно всего токъ длится 8—9 недъль, наиболъе горячо токуютъ глухари въ теченіе 3—4 недъль, и именно столько же длится охота за глухарями съ подхода ***). Сначала, когда сиъга много, подходъ очень труденъ, такъ какъ въ промежуткахъ между пѣснями и во время щелканья охотникъ отнюдь не долженъ шевелиться, а буквально долженъ замереть

^{*)} Промышленники считаютъ, что глухарь кончаетъ играть какъ только похватаетъ свъжаго листа на березъ. Ъда березоваго листа, конечно, не при чемъ, но върно то, что игра глухарей кончается, когда березы совершенно распустятся и ихъ листики станутъ величиною съ копейку.

^{**)} Если весна наступаетъ поздно, но дружно, т.-е. сразу станетъ тепло, быстро сойдетъ снъгъ и скоро зазеленъетъ травка, самки начинаютъ прилетать на токъ вскоръ послъ его начала, рано садятся на гнъзда и этимъ опредъляютъ быстрое окончаніе тока. Въ такомъ случаъ весь періодъ токованія можетъ сократиться до 4-хъ недъль.

въ той позъ или въ томъ положени, въ какомъ оказался при конъц скирканья. При концъ тока, когда снъгъ уже сошелъ, подходъ труденъ или легокъ, смотря потому, какова почва токовища, т.-е. насколько она мокра, покрыта валежникомъ и т. п.

Ежедневная продолжительность тока измѣняется очень сильно въ зависимости отъ времени и погоды. Въ половинѣ марта они начинаются около половины нятаго утра, по при сильномъ утренникѣ (въ 6—8°) запаздываютъ на полчаса и даже часъ, т.-е. начинаются всего за четверть часа до восхода солнца. Въ концѣ марта токъ начинается около 4-хъ часовъ, по если сильно морозитъ, опять-таки позднѣе получасомъ или даже часомъ. Вообще можно сказать, что при сильныхъ утренникахъ самый разгаръ тока паблюдается когда взойдетъ солнце. Чѣмъ раньше свѣтаетъ, тѣмъ раньше и начинается уже около половинъ апрѣля, въ теплое утро, токъ начинается уже около половины третьяго, въ концѣ апрѣля ранѣе двухъ, въ начатѣ мая въ часъ. На сѣверѣ токъ начинается ежедневно, повидимому, нѣсколько ранѣе, чѣмъ въ средней Россіи, для которой приведены сейчасъ перечисленныя цифровыя данныя.

Что касается времени окончанія токовъ, а слідовательно и ихъ продолжительности, то это также весьма различно въ разное время. Въ половиніъ марта токованіе длится всего около получаса, въ конців этого міжна пітьсколько меніве часа, въ началів апріжля съ часъ, въ половинів апріжля отъ $\mathbf{1}^{1}/\mathbf{2}$ до 2 часовъ,—паиболіве долгое время. Съ конца апріжля продолжительность тока уменьшается и къ Николину дню, т.-е. къ 9-му маю, не продолжается боліве $\mathbf{3}/\mathbf{4}$ часа.

Въ туманное, пасмурное утро глухари и начинаютъ и кончаютъ играть поздиђе, чъмъ въ ясное.

Такимъ образомъ, въ средней Россіи нормально тока начинаются въ мартѣ за часъ, въ апрѣлѣ за два и въ маѣ за 2½ часа до восхода солнца. Но, повидимому, въ разныхъ частяхъ Россіи это время измѣняется. Такъ, если для средней Россіи можно принять, что глухариный и тетеревиный тока начинаются одновременно, для восточной, судя по наблюденіямъ Сабанѣева на Уралѣ, дѣло обстоитъ иначе тамъ глухари начинаютъ токовать раньше косачей, такъ какъ въ мартѣ первое щелканье слышно уже около четвертаго часа, въ серединѣ апрѣля въ третьемъ часу, и только въ началѣ мая около часа, какъ и въ средней Россіи. Равнымъ образомъ и продолжительность тока затягивается тамъ невѣроятно; по крайней мѣрѣ такой отличный наблюдатель, какъ г. Ушковъ, говоритъ про Екатеринбургскій уѣздъ, что тамъ въ хорошую погоду и въ разгаръ токованія токъ продолжается иногда и до полудия. Я, однако, думаю, что это совершенно исключительные случаи, вызванные какими-нибудь ненормальными условіями.

Погода оказываеть на глухариный токъ такое же огромное вліяніе, какъ и на тягу вальдшненовъ. Въ этомъ отношенін у насъ имъются очень цѣнныя наблюденія Сабанѣева и Дмитріева, которыхъ мы и будемъ придерживаться въ нашемъ изложеніи.

Непродолжительное непастье, какъ, напр., тихій дождь, пошедшій съ вечера при теплой погоді и остановившійся утромъ, а также мокрый сивть или небольной ввтерь, при твхъ же условіяхь, можно сказать, не оказывають никакого вліянія на токъ. Легкіе утренники, которые такъ часты въ апрълъ, тоже не только не ухудивютъ, но даже пожалуй улучшають токъ, такъ какъ въ такія утра глухари играють зарче, чемъ въ теплыя. Даже спльные утрешники, какъ мы вияти, только отодвигаютъ нъсколько пачало тока, нисколько не вліяя на его качество. Но не то съ ръзкими измъненіями погоды къ худшему. Такъ, напр., если изъсколько дней стояла теплая погода, которая должна резко измениться въ ненастье, можно придти на токъ и не услышать ни одной ивсни глухаря, хотя итицы держатся здвсь же и даже щелкають. Впрочемъ, это длится одно, два утра, потомъ глухари запъвають, но только поють слабъе и не такъ дружно, какъ въ хорошую погоду. Если же, напротивъ, погода стояла дурная и должна измѣниться къ лучшему, это сказывается на токъ глухарей въ хорошую сторону: придя на токъ въ скверное ненастное утро, охотникъ къ удивленію своему замѣчаетъ, что токующихъ глухарей больше и они играютъ горячъе. Въ такомъ случат можно быть увтреннымъ, что погода быстро изм'внится къ лучшему. Г. Дмитріевъ приводитъ интересный случай, что однажды онъ былъ на току, когда съ 12-ти часовъ ночи пошелъ хлопьями сивгъ, а къ утру поднялась такая мятель, что въ двадцати шагахъ ничего не было видно. Темъ не менфе глухари пѣли очень горячо, только токъ пачался и кончился часомъ поздиве, судя по времени. Но къ 10 часамъ мятель кончилась и потомъ опять сделалась ясная, теплая погода.

Чтобы покончить съ описаніемъ токовъ, остается сказать о вечернихъ токахъ, которые, благодаря плохому знакомству большинства охотниковъ съ охотой на глухариныхъ токахъ, многимъ совершенно неизвъстны и потому, совершенно неосновательно, даже отрицаются.

Вечернихъ токовъ нормально не бываетъ ни въ мартъ, ни въ мат: они принадлежать исключительно апртлю, когда бываеть самый разгаръ тока; но если поздняя весна передвигаетъ самое горячее время токовъ на конецъ апръля и начало мая, тогда и вечерніе тока переходять на это же время. Точно такъ же вечерніе тока могутъ развиться въ концѣ апрѣля и началѣ мая при нормальномъ наступленіи весны, по если поздніе морозы побьють яїца, и глухарки вынуждены будутъ приступить къ вторичной носкъ. Изъ этого слъдуетъ, что вечерній токъ служить какъ бы дополненіемъ утренняго, но на самомъ дълъ это не совсъмъ такъ: глухарки почти никогда не участвуютъ въ вечернихъ токахъ, и только избытокъ половой энергіи самцовъ находитъ себъ въ нихъ выходъ. Вечерніе тока очень кратковременны, такъ какъ продолжаются минутъ 15-25, не болѣе, начинаясь когда уже станетъ темнъть, т.-е. въ началъ апръля около 8-ми, въ половинъ апраля около половины девятаго и въ конца этого масяца около 9-ти часовъ. Вообще говоря, начало вечернихъ токовъ совпадаетъ болъе

или менфе съ началомъ тяги вальдиниеновъ*). Погода оказываетъ на вечерийе тока вліяніе такъ же, какъ и на утренніе, но въ обратную сторону: именно, въ пасмурную погоду вечерий токъ начинается на четверть и даже полчаса ранфе, нежели обыкновенно. Токуютъ глухари на вечернихъ токахъ всегда въ полдерева и, если никто не спутнетъ ихъ, ночуютъ на томъ же деревф, гдф токовали, другими словами, и вечеромъ и утромъ токуютъ на одномъ и томъ же деревф.

Зам'вчательно, что у насъ никто не наблюдалъ такихъ случаевъ крайней стенени возбужденія глухарей-самцовъ въ періодъ тока, когда они, приходя почти въ бъщенство, бросаются на людей и животныхъ, а между тъмъ въ западно-европейской литературъ такихъ случаевъ приведено изъсколько. Въ очень хорошей книгъ Lloyd'a, The Game Birds of Sweden and Norway, есть даже картинка, изображающая мальчика, который отбивается налкой отъ нападающаго на него глухаря. Следовательно условія жизни глухаря у насъ и въ западной Еврои'в различны, и упомянутое бол вленное изступление птицы въроятно объясняется пенормальностью половыхъ отправленій, что въ свою очередь находить объяснение въ маломъ количествъ самокъ. Хотя охотничы законы проводятся въ западной Европъ гораздо строже, чемъ у пасъ, однако, при абсолютно маломъ количестве известной птицы, всегда можеть быть педостача въ самкахъ, хотя бы онъ погибали отъ чисто случайныхъ причинъ. У насъ же условія совсъмъ другія, и даже при эпергичномъ преслъдованіи самцовъ, самокъ остается такъ много, что иногда на одного глухаря приходится по десятку глухарокъ.

Теперь, познакомившись со всѣми условіями тока, въ заключеніе описація весенняго образа жизни остается сказать объ отношеній къ току глухарокь и вообще объ ихъ образѣ жизни весною. Глухарки приближаются къ мѣсту тока вмѣстѣ съ самцами, т.-е. или въ концѣ февраля, или въ началѣ марта, но въ теченіе первыхъ двухъ—трехъ педѣль остаются совершенно безучастными свидѣтельницами токованія, держась вдали отъ самцовъ. Въ средней Россіи глухарки вылетаютъ на токъ обыкновенно около Благовѣщенья, въ восточной позднѣе—только въ началѣ и даже въ половинѣ апрѣля. Садятся глухарки на яйца, а слѣдовательно и перестаютъ посѣщать тока, въ средней Россіи въ раннюю весну въ концѣ апрѣля, въ позднюю недѣлей или двумя позднѣе. Въ восточной Россіи кладка янцъ обыкновенно оканчивается въ пачалѣ мая.

Все время, нока глухарки вылетають на токъ, нгра самцовъ идетъ особенно горячо, и это лучшее время для охоты съ подхода. Когда же глухарки нанесли янцъ и одна за другой перестаютъ являться на токъ, нгра самцовъ становится вялъе, а затъмъ и со-

^{*)} Въ этомъ отношении я согласень съ г. Разевигомъ и не могу согласиться съ г. Дмитріевымъ, по мижнію котораго пачало вечернихъ токовъ болже или менже совпалаєть съ окончаніемъ тиги.

всѣмъ прекращается. Первыми перестаютъ пѣтъ самые старые самцы, которые раньше всѣхъ начинаютъ токовать и нотому раньше всѣхъ истощаются. Напротивъ, молодые, позднѣе начинающіе токовать, позднѣе и оканчиваютъ, тѣмъ болѣе, что съ удаленіемъ старыхъ самцовъ съ токовища чувствуютъ себя полными хозяевами послъдняго. Пногда счастіе особенно улыбается пмъ, это когда поздніе утренники побъютъ яйца глухарокъ и послъднія снова появятся на току, передъ вторичной кладкой. Чакъ бы то ни было, заканчиваютъ токъ молодые глухари и такъ какъ игра ихъ никогда не бываетъ такъ азартиа, какъ у старыхъ, да и пѣсня короче, это время не благопріятствуетъ охотъ.

Подлетввъ къ току рано утромъ, нередъ восходомъ солица, глухарка садится на пижне сучья какого-инбудь дерева, и начинаетъ клохтать, чего уже такъ давно ждетъ токующій самецъ, и раззадориваемый этими звуками, онъ тѣмъ сильнѣе выводитъ свою пѣсню, высматривая въ промежуткахъ, гдѣ глухарка и не слетѣла ли она на токъ. Между тѣмъ самочка сначала клохчетъ тихо и рѣдко, потомъ чаще и сильнѣе и, наконецъ, слетаетъ съ дерева и идетъ на голосъ токующаго самца. Первое время глухарка остается на утреннемъ току до его окончанія, но какъ только она снесла первое яйцо, она уже не остается все время на току, а задолго до его окончанія улетаетъ къ гнѣзду и кормится тутъ, чѣмъ придется. Здѣсь она проводитъ все время до слѣдующаго утра, когда онять летитъ на токъ.

Къ старымъ глухарямъ на току ежедневно слетается по нъскольку самокъ, которыя остаются съ ними спачала по многу часовъ, вмъстъ кормясь на току или около него. Но съ теченіемъ времени самки остаются на току все меньше и меньше и это расхолаживаетъ токовиковъ, которые тоже начинаютъ отлетать отъ токовища постепенно все на большее разстояніе. Если самокъ мало или онт прилетаютъ на токъ недружно, легко можетъ случится, что къ одной глухаркъ устремятся одновременно два и даже три глухаря и тогда-то между ними завязывается вышеописанная драка. Но что касается разнообразныхъ пріемовъ, употребляемыхъ будто бы глухаркой, чтобы приманить къ себъ глухаря, что передаетъ со словъ одного промышленника г. Арсеньевъ, то это мнъ кажется мало въроятнымъ. Токующій глухарь такъ зорко присматривается и прислушивается, не явилась ли глухарка или по крайней мфрф не подала ли голоса, что очень трудно представить себъ такое невнимание съ его стороны, чтобы глухаркт въ свою очередь пришлось ухаживать за нимъ.

Если сравнить теперь образъ жизни глухарей и глухарокъ въ теченіе 8—9 недѣль, пока продолжается токъ, насъ не удивитъ разница въ состояніи тѣхъ и другихъ въ концѣ этого періода: утомленные глухари, плохо подкармливаясь, тощаютъ до такой степени, что теряютъ около ½ своего вѣса и нуждаются въ продолжительномъ отдыхѣ для возстановленія своихъ силъ. Глухарки, напротивъ, нисколько не страдаютъ ни отъ голода, ни отъ излишияго возбужденія и могутъ

емфло приняться за трудную задачу вывода и воспитанія молодыхъ, въ чемъ самцы не принимають и при ихъ образф жизни не могутъ принять никакого участія. Къ описанію этого періода въ жизни глухарей мы перейдемъ въ слудующей главф, а здфсь, чтобы дополнить сказанное о весеннемъ образф жизни этихъ птицъ, мы должны разсмотрфть нфсколько аномальныя для глухаря условія жизни въ чистомъ чернолувсьф.

В. А. Разевигъ даетъ намъ превосходное описаніе условій распространенія и образа жизни глухаря въ Сапожковскомъ увадв Рязапской губ., отчасти въ смѣшанныхъ, но преимущественно въ исключительно лиственныхъ лъсахъ. Сюда, по мивнію названнаго автора, глухарь выселился изъ сосъднихъ хвойныхъ лѣсовъ послѣ ихъ вырубки, и мы совершенно присоединяемся къ этому выводу. 25 лѣтъ тому назадъ районъ распространения глухаря занималъ въ длину приблизительно 20, а въ ширину 10 верстъ, т.-е. около 200 квадр. верстъ, и представлялъ собою огромный лѣсной островъ, окруженный со всіхъ сторонъ полями. Однако, этотъ лівсной островъ былъ не сплошной, а состоядъ изъ трехъ участковъ: 1) Карловскаго заводскаго лъса (частью лиственный, частью смъшанный хвойнолиственный-осина, береза, ель, сосна); 2) Завидовскаго лѣса (чисто лиственный и преимущественно березовый), и 3) Чучковскаго лъса (лиственный съ небольшими еловолиственными участками). Господствующее насажденіе этихъ лъсовъ — береза и осина, затѣмъ липа и дубъ; вкрапленными встръчаются ольха, вязъ, илимъ, ясень и кленъ. Изъ кустарныхъ породъ чаще другихъ встрѣчаются и образуютъ густой подлѣсокъ рябина, орѣшина, черемуха, крушина, калина, жимолость и бересклетъ. Ельники встръчаются только островами на глинистой почвѣ и суглинкѣ, сосняки—на супеси. Главною характерною чертою здѣшняго чернолѣсья является сплошной, густой, какъ щетка, почти непролазный подлівсокъ изъ перечисленныхъ кустарныхъ породъ, къ которымъ примъншвается еще молодой липнякъ. Въ краснолъсьъ подлівсокъ меніве тусть, но все-таки гораздо гуще, чівмъ въ боліве стверныхъ лъсахъ, и его густотъ пернатая дичь этихъ лъсовъ (глухарь, тетеревъ, рябчикъ, вальдиненъ) въ значительной мфрф обязана своимъ существованіемъ, такъ какъ шаче человѣкъ, лисица, волкъ и доманния собаки легко истребили бы ее. Характерны для этихъ лъсовъ и чисто березовыя рощи, которыя такъ описываетъ г. Разевигъ: "Представьте себъ площадь, десятинъ въ двъсти, поросшую крупной, по разм'врамъ деревъ, строевою березой, и только ею, безъ мальйней подмьси другихъ породъ. Стоятъ эти громадные стволы одинъ отъ другого саженяхъ въ двухъ, прямые, бѣлые, гладкіе какъ свѣчи. Смотринь вверхъ, інапка валится, обоймень — не обиять. Начинается крона дерева только саженяхъ на семи отъ земли, а до той высоты стоятъ они какъ мраморные обелески, какъ колонны, поддерживающія зеленый куполь мавзолея... И смотришь на такую березовую рощу издали, съ вырубки, съ опунки, и видины: отъ вемли и сажени на полторы вверхъ — чаща зеленфетъ, густая, какъ трава на луту заливномъ. А тамъ выше воздвигаются и рельефно выдаются на темномъ фонф лфеного полумрака колонны бфлыя, а надъ ними, въ волнистыхъ легкихъ очертанияхъ раскинулся куполъ изумрудный"... Таковъ въ общихъ чертахъ характеръ здфинихъ лфеовъ.

Что касается образа жизни глухаря въ этихъ лъсахъ, то прежде всего надо отмътить, что всъ токовища находятея здъсь въ смъщанномъ лиственномъ лъсу, съ преобладаніемъ березы, т.-е., иными словами, глухарь при выборъ токовища избъгаетъ какъ чисто низменныхъ участковъ (олешияки), такъ и участковъ съ сухой ночвой (чистые березники). Затъмъ всъ токовища находятся здъсь или по потнымъ мъстамъ, не густо поросиимъ кустами жимолости, бересклета и разными высоко растущими травами, преимущественно зонточными, или же по участкамъ, прилегающимъ къ олешинкамъ и въ краю ихъ, гдъ къ березъ и осниъ примъщиваются одиночные ольхи и вязы, а сырая, кочковатая почва поросла широкими, но ръдко стоящими кустами лозняка, густой, высокой осокой и изръдка камышомъ.

Что касаетея породы дерева, на которомъ токуетъ глухарь, то онъ отдаетъ рѣшительное предпочтеніе березв, и г. Разевигъ только одинъ разъ видѣлъ глухаря, токующаго на осинѣ. Вѣроятно, это объясняется тѣмъ, что глухарь болѣе привыкъ къ березѣ, какъ къ преобладающей породѣ деревьевъ, а можетъ быть болѣе вѣтвистая крона березы лучше защищаетъ его отъ его перпатыхъ враговъ.

Такъ какъ площадь лъса, занятая глухаремъ въ описываемой мъстности, не особенно велика, замътныхъ перекочевокъ этой птицы передъ началомъ тока не наблюдается. Въ это время года глухари держатся тамъ, гдф имфются участки хвойнаго лфса, въ хвойныхъ или смфшанныхъ хвойно-лиственныхъ насажденіяхъ; тамъ же, гдф таковыхъ не имфется, въ тъхъ участкахъ, гдъ подлъсокъ болъе густъ, и затъмъ въ мъщанныхъ осино-березовыхъ насажденияхъ, въ которыхъ встръчаются одешняки. Въ это время въ первомъ случать самцы питаются преимущественно сосновою хвоей, изръдка только поклевывая почки лиственныхъ породъ; самки же преимущественно послъдними и уцълъвшими ягодами рябины. Но во второмъ случат (т.-е. въ лиственномъ лѣсу), и самцы и самки питаются исключительно почками лиственныхъ древесныхъ и кустарныхъ породъ-березовыми, осиновыми, липовыми, ольховыми, вязовыми, ивовыми и, если есть, рябиной. "Поздиве весною, когда сивтъ сойдетъ и оголится почва, къ этому корму примъшиваются еще прошлогоднія ягоды, съмена травъ и какіе-то тонкіе и мягкіе корешки, повидимому, травяные. Еще позднъе, когда листья начнутъ распускаться, и деревья зацвътутъ, глухари питаются какъ молодою листвою, такъ и сережками березы, осины и ольхи. Самки къ этой пищи примъшиваютъ еще молодые побъги нъкоторыхъ травъ и ихъ цвѣтки, а также клюютъ появившихся насѣкомыхъ (червей, муравьевъ, слизняковъ, личинокъ); послъдними онъ кормятся болъе въ періодъ носки янцъ и ихъ высиживанія.

"Первое время въ мартъ, до начала токовъ, глухари держатся небольшими стайками (большею частью особи одного выводка) въ три— пять штукъ, самки отъ самцовъ отдъльно. Позднѣе (съ начала токовъ — самцы и съ начала посъщенія ими токовищъ — самки) стайки разбиваются, и каждая особь живетъ отдъльно. Молодые отдъляются отъ стайки позднѣе, старые раньше".

Что касается самого процесса токованія, то г. Разевигъ не замѣчалъ въ этомъ отношенін никакого отступленія отъ нормы, только пѣсня токующаго глухаря въ чернолѣсьѣ слышится гораздо яснѣе и дальше, чѣмъ въ краснолѣсьѣ.

Этимъ и можно ограничиться въ описании своеобразныхъ условій распространенія и образа жизни глухаря въ чернолѣсьѣ Рязанской губ. Тутъ, очевидно, глухарь попалъ въ чернолѣсье изъ глухихъ, прежде бывшихъ въ этой странѣ, лѣсовъ и лишь до нѣкоторой степени измѣнилъ своимъ привычкамъ коренного жителя темнаго хвойнаго лѣса. Но глухарь живетъ въ чернолѣсьѣ и другихъ частей нашего отечества, такъ, напр., въ Нижегородской губ. (Арзамасскій у.), и здѣсь его поведеніе, особенно въ періодъ тока, настолько своеобразно, что я считаю себя вынужденнымъ цѣликомъ привести имѣющіяся объ этомъ въ литературѣ свѣдѣнія, въ надеждѣ, что они будутъ пополнены и, если нужно, исправлены охотниками данной мѣстности.

"Вст тока, которые я знаю въ лиственныхъ лъсахъ, — пишетъ про Арзамасскій у. г. "Азіатъ",—находятся въ высокоствольномъ рѣдколъсы, по небольшимъ сънокоснымъ полянамъ, почти независимо отъ уединенности этихъ мѣстъ. Иногда они бываютъ очень близки къ опушкъ, и до нихъ доносится щумъ съ большой дороги и изъ ближайшей деревни, что очень мало смущаетъ токующаго глухаря. Какъ бы ни былъ мраченъ и глухъ лъсъ, въ немъ иътъ порядочнаго тока, разъ нътъ этихъ сънокосныхъ полянъ; поэтому при розыскъ новаго тока въ обширномъ лѣсу я привыкъ только спрашивать: "гдѣ у васъ тамъ сънокосныя поляны?" и разъ опъ въ лъсу имъются и найдены, не трудно уже по свъжему помету добраться до центральнаго токовища безъ посторониихъ указаній. Вдоль этихъ полянъ подъ многими деревьями лежитъ свъжій пометъ, а поляна, усъянная пометомъ вразбросъ, есть и центръ токовища. Годами выборъ поляны мѣняется въ ту или другую сторону, по коренной токъ все-таки бываетъ только на одной полянть за одну весну. Общій характеръ этихъ стянокосныхъ полянъ-токовищъ приблизительно слъдующій. Высокій частый осинникъ стоитъ почти силониною ствиой; въ этомъ осинникв или вдоль 5 до 30 саженъ въ поперечникъ, на которыхъ изръдка торчатъ одиночные дубы, мъстами поляны поросли молодыми лъсными побъгами, если сѣнокосъ заброшенъ. Гдѣ-нибудь туть же поблизости и оврагъ

съ ручьемъ и пріютивинимися около него 2—3 старыми соснами. Зд'ясь прожили зиму два — три глухаря, они питались хвоей этихъ сосенъ, тутъ же зарывались въ енфгъ, а въ мартъ тутъ же зачертили крыдьями и передвинулись къ полянъ. Къ этимъ мъстнымъ старожиламъ со дня на день навъдываются посътители зацвътающаго осинника, и токъ постепенно оживляется и разрастается. Гдв-нибудь въ сторону за подверсты или далже есть еще овражект и 2-3 сосны, здѣсь также проводили зиму или часть ея два — три игьтуха, они такъ же, какъ и первые, зарывались здісь въ сибть, а въ мартів чертили крыльями, но до полянъ имъ было дальше; постидая съ апръля осишникъ, они заслышали шумиую хлонотню своихъ сосъдей и въ результатъ сощинсь на тъхъ же полянахъ, куда и начали являться регулярно въ хорошіе вечера. Но въ дип педостаточно теплые они остаются у себя дома и поють на зимнихъ мфстахъ, если довольствуются мъстнымъ кормомъ подъ дубами (прошлогодиими жолудями), или, за неимъніемъ его, летятъ на осининкъ, гдъ также, бываетъ, поють вразбрось. Некоторые же глухари, находящеся въ наивыгодиейшихъ условіяхъ, остаются дома и въ хорошіе вечера, — это въ томъ случать, если туть же въ оврагь поблизости живутъ и глухарки, а мъстный кормъ имъется налицо. Въ такихъ случаяхъ явление на дальній токъ бываеть совефмъ не обязательно, и я зналь старика, который токоваль всегда въ одиночку на своемъ дубу между двумя оврагами. Такимъ образомъ, въ одномъ и томъ же лъсу бываетъ и общее токовище на полянахъ, и изине вразбросъ по осиннику и на отдъльныхъ поляхъ по дубамъ, но ръдкій лъсъ не обходится безъ перваго, развъ ужъ въ немъ пътъ подходящихъ полянъ, что, конечно, случается, но ръдко. На удачно расположенное центральное токовище въ больномъ лъсу въ 7-мъ часу вечера слетается 10 — 12 ифтуховъ и занимаютъ почти всегда одни и та же деревья; 2-3 изъ нихъ, живущіе здась же или совсамъ поблизости, приходять къ току пашкомъ часто раньше другихъ.

"Пѣсня начинается въ 8 час. вмѣстѣ съ тягой вальдшненовъ и продолжается, постепенно усиливаясь, до 10 час. вечера. Болѣе энергичные, или мѣстные, иногда начинаютъ ее прямо на току, но большинство перемѣщается къ полянѣ, постепенно съ каждымъ перелетомъ спускаясь все ниже и ниже на нижніе сучья или на низкія деревья, на которыхъ и засыпаютъ послѣ пѣсни, а кто былъ уже на току, взлетаетъ для этого снова на дерево; во второмъ часу утра пѣсни постепенно и понемногу возобновляются и къ восходу солнца снова переходятъ въ сплошной бой на одной полянѣ и вокругъ нея.

"При такой централизаціи тока подскакиваніе подъ пѣсни совершенно невозможно, и охота можетъ вестись только изъ-за прикрытія, въ родѣ шалаша, къ которому надо являться къ 5 час. вечера. Въ началѣ 11-го часа вечера всѣ глухари уже спятъ, и въ лунную ночь эти спящіе лѣвцы на голыхъ сучьяхъ дубовъ и на осинахъ видны отчетливо. "Словно бараны", какъ выражается мой знакомый промыш-

ленинкъ. Вы можете стрѣлять ихъ на выборъ съ небольшими предосторожностями, и только послѣ 5-го — 6-го выстрѣла иѣкоторые глухари дѣлаются на-чеку, по стоитъ обождать полчаса, и они снова засынаютъ. Если вы заранѣе намѣтили себѣ размѣщеніе всѣхъ глухарей, то можете къ $11^4/_2$ часамъ вечера перестрѣлять ихъ всѣхъ поголовно. Очень часто глухарь выдерживаетъ, не слетая, 3-4 выстрѣла.

"Перебивъ глухарей на центральной полянъ и около нея, можно идти далъе вдоль полянъ, гдѣ нѣтъ-нѣтъ да и наткнетесь на спящаго одинца, который иногда даетъ о себѣ знать, если заслышитъ шорохъ, глухимъ похрюкиваньемъ.

"Разгаръ вечерней итсни, равно какъ и утренияя, но уже передъ самымъ восходомъ солнца, значительно отличается своимъ темпомъ отъ обыкновенной давно извъстной и описанной одиночной пъсни. Извъстно, какъ глухарь, запъвая неръщительно, сначала только "тэкаетъ", не дълая конечной трели, называемой стрекотаньемъ. Затъмъ, распъвшись какъ слъдуетъ, онъ дълаетъ уже эту трель въ концъ каждаго темпа. Общія п'єсни, про которыя я пишу, состоять почти исключительно изъ одного непрерывнаго стрекотанья или щебетанья, и впечатлѣніе отъ этихъ пѣсенъ получается очень близкое къ тому, какъ чирикаетъ стайка воробьевъ въ ясный, солнечный день. Въ разгаръ тетеревинаго тока падъ нимъ стоитъ стоиъ отъ несмолкаемаго бормотанья и урчанья; чуфышканья здісь вы уже не услышите; такой же стоиъ, по болъе тихаго темпа, стоитъ и на глухариномъ току въ его разгаръ, и здъсь иътъ уже равномърнаго тэканья, а слышится одно шинтъне и стрекотанье какъ на полу, такъ и на деревьяхъ; глухарь теряетъ въ это время всякое самообладаніе и осторожность. Не забуду, какъ въ одинъ теплый вечеръ 25-го апръля я полтора часа слушать почти непрерывную пъсню въ 12—15 голосовъ, находясь за прикрытіемъ совершенно въ центръ тока. Ближайшіе глухари пъли на низкихъ дубкахъ въ 10 шагахъ отъ меня, нъкоторые были на току, многіе сзади и вокругъ на осинахъ. Я какъ-то неосторожно повернулся на боку и треснулъ сучкомъ, и это замѣтилъ ближайшій ко мить пътухъ; не подозръвая засады человъка, онъ грянулъ прямо ко мить и, ствъ на сукъ въ 2 шагахъ отъ моей головы, началъ свое сладострастное щебеталье, смотря на меня въ упоръ и не разбирая въ темнот'в очертаній моей распластавшейся фигуры. Я п'всколько минутъ почти не дышалъ, наблюдая токующаго красавца какъ на столѣ, а онъ, въроятно, разочаровавшись въ своей ошибкъ, сбавилъ нъсколько пылъ своей пъсни и медленно повернулся на сучкъ ко мнъ задомъ, закрывшись въеромъ распущеннаго хвоста. Въ этотъ моментъ я могъ бы отлично схватить его за ноги и привлечь къ себф, но въ это же время другой глухарь сдалаль оглушительный перелеть къ моему сосъду и послъдній, не стерпъвъ вызова, ринулся на него со своего сучка.

"Я не стръляю глухарей на вечернемъ току,—продолжаетъ ав-

торъ описанія этого глухаринаго Эльдорадо, — предпочитая пасмотрѣться веласть на этотъ ръдкій спектакль, и нахожу здісь много общаго съ тетеревинымъ токомъ. Я видълъ, какъ иногда иътухъ съ дальняго дерева пеобыкновенно ловкимъ полетомъ спускался прямо на поляну поближе къ дерущимся, при чемъ могу этотъ воздушный ипруэть приравнять только къ тому, какъ селезень бросается на воду къ круговой уткъ. Наблюдалъ, какъ старый пътухъ, живущій близъ тока и приходившій на поляну п'янкомъ, вызываль къ себ'в на бой сидящихъ на деревьяхъ, подпрытивая кверху на одномъ мъстъ, буквально какъ токовикъ-тетеревъ, по съ гораздо большимъ шумомъ; видълъ какъ молодой глухарь безирестанно перелеталь съ дерева на дерево по опушкт поляны, смотря на дерущихся стариковъ, заглядывая внизъ н безпокоїно вытягивая шею, не зная, на что ему рфшиться и не слетая при моемъ неожиданномъ появлении вблизи него. Иногда я умышленно слегка попутивалъ глухарей, когда опи были въ полномъ азартъ, и это заставляло ихъ только перелетать или перебъгать не болъе сотни шаговъ, чтобы начать повую возню на ближайшей сосъдней полянть.

"Я не некалъ на токахъ добычи, предпочитая въ случать надобпости застрълить итъсколько пътуховъ на выборъ послъ окончания вечерней итъсни, и зачастую соединялъ это удовольствие съ тягой вальдинеповъ, которая обыкновенно происходила въ тъ же дни и часы на
тъхъ же мъстахъ, но чаще, приходилось о тягъ забывать совсъмъ.
Иногда бывало, что стръляень на тягъ вальдшненовъ и вдругъ вблизи
на полянт запъваетъ одинокій глухарь; идень къ нему подъ пъсню,
видинь его на голомъ суку огромнаго развъсистаго дуба, а вальдинепы снуютъ все чаще и все ниже, пролетая около поющаго глухаря, который не обращаетъ на нихъ никакого вниманія. Тутъ не
знаень уже, кого стрълять, и стопнь какъ очарованный, забывая о
ружьт и выстрътъ. Вст эти картины бываютъ особенно интенсивны,
если апръль былъ холодный, тяги и токовъ почти не было, и вдругъ
теплая погода сразу наступаетъ во второй половинъ апръля; тогда
глухарь и вальдшнены спъшатъ наверстать потерянное время, и тока
и тяга достигаютъ небывалаго напряженія".

Таковы условія токованія и самое токованье глухарей въ лиственныхъ лѣсахъ Арзамасскаго у., подобнаго чему у насъ шкѣмъ и нигдѣ болѣе не наблюдалось.

Вникая въ это описаніе, я долженъ сознаться, что для меня въ немъ имѣется много непонятнаго. Глухарь всегда и вездѣ крайне осторожная птица и потому его поведеніе по отношенію къ охотнику въ чернолѣсы Арзамасскаго у совершенно загадочно. Пускай за нимъ тамъ мало охотятся, но вѣдь и на крайнемъ сѣверѣ, гдѣ охотники также рѣдки, никому не приходилось охотиться за токующимъ глухаремъ иначе какъ съ подхода, пользуясь извѣстными моментами пѣсни. Авторъ приведеннаго описанія говоритъ, что подходъ въ арзамасскихъ лѣсахъ къ токующимъ глухарямъ невозможенъ вслѣдствіе централи-

зацін тока. Но какъ же съ этимъ примирить, что послѣ тока глухарей можно стрѣлять на токовищѣ же на выборъ и что они выдерживаютъ цѣлую кононаду 5—6 выстрѣловъ, продолжая спать поистинѣ богатырскимъ сномъ? Наконецъ, если возможно, что птицы пѣсколько измѣнили свои привычки вслѣдствіе крайней своей многочисленности, откуда послѣдняя?

Г. Азіатъ говоритъ, что опъ не стръляетъ глухарей на току, но, повидимому, онъ стръляетъ ихъ, и много, виѣ тока, и какимъ образомъ, несмотря на все это, несмотря на безъ сомиънія многочисленныхъ пернатыхъ и четвероногихъ враговъ, количество ихъ все-таки остается огромнымъ? Повторяю, я не могу смотръть на лъса Арзамасскаго у, иначе какъ на глухариное Эльдорадо и былъ бы очень радъ всякимъ дополнительнымъ свѣдъніямъ въ этомъ направленіи.

II.

Весенняя охота. – Подходъ къ токующему глухарю. — Правила охоты на глухариныхъ токахъ.

Единственная весенняя охота за глухарями-охота съ подхода. Основана она на томъ, что эта обыкновенно крайне осторожная птица въ моментъ скирканья или стрекотанья не обращаетъ вниманія на то, что происходить вокругь нея и темъ самымъ даетъ въ распоряжение охотника 3-4 секунды, когда онъ можетъ подходить къ ней. Краткость времени подхода дълаетъ то, что этими секундами надо дорожить, т.-е. въ теченіе ихъ надо по возможности приблизиться къ глухарю, съ тъмъ, чтобы съ окончаніемъ скирканья буквально замереть въ одномъ положении и ждать, когда глухарь опять начнетъ скиркать. Отсюда можетъ показаться, что охота за глухаремъ дѣло вовсе не трудное, такъ какъ казалось бы, чего проще-извѣстное время стоять на мъстъ, извъстное время подходить; къ тому же величина птицы дълаетъ ее, повидимому, очень легкой добычей. Но практика учитъ насъ, что это одна изъ трудивішихъ и вмвств съ твиъ изъ наиболве привлекательныхъ охотъ. Въ самомъ дѣлѣ, что касается трудности подхода къ токующему глухарю, она сразу станетъ понятна, если принять во випманіе, что подходъ производится въ раниюю весну, или по несовсѣмъ стаявшему снѣгу, или по мокрой почвѣ, даже по валежнику, что охотникъ рискуетъ на каждомъ шагу оступиться и унасть, и несмотря на это, прежде всего долженъ думать о томъ, чтобы глухарь его не замътилъ. Затъмъ, убить глухаря вовсе не такъ легко, какъ кажется: опъ очень выпосливъ на рапу, да и защищенъ отъ дроби жесткими перьями превосходно. Коротко говоря, глухаря на току добыть не только не легко, но даже и очень трудно, и отсюдазаманчивость охоты на этого красавца дремучаго лъса.

Такъ какъ въ литературѣ имѣется превосходное описаніе всего такъ сказ. механизма весенией охоты за глухаремъ, составленное съ большой любовью и знаніемъ дѣла г. Дмитріевымъ, я и позволю себѣ

привести самое важное изъ этого описанія. Однако, оговорюєв: нельзя быть хорошимъ охотинкомъ, не изучивъ основательно повадокъ и привычекъ дичи, и нотому прежде чѣмъ приступить къ охотѣ за глухарями, надо тщательно ознакомиться съ ихъ образомъ жизни, т.-е. съ біологической частью этой монографіи.

"Прежде, чъмъ ъхать (на глухариную охоту),--инисть г. Дмитрієвъ, пужно обратить вниманіе на ружье; оно должно быть съ сильнымъ и рѣзкимъ боемъ и пристрѣлено круппыми №№ дроби (напримъръ, № 1, 2) не менъе какъ шаговъ на нятьдесять. Если на это разстояніе ружье бьеть не кучно, и дробь не вся уходить въ ми-шень, то его брать не следуеть. Глухарь весною необыкновенно кртпокъ на рану, поэтому ружье должно быть съ рфзинуъ боемъ, и чъмъ оно дальше и кучиће бъетъ, тъмъ, конечно, лучие. Говоря объ этомъ, Л. П. Сабанъевъ замъчаетъ слъдующее: "Что же касается ружей, то всего пригодиће для этой охоты или хорошая винтовка, или же далекобойная тяжелая одностволка, заряженная самою крупною дробью; тогда можно стрълять и на разстоянін 50-60 и болье шаговъ, между твиъ какъ изъ ръдкой двухстволки какъ заряжающейся съ дула, такъ и съ казенной части, удается всегда убить наповалъ эту огромную птицу на такомъ разстоянии; такое ружье имфетъ только то удобство, что при промах в въ сидячую можно пногда убить ее въ летъ". Съ этимъ я не виолиъ согласенъ. По моему, для того, чтобы попасть въ глухаря изъ винтовки, пужно стрълять очень хорошо пулей, а этимъ не многіе могуть похвалиться; это не то, что стріальба дробью. Я, напримъръ, знаю многихъ охотниковъ, хороно стръляющихъ изъ дробовика и въ то же время очень плохо изъ јштуцера и винтовки.

"Это происходитъ нотому, что многіе изъ нихъ мало интересуются этой стръльбой и даже совсъмъ не имъютъ винтовокъ, находя это оружіе совершенно лишнимъ для подмосковныхъ охотъ, съ чѣмъ нельзя не согласиться. Но тъмъ не менъе отвергать совсъмъ винтовку, какъ оружіе неудобное для глухариной охоты, я считаю себя не въ правъ. Кто хорошо стръляетъ изъ винтовки, тотъ можетъ ъхать и съ нею. Безъ сомнънія, всякому охотнику пріятно убить птицу на дальнемъ разстоянін, а тѣмъ болъе изъ такого оружія, какъ винтовка. Помоему, стръльба изъ нея глухарей есть своего рода шикъ въ этой охотъ и имъ въ правъ всякій охотникъ гордиться. Но надобно замътить, что стрѣльба изъ винтовки имѣетъ и дурную сторону; такъ, напримъръ, при неудачномъ выстръть изъ одного ствола охотникъ лишенъ возможности сдълать второй выстрѣлъ по летящей птицѣ, что изъ дробовика всегда возможно. Что же касается тяжелой одностволки (изъ которой можно стрѣлять на 50—60 шаговъ), то я могу только сказать, что нахожу ее положительно неудобной для такой охоты. Въ настоящее время такъ много хорошихъ дальнобойныхъ двухствольныхъ ружей, изъ которыхъ всегда возможно убить на 50-60 шаговъ глухаря, что для этого нътъ надобности прибъгать къ одностволкъ,

а тѣмъ болѣе такой тяжелой, таскать которую цѣлое утро можно только считать наказаніемъ.

"Что же касается того, какая система ружей и какого мастера болъе пригодны для такой охоты, — сказать довольно трудно. Безъ сомиѣнія, хорошо, конечно, брать чокъ-боръ, если только онъ есть. Но если его нѣтъ, то можно брать и обыкновенный дробовикъ цилиндрическаго сверленія, только бы онъ хорошо билъ. Часто приходится подходить къ глухарямъ утромъ, когда уже станетъ свѣтло, по рѣдкому л'всу, гдф укрываться приходится только за деревьями, въ такомъ мъстъ глухарь можетъ скоро замътить охотника, и подойти къ нему на близкое разстояніе (напримѣръ, на 30-40 шаговъ) нечего и думать. Поневол'т приходится стрълять иногда на 50 или 60 шаговъ. Вотъ тутъ-то именно и нужна сила и дальнобойность ружья. Свалить съ дерева на такое разстояніе глухаря весьма пріятно, а это возможно только изъ хорошаго дальнобойнаго ружья, пристръляннаго по всъмъ правиламъ нов віїшихъ усовершенствованій. Дробь для стр вльбы глухарей нужно брать самые крупные №№, наприм., № 1 и 2. Нѣкоторые берутъ нулевую и даже оо. По моему, эта очень крупна. Такую дробь больше будетъ разносить, и меньше шансовъ убить птицу. Я лично употребляю дробь № 2 англійскую, и очень доволенъ ею. При стрѣльбѣ съ парашютомъ этимъ № у меня бывали очень хорошіе выстрълы, лучше которыхъ и желать нечего.

"Собираясь въ отъездъ на несколько дней "), съ ночевками въ лѣсахъ, нужно подумать и о томъ, чтобы эти ночевки не имѣли дурныхъ послъдствій для здоровья, т.-е., чтобы не получить ревматизма или вообще простуды. Я долженъ сказать откровенно, что хотя и страстно люблю эту охоту съ ея трудностями и ночевками въ лѣсахъ, но тѣмъ не менъе, всегда стараюсь обставлять эти ночевки такъ, чтобы опъ по возможности не имъли дурныхъ послъдствій для здоровья. Меня могутъ упрекнуть въ излишней предосторожности. Я готовъ принять этотъ упрекъ, но все-таки останусь при томъ убъжденіи, что глупо рисковать здоровьемъ изъ-за охоты. Въ этомъ случав намъ нътъ надобности брать примъръ съ промышленниковъ, которые, часто возвратись съ вечерниго тока съ мокрыми ногами и кой-какъ обсунившись у костра ложатся на мерзаую землю и спять крѣпкимъ спомъ до утренняго тока. Н'вкоторымъ изъ нихъ это проходитъ, благодаря привычкъ и желъзному здоровью, но за то многіе черезъ это страдаютъ ревиатизмомъ. Часто приходится слышать отъ нихъ жалобы на боли въ рукахъ и ногахъ и просьбы какъ бы помочь этому. Но промышленника, охотящагося часто изъ-за куска насущнаго хлъба, осуждать за это мы не въ правѣ. Иной изъ нихъ и радъ бы идти въ крфикихъ сапогахъ, да у него ихъ ибтъ и купить не на что; а между

^{*)} Надо помнить, что поблизости населенныхъ центровъ глухариныхъ токовъ или нътъ совсъмъ, или есть только ничтожные. почему для хорошей охоты приходится уъзжать далеко и сравнительно надолго.

Авт.

тъмъ нужда заставляетъ пдти. Мы же вдемъ на охоту единственно только для удовольствія, поэтому между нашей и ихъ охотой не можетъ быть никакого сравненія.

"Итакъ, увзжая на ивсколько почей, пужно брать съ собой: 1) полушубокъ; 2) ватную куртку для подхода; 3) пару запасныхъ толстыхъ брюкъ и нары двъ шерстяныхъ чулокъ; 4) двъ пары саногъ: один болотные (въ которыхъ фхать), другіе—валенки на случай мороза вочью. Кром'в того пары дв'в бълья. Нужно им'вть въ виду, что погода весной очень часто мъняется. Сколько разъ, уъзжая изъ Москвы въ отличную теплую погоду въ Новгородскую или Тверскую губериіи, я заставалъ тамъ морозы въ 3^0-5^0 ; поэтому полушубокъ и валенки берутся обязательно, какая бы ни была теплая погода при отъфзуѣ, чтобы, въ случат прихода съ вечерняго тока, можно было перемънить куртку на полушубокъ, а болотные сапоги на валенки (при этомъ смізняются и чулки, если они сырые). Въ такомъ костюміз вамъ тепло и у васъ не зябнутъ ноги. Тогда какъ, сидя на землъ въ холодныхъ сапогахъ, даже при небольшомъ морозф, у васъ прежде всего зябнутъ ноги, что країне непріятно. Утромъ, когда идти на токъ, полушубокъ опять замівняется курткой и валенки-болотными сапогами. Приля съ вечерняго тока, и которые обыкновенно ложатся спать у костра до утренняго тока. Я этого никогда не дълаю-во избъжание простуды, такъ какъ, чтобы вы ни подстилали подъ себя: лапшикъ ли, теплое ли платье, на холодной мерзлой землъ все-таки легко простудиться; притомъ спать приходится только какихъ-нибудь 2—3 часа, а изъ этого, но моему, не стоить и ложиться. Изъ провизіи самое лучшее брать съ собой сырую говядину, наровую кастрюлю, спиртъ, чего-инбудь не очень соленаго изъ закуски и дорожный погребецъ съ чаемъ, сахаромъ и чайной посудой. Надобно замътить, что никакая закуска не можетъ сравниться съ кускомъ горячей говядины, приготовленной тутъ же въ лъсу. Какъ бываетъ пріятно придти съ вечерняго тока къ разведенному костру: передъ вами кипитъ самоваръ, около него погребецъ съ чайнымъ приборомъ и закуска, тутъ же стоитъ и кастрюля. Положить говядину (разръзанную заранъе) и зажечь спиртъ, дъло очень скорое. Черезъ нѣсколько минутъ говядина готова. Послѣ этого, кто откажется выпить рюмку водки и събсть два, три хорошихъ куска горячей говядины. Но кто не любитъ заниматься такой стряпней или найдетъ это неудобнымъ, тотъ можетъ ограничиться и одной холодной закуской. Во всякомъ случать брать кастрюлю и спиртъ не лишнее. Прівхавъ съ охоты въ деревню, можно всегда приготовить что-нибудь горячее. Довольствоваться же только одной холодной закуской нѣсколько дней не всегда бываетъ пріятно.

"Ъхать за глухарями нужно тогда, когда снѣгъ въ лѣсу уже настолько сойдетъ, что можно подходить къ нимъ безъ труда. Обыкновенно, при ранней веснѣ, это бываетъ въ началѣ, а при поздней— въ половинѣ апрѣля. Можно однако ѣхать и въ мартѣ; но при этомъ для подхода нужно, чтобы въ лѣсу былъ такой настъ, который сво-

бодно держалъ бы человѣка, что бываетъ не каждый годъ. Если же наста пѣтъ, то можно подходить и на лыжахъ; для этого нужно, чтобы спѣтъ былъ очень мягкій и погода теплая, безъ мороза. Если же хоть небольшой морозъ и подъ лыжами будетъ шумѣть, тогда подойти певозможно. Но такія благопріятныя условія рѣдко бываютъ. Такъ, напримѣръ, сколько я не ѣзжалъ въ мартѣ,—вслѣдствіе дурного подхода охоты были большею частію пеудачны. Какъ парочно, случалось всегда такъ, что когда я уѣзжалъ нзъ Москвы въ теплую погоду, надѣясь на хорошій подходъ на лыжахъ, по пріѣздѣ на охоту пачинались морозы и подходить было нельзя. Или, наоборотъ, уѣзжая послѣ оттепели въ морозы съ падеждой на хорошій настъ, по пріѣздѣ туда я уже не заставалъ наста и подходить было нельзя.

"Чтобы избѣжать этого, я теперь рѣдко когда ѣзжу такъ рано, и не нахожу это особенно пужнымъ. Если начинать охоту, положимъ, хоть съ 5-го апрѣля и оканчивать Николинымъ днемъ, т.-е. 9-го мая, времени будетъ достаточно для того, чтобы съѣздить иѣсколько разъ. Кромѣ того, любители этой охоты могутъ вознаградить себя еще осенними токами глухарей.—Идя на токъ, необходимо брать съ собой проводника, для того, чтобы не заблудиться, и въ случаѣ надобности нести убитыхъ глухарей. Проводникъ долженъ быть толковый; хорошо брать мѣстныхъ охотниковъ-промышленниковъ, которые знаютъ всѣ мѣста токовъ, или—лѣсниковъ. Но если васъ пріѣхало двое-трое, а промышленниковъ-охотниковъ только одинъ, тогда нужно брать кого-нибудь изъ мужиковъ, но непремѣнно знающихъ хорошо мѣстность. Въ противномъ случаѣ можно легко заблудиться и зайти, Богъ знаетъ, куда.

"Считаю не лишнимъ сдълать нѣсколько полезныхъ совѣтовъ тѣмъ молодымъ охотникамъ, которые никогда не бывали на токахъ. Каждый изъ нихъ, пріѣхавши на токъ, долженъ поставить себѣ за правило слѣдующее:

- 1-е. Говорить съ проводинкомъ только шопотомъ.
- 2-е. Если придется по необходимости кашлять, то не иначе какъ въ фуражку.
- 3-е. Ходить какъ можно тише; если есть валежникъ, то по возможности обходить его, чтобы не хрустъло подъ погами.
- 4-е. Если глухари не поютъ, то черезъ каждые 20—30 шаговъ останавливаться и слушать, не запоютъ ли гдъ, и вообще быть внимательнымъ ко всему окружающему.
- 5-е. Если, придя на токъ, вы знаете навърное, что тутъ есть глухари, въ такомъ случаъ слъдуетъ състь гдъ-нибудь и ждать когда они заноютъ, но отнюдь не ходить по току и не путать ихъ.
- 6-е. Если вы предполагаете, что вблизи могутъ быть глухари, то лучше всего не курить, особенно въ темнотъ, но если безъ этого обойтись нельзя, то курить меньше, по возможности скрывая огонь.
- 7-е Придя на вечерній токъ и зам'єтивъ гді с'єли глухари, отнюдь не нужно подходить къ нимъ безъ п'єсни, чтобы не спутнуть

ихъ и не испортить утренняго тока. Самое лучшее състь на току и ждать, когда заноють.

8-е. Если вечеромъ глухари не будутъ ивть, то какъ етемиветъ, потихоньку встать и идти къ мъсту почлега.

- 9-е. Двумъ охотникамъ на одномъ току можно быть только тамъ, гдъ играютъ штукъ 8—10, и мъсто тока такъ расположено, что, подойдя, вы не мъщаете и не портите охоты одинъ другому. Въ противномъ случаъ дучне, для успъха охоты, ъхать одному на одинъ токъ, а другому—на другой.
- то-е. Если вы услыхали глухаря, положимъ, наговъ за 150, и, соображаясь съ мъстностью и подходомъ, видите, что можете пройти шаговъ 50 безъ игъени, не рискуя подинумъть его, то идите, по старайтесь при этомъ идти такъ тихо, чтобы вы даже сами не слыхали своихъ шаговъ. Если же мъстность не благопріятствуетъ этому, то начинайте подходить прямо въ изсеню.
- тт-е. Для усигьха охоты слъдуеть всегда начинать подходъ не ближе 100 шаговъ.
- 12-е. Прежде чъмъ подходить къ глухарю възгъсню, нужно прежде всего обратить винманіе на мъстность, чтобы опредълить приблизительно съ какой стороны можно удобите подойти; съ такой и нужно подходить. Лучше сдълать обходъ итъсколько дальше, но идти такимъ мъстомъ, гдъ глухарь васъ не такъ скоро можетъ замътить *).
- 13-е. Во время пѣсни слѣдуетъ дѣлатъ два, три шага, не болѣе; черезъ это вы не заныхаетесь и, подойдя къ глухарю, можете тотчасъ же стрѣлять. Другіе дѣлаютъ иногда 4—6 шаговъ (такъ что вмѣсто подхода выходитъ какое-то прыганье), и послѣ этого, подойдя къ глухарю, не могутъ перевести духъ и черезъ это иногда пуделяютъ. Я не завидую такимъ скороходамъ и во время подхода дѣлаю не болѣе 2—3 шаговъ и останавливаюсь въ то время, когда глухарь только что окончиваетъ свою пѣсию. Такой подходъ, по-моему, гораздо вѣрнѣе, по русской пословицѣ: "тише ѣдешь, дальше будешь".
- 14-е. Если, при подходѣ къ глухарю, придется провалиться въ сиѣгъ или упасть въ воду, нужно оставаться въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока онъ запоетъ. Въ противномъ случаѣ можно подшумѣть его.
- 15-е. Ходить по току нужно всегда съ заряженнымъ ружьемъ и съ взведенными курками, и смотрѣть по деревьямъ, чтобы, въ случаѣ если придется замѣтить близко сидящаго глухаря, можно было бы тотчасъ стрѣлять въ него. Такіе случаи, хотя и рѣдки, но все-таки бываютъ.
- 16-е. Придя на вечерній токъ и садясь выслушивать глухарей, нужно, чтобы ружье лежало на колъняхъ заряженное и съ взведенными курками. Глухарь садится иногда не замъчая присутствія чело-

^{*)} Эта предосторожность нужна только утромъ, когда станетъ свѣтло. Въ темнотѣ же можно подходить и по чистому мѣсту.

Прим. Дмитр.

въка, если только послъдній смирно сидитъ. Ко мнъ одинъ разъ подлетълъ такъ глухарь шаговъ на 30 и сълъ противъ меня на сосну.

17-е. Подойдя къ глухарю на выстрѣлъ, нужно поднимать ружье и прикладываться во время пѣсни; точно такъ же и стрѣлять, чтобы, въ случаѣ неудачнаго выстрѣла, можно было выстрѣлить вторично.

18-е. Стрѣлять глухаря нужно только въ плечо. Это самый вѣрный выстрѣлъ; но отнюдь не въ грудь и не въ задъ. Лучше сдѣлать для вѣрности стрѣльбы два, три шага въ сторону (во время пѣсни), чѣмъ стрѣлять на "авось", по чемъ придется. Надобно имѣть въ виду, что глухарь, даже смертельно раненый, если не перебито крыло, улетаетъ иногда очень далеко. Не слѣдуетъ также стрѣлять и сквозь сучья.

"Покончивъ съ подходомъ и стръльбой, я перейду теперь къ ночевкамъ въ лѣсахъ и деревняхъ.

"Глухарь не любитъ близкаго сосъдства съ человъкомъ; поэтому ръдко гдъ тока ихъ бываютъ недалеко отъ жилья. Большею частію, почти всегда,—за нъсколько верстъ отъ ближайшей деревни или лъсной сторожки. Притомъ, дороги—почти никакой. Приходится идти лъсомъ и переходить иногда въ нъсколькихъ мъстахъ моховыя болота, что ночью весьма неудобно. Чтобы избъжать этого и попасть на токъ своевременно, лучше идти, съ объда, побывать на вечернемъ току и ночевать въ лъсу. Пріятны ночевки въ лъсахъ особенно въ теплую погоду, когда вы, такъ сказать, лицомъ къ лицу сходитесь съ природой. Не говоря уже о прелести самыхъ ночей, вамъ приходится иногда наблюдать различные пролеты птицъ, которыхъ днемъ не бываетъ. Вотъ почему я, какъ охотникъ и любитель природы во всъхъ ея видахъ, предпочитаю проводить весения ночи въ лъсахъ. Ночевать же въ деревнъ, въ душной избъ (иногда съ массой насъкомыхъ) иътъ ничего привлекательнаго.

"Разводить костеръ можно не далъе какъ шагахъ въ 150 или 200-хъ отъ тока; при этомъ, по возможности меньше шумъть.

"Наконецъ, охотясь за глухарями въ такихъ лъсахъ, гдѣ есть медвъди, нужно всегда имѣть при себѣ пули, чтобы, въ случаѣ подобной встрѣчи, можно было защитить себя".

Охота на току въ чернолъсъв требуетъ особой сноровки, такъ какъ глухари токуютъ здъсь всегда близъ опушки небольшихъ полянъ или прогалинъ и преимущественно въ той части опушки, которая обращена на востокъ. Кромъ того, глухарь обыкновенно помъщается на сучкъ дерева такъ, что голова его обращена къ полянъ или прогалинъ, т.-е. къ востоку.

"Если подходить къ токующему глухарю, —говоритъ г. Разевигъ, — черезъ такую поляну, то хотя самый подходъ и легче чъмъ лъсомъ, по въ особенности ссли сиъгъ еще не сошелъ, или послъ сильнаго утренника, подходящаго такимъ манеромъ охотника глухарь навърное изъ пяти разъ три раза замътитъ ранъе, чъмъ охотникъ его. Затъмъ, проходя черезъ такую поляну, послъ значительнаго утренника, почти

невозможно скакать **) не производя шума, такъ какъ ледъ на этихъ полянахъ и между кочекъ взламывается подъ ногой охотинка съ сильнымъ трескомъ. Къ тому же, подходя къ глухарю со стороны поляны и съ востока, его не такъ скоро замѣтинь, какъ подходя стороной или съ запада, противъ свѣта, такъ какъ въ первомъ случать слухаря не столь рѣзко отдъляется отъ темнаго фона лѣса и отъ темной стороны пеба. Затѣмъ, вообще трудитье подойти незамѣченнымъ къ любому животному, если голова его обращена въ сторону подходящаго; да и выстрѣлъ въ глухаря спереди, по моему миѣпію, самый невѣрный, такъ какъ "убойнымъ" мѣстомъ представляется одна только голова; большая же часть шен и зобъ защищены толстою и упругою бронею перьевъ. Даже со смертельною раною въ шею, зобъ или нижнюю часть брюха глухарь улетаетъ еще далеко.

"Если же подскакивать глухаря со стороны лъса, то являются слъдующія неудобства: во-первыхъ, приходится екакать сквозь болъе или менъе густой подлъсокъ, сильно замедляющій подходъ, да и ноги путаются въ кореньяхъ и сучьяхъ, и то и дѣло приходится спотыкаться; вѣтви же и отпрыски подлъска, въ особенности же раннею веспой, когда они еще мерзлы, и въ особенности отпрыски липы и оръщины, при проскакиваніи ихъ бьютъ лицо какъ шпицрутенами, да и вдобавокъ еще долго шумятъ и, ударяясь другъ о друга, щелкаютъ какъ кастаньеты. Такіе кусты лучше проходить мѣрнымъ шагомъ, неподволь разводя вѣтви руками,—если ужъ нельзя ихъ обойти.

"Второе неудобство подхода со стороны чащи то, что весьма часто приходится наталкиваться либо на "щелкающихъ" лишь, или вовсе даже не токующихъ молодыхъ самцовъ, или на самокъ, которыя, синмаясь съ дерева, сильно пугаютъ токующихъ самцовъ, и неръдко даже портятъ всю охоту.

"Самое лучшее подходить или по самой опушкть такой поляны, или же, если подходъ тамъ удобнте, шагахъ въ десяти-двадцати отъ опушки, краемъ лъса. Здъсь почва обыкновенно суще, кочки встртивнотся ръже, ледъ въ легкіе утренники совстмъ не образуется, или же сравнительно небольшія лужицы покрываются только тонкимъ слоемъ его; подлівсокъ ръже, а ръдко стоящія деревья скорте укрываютъ подходящаго охотника, чти мізнаютъ ему. Подходить приходится къ глухарю сбоку, что даетъ возможность сдълать самый втрный выстрта, въ плечо. Неудобно только, при боковомъ подходть, если глухарь помъстился на противоположной сторонть дерева; сквозь сучья стрталять не слъдуетъ,—изъ десяти выстрталовъ, восемъ неудачныхъ,—а лучше обойти дерево. Впрочемъ, я въ такомъ случать почти никогда собственно не обхожу дерево, а илу прямо на него,—моментъ,

^{*)} Я лично совершенно согласенъ съ г. Дмитріевымъ, что подскакивать или прыжками подходить къ токующему глухарю менѣе выгодно, чѣмъ подходить большими шагами, но. съ одной стороны, подскакиванье вошло въ плоть и кровь большинства охотниковъ, съ другой—оно является прямымъ слѣдствіемъ извѣстнаго нервнаго состоянія охотника.

нахожусь подъ самымъ глухаремъ, а затъмъ три-четыре прыжка выносятъ меня на противоположную сторону и, обернувнись, даютъ возможность стрълять на самомъ върномъ разстояни.

"Следуетъ также замътить, что изсия токующаго глухаря здъсь, въ чернолъсъв, слышится гораздо ясиъе, и токующаго глухаря слышно на гораздо большемъ разстояніи, чёмъ въ краснольсъв, что значительно облегчаетъ какъ подходъ, такъ и самую охоту. Но, съ другой стороны, подходъ подъ пъсшо затрудняется изсколько чистотою и свътлостью лъса гдъ весною совсъмъ голо, а потому скакать приходится отъ дерева къ дереву, или прикрываясь кустами. Укрываться слъдуетъ, но возможности, за стволами осины, ольхи и т. под., а не за березою, отъ бълой коры которой фигура охотника ръзко отдъляется. Но такой выборъ не всегда возможенъ, и часто приходится стоять нодъ прикрытіемъ тонкаго кустика жимолости или бересклета, неръдко же вынужденъ бываешь простоять, въ ожиданіи начала пъсни, на совершенно открытомъ мъстъ; тутъ уже выручаетъ одна только неподвижность".

Слѣдуетъ еще имѣть въ виду, что иногда глухарь хитритъ, вдругъ останавливается среди пѣсни и, замѣтивъ благодаря этому маневру охотинка, тѣмъ болѣе если послѣдній недостаточно остороженъ, перемѣщается на другое дерево. Здѣсь глухарь хотя и продолжаетъ пграть, но уже гораздо осторожиѣе, нежели сначала, отъ времени до времени совершенно неожиданно останавливаясь среди самой игры и дѣлая подходъ невозможнымъ.

Вотъ и всф необходимыя замфчанія относительно охоты на глу-хариномъ току. Главное для охотника все-таки ознакомиться внимательно съ новадками и привычками птицы на практикф, примфниться къ условіямъ мфстности и тфмъ самымъ развить въ себф находчивость и умфнье примфняться къ различнымъ случаемъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Лето и летняя охота.

Лътняя жизнь глухарей.— Выводъ молодыхъ. — Образъ жизни выводковъ въ хвойныхъ лъсахъ и чернолъсъъ. — Образъ жизни старыхъ самцовъ. — Лътняя охота. — Охота съ лягавой, на манку и на осинникъ.

Въ первой главъ уже было сказано, что въ средней Россін глухарки садятся на яйца въ раниюю весну въ концѣ апръля, въ позднюю — недѣлей, двумя позднѣе. Въ восточной Россіи (Пермская губ.) глухарки, повидимому, пормально садятся на яйца въ половинѣ первой трети мая. Однако уклопенія отъ этого срока бывають и въ ту, и въ другую сторону. Такъ, въ Тамбовской губ. Богдановъ нашелъ однажды выводокъ глухарятъ 9-го мая, тогда какъ по Сабанѣеву въ другомъ году большинство глухарятъ вывелось здѣсь только въ послѣдней трети мая. Если принять во вниманіе, что глухарки сидять на япцахъ оть 20 до 24 дней, то само собою вытекаеть, что глухарята выводятся въ разныхъ частяхъ Россіи, начиная съ половины мая и кончая послуждинми числами этого мъсяца. Поэтому Л. П. Сабанъевъ совершенно опшбается, говоря, будто вообще выводъ молодыхъ глухарей совершается въ первыхъ числахъ йоня,—это срокъ слишкомъ ноздий.

Нѣтъ никакого сомитыйя, что начало кладки ящть у глухарки стоитъ въ самой тѣсной связи съ тѣмъ, когда сходитъ сиѣгъ и оттанваетъ почва. Въ средней Россіи сиѣгъ уже въ значительной степени сходитъ между 5 и то апрѣлемъ, и около этого времени глухарки обнаруживаютъ первые признаки заботы объ устройствѣ гиѣзда. Послѣднее производится до крайности просто: выбравъ себѣ пебольное естественное углубленіе и, если оно недостаточно, углубивъ его, глухарка выстилаетъ его травой и изпутри собственными перьями, и гиѣздо готово. Если мѣсто министое, глухарка просто выдавливаетъ въ мохѣ ямку и выстилаетъ ее перьями. Но перьевъ всегда довольно много: съ одной стороны они хорошо держатъ тепло, съ другой, позволяють самкѣ илотиѣе прижиматься къ гиѣзду.

Первое время выдета на токъ, т.-е. до начала кладки, глухарка остается на току всё время, т.-е. до его окончанія. Но какъ только первое яйцо снесено, глухарка уже не остается до конца каждодневнаго тока, а улетаетъ къ своему гибзду гораздо раньше и кормится, чъмъ придется, около него. Показанія о времени и порядкі кладки ящъ расходятся. Л. П. Сабанъевъ говоритъ, что глухарка несется ежедневно раинимъ утромъ, г. Ушковъ наблюдалъ, что глухарка несется вечеромъ между 5 и 6 часами и притомъ черезъ день. Послъднее подтверждается наблюденіями г. Хватова надъ глухарями, содержимыми въ неволъ. Я безусловно склоняюсь на сторону г. Ушкова. Во 1-хъ, если глухарка несется ежедневно раннимъ утромъ, то когда же ей посъщать тока? Во 2-хъ, г. Ушковъ совершенно основательно замъчаетъ, что отсутствіе глухарокъ на вечернихъ токахъ говоритъ въ пользу того, что яйца нормально сносятся вечеромъ. Но если послъднее какъ правило не можетъ считаться доказаннымъ, за то въ пользу несенія ящъ черезъ день говоритъ и время, когда глухарки садятся на яйца, - конецъ апръля: если бы яйца сносились каждый день, глухарки могли бы начинать высиживание по крайней мфрф недфлею раньше.

Гнѣздо свое глухарка помѣщаетъ въ самыхъ различныхъ мѣстахъ: подлѣ куста и даже въ кустѣ, около ствола дерева, между окружающими его кустами черпики, въ кучѣ хвороста, подъ упавшимъ деревомъ и даже на открытой мѣстности, среди густой травяной заросли. Но въ низкихъ мѣстахъ для гнѣзда всегда выбирается болѣе возвышенный участокъ, а никакъ не впадина, чтобы яйца не страдали отъ сырости. Выборъ мѣста, въ виду ранняго гиѣздованія, для глухарки вовсе не затруднителенъ: она останавливается на возвышенныхъ участкахъ совершенно естественно, какъ на ранѣе оголяющихся отъ

снѣга и болѣе сухихъ. Особенно любитъ глухарка гнѣздиться подъ низкими нависшими вѣтвями ели, или въ частомъ молодомъ ельникѣ. Въ чернолѣсьѣ она выбираетъ самые глухіе участки лѣса, гдѣ густой нодлѣсокъ изъ кустарныхъ и древесныхъ породъ дѣлаетъ лѣсъ почти непроходимымъ. Кромѣ того гиѣздится здѣсь въ болѣе сухихъ частяхъ оленника и вязовника, гдѣ среди кочекъ растутъ густые пучки некошенной и нетравленной травы. "Въ первомъ случаѣ гнѣздо находится въ какомъ-нибудъ густомъ кустѣ липы или жимолости, край валежинъ; во второмъ, на болѣе сухой кочкѣ, въ раскидистомъ кустѣ ольхи, ивы, или у стволины ольхи и вяза, въ густой травѣ" (Разевигъ).

Гивздо всегда номвицается близъ вырубовъ, полянъ и прогадинъ, но инкогда не бываетъ на самой опушкв, а всегда въ ивкоторомъ разстояни отъ нея. Только въ видв исключения на крайнемъ свверномъ предвлв древесной растительности глухарки гивздятся на ровныхъ минетыхъ болотахъ.

Количество ящъ, сносимое глухаркой, весьма различно: обыкновенно 6 - 8, рѣдко 9 п въ видѣ исключенія 10; но въ западной Европѣ не разъ наблюдались у глухарокъ отъ 12 до 16 ящъ, несмотря на то, что западно-европейскій глухарь въ среднемъ мельче нашего. Сходя съ гивада, глухарка очень старательно прикрываетъ яйца ветошью, какъ для того, чтобы онф не остыли, такъ и для того, чтобы скрыть ихъ. Привязанность самки къ яйцамъ удивительна и тъмъ больше, чъмъ дольше она сидитъ на нихъ. Къ концу насиживания она не только подпускаеть къ себъ въ упоръ и позволяеть трогать палочкой, но даже пногда дается въ руки. Во время дъсныхъ пожаровъ, столь частыхъ въ восточной Россіи въ весеннее время, глухарки часто погибаютъ на своихъ гитвадахъ, охваченныя пламенемъ, или по крайней мъръ сильно обгораютъ. "Видя грозящую опасность, -- говоритъ г. Ушковъ, – глухарка до послъдней минуты оберегаетъ свое гиъздо и запипидаетъ отъ гибели яйца; она принимаетъ оборонительныя мѣры: сгребаетъ ногами ветошь вокругъ гизада и машетъ на приближающееся пламя крыльями. Когда пожаръ легкій, глухаркъ почти всегда удается этимъ способомъ спасти свое потомство, но въ сильные пожары такая защита, конечно, безполезна. Бросаетъ свое гитадо глухарка тольку уже въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. Мить не разъ приходилось быть свидателемъ самоотверженія глухарокъ; не разъ доводилось спасать ихъ гивзда отъ огня, случалось также находить гивзда и съ полопавишмися яйцами". Но темъ необъяснимъе, при такой привязанности къ яйцамъ, то, что глухарка легко бросаетъ только что выведшихся птенцовъ. Ф. К. Лоренцъ разсказываетъ питересный случай, что одна глухарка позволяла ему день за день наблюдать за собою, когда сидъла на гивздъ, и сразу бросила гивздо при его приближени, улетъвъ отъ только что вывединихся птенцовъ.

Янца у глухарки малы сравнительно съ величиной птицы, — съ куриныя, грязно-желтаго основного цвъта, съ свътло-бурыми крупными и мелкими нестринками, болъе густо собранными на остромъ концъ.

Ръдко число птенцовъ соотвътствуетъ числу ящиъ: чаще однимъ бываетъ менъе.

Самчики съ самаго начала отличаются отъ самочекъ своими итъсколько болфе крупными размърами, болфе толстой головкой и болфе темной окраской. Пока глухарята малы, они растутъ крайне медленно, но достигнувъ величины съ перепелку, начинаютъ расти очень быстро и въ концѣ іюня самцы становятся уже величиною съ бѣлую куропатку. При этомъ половая разница вырисовывается все разче, хотя птенцы еще сохраняютъ свой первый нарядъ. Спустя немного дней глухари становятся величиною съ крупную тетерьку и ереди перьевъ зоба теперь у нихъ пробиваются блестящія металлически-зеленыя перья окончательнаго наряда. Точно такъ же перья взрослаго наряда появляются на верхней части спины, на илечахъ, среди верхнихъ кроющихъ крыла, второстепенныхъ маховыхъ и т. д. Линька идетъ очень быстро и въ концѣ іюля глухаренокъ самецъ, достигая величины съ взрослую глухарку, уже одътъ почти въ готовый взрослый нарядъ, съ хвостомъ нормальной длины; только кой-гдф на тълъ, и особенно на головъ и на шеъ еще сохраняются перья молодого наряда. Къ серединъ августа отъ послъдняго остается очень немного, въ концъ этого мѣсяца — только отдъльныя перышки, во второй половинѣ сентября смѣна наряда оканчивается и молодой глухарь узнается, кромѣ сравнительно малой величины, по не вполнъ развитому оперенію плюсны п кой-какимъ другимъ признакамъ. Глухарки вырастаютъ до величины не старыхъ, но взрослыхъ къ концу іюля и оканчиваютъ линьку итьсколько раньше самцовъ.

Глухарята выводятся въ теченіе сутокъ и могутъ бъгать, какъ только обсохнутъ. Повидимому, разъ взявшись за воспитание дътей, матка привязывается къ нимъ съ такою же силой, какъ была привязана къ яйцамъ, и ревниво оберегаетъ ихъ пока они не окрѣпнутъ и не подрастутъ настолько, что перестанутъ нуждаться въ помощи матери. Первыя два-три дня она держится съ ними около гифзда, но нотомъ переходитъ въ густой лъсъ возлъ съчей, болотъ, ръчекъ и покосовъ. Утромъ и вечеромъ она выводитъ здъсь дътей для кормежки на болъе открытыя мъста, а въ жаръ держится съ ними на опушкѣ, гдѣ вся семья роется или въ сухой землѣ, или въ истлѣвшей древесинт поваленных деревьевъ. Такъ какъ каждый птенчикъ вырываетъ для себя особую ямку, по числу послъднихъ можно безошибочно опредълить число глухарятъ въ выводкъ; если же этого нельзя, то во всякомъ случать присутствіе ямокъ и особенно разрытыхъ муравыныхъ кучъ безошибочно указываетъ на присутствіе глухаринаго выводка. Держась среди сучьевъ, пней и густой травы, глухарята, съ одной стороны, имъютъ здъсь обильный кормъ, съ другой,—надежное мъсто для того, чтобы спрятаться отъ хищныхъ птицъ. Питаются они въ это время почти исключительно животнымъ кормомъ: насъкомыя, ихъ личинки, червячки, слизняки и особенно муравыныя яйца-воть что составляеть главную пищу глухарять; кромф

того, они кормятся также молодыми сочными стебельками разныхъ травъ, и это отчасти замъняетъ имъ интъе.

Первые дней 9—10 глухарята держатся исключительно на земль, но съ этого времени начинають перепархивать и въ очень короткое время становятся уже настолько крѣнкими, что могутъ даже взлетать и садиться на деревья. По мѣрѣ того какъ они растутъ, они разбѣгаются все на большее и большее разстояніе, по вспугнутый выводокъ летитъ за маткой, пока хватитъ силъ, послѣ чего глухарята или садятся на деревья или надаютъ на землю. Здѣсь они сидятъ или лежатъ, забивнись гдѣ можно, и долгое время совсѣмъ не подаютъ голоса; не откликаются даже маткѣ, если та, убъдивнись въ безопасности, начинаетъ сзывать ихъ. Обыкновенно матка, подиятая съ выводкомъ, описываетъ полукругъ относительно того мѣста, гдѣ была съ дѣтьми, и когда все уснокоится, сзываетъ дѣтей на то же мѣсто, откуда была поднята. Но послѣ этого она не остается здѣсь, а немедленно уводитъ дѣтей въ болѣе надежное прикрытіе.

Къ Петрову дню вспугнутые глухарята уже обыкновенно взлетаютъ на деревья, а въ половинъ іюля они даже на ночь улетаютъ въ высокоствольный лъсъ и здъсь ночуютъ, чаще всего занявъ одно дерево, но разм'ястивнись по разнымъ сучьямъ. Вм'яст'я съ т'ямъ самая тяжелая пора для выводковъ, можно сказать, миновала, такъ какъ пока глухарята были настолько малы, что должны были ночевать на земль, они становились очень легкой добычей всъхъ наземныхъ хищниковъ и особенно лисицъ. Теперь же, хотя имъ и угрожаютъ разныя совы и куницы, у нихъ все-таки больше возможности спрятаться отъ своихъ непріятелей, да и сидятъ они врозь, такъ что гибнетъ не весь найденный хиндинкомъ выводокъ, а только лишь тотъ или другой глухареновъ. За глухариными выводками охотится даже медвѣдь, при чемъ, по свидътельству Черкасова, послъдній не оставляетъ глухарятъ въ покот даже на деревьяхъ: замътивъ памокшихъ послів дождя глухарять, которые выбираются на открытые сучья для просунки, онъ просто-напросто стряхиваетъ ихъ отсюда.

Въ концѣ іюля глухарята становятся уже настолько самостоятельными, что ихъ не ръдкость встрѣтить въ иѣсколькихъ десяткахъ саженей отъ матки. Однако какъ теперь, такъ и поздиѣе, въ августѣ, когда молодые перебираются съ маткой на брусничники, выводки всетаки должны считаться перазбившимися. Выводками же глухари вылетаютъ на лиственникъ (въ началѣ сентября), но тутъ выводки разбиваются, и съ этого времени собственно начинается осенній періодъ въ жизни описываемыхъ итицъ. Первыми отдъляются всегда глухари, а за инми разбиваются и глухарки.

Инща глухарять измѣняется довольно сильно въ разные лѣтніе мѣсяцы. Какъ мы видѣли, только что вывединіеся птенчики кормятся предпочтительно животнымъ кормомъ; если въ это время они и ѣдятъ сочные корешки и стебельки, то это скорѣе замѣняетъ имъ штье. Но въ іюнѣ начинаютъ посиѣвать разныя ягоды—земляника, чер-

ника—и съ этихъ поръ глухарята пачинаютъ усиленно кормиться ими. Тамъ, гдъ иътъ лъсныхъ покосовъ, ягодный кормъ является ихъ преимущественной инщей до августа включительно: мъняется только составъ корма, а не его характеръ. Наконецъ, въ августъ въ средней и съверной Россіи, вездъ, гдъ есть осина, глухари очень любятъ летать въ осининки и кормиться вялымъ осиновымъ листомъ. Въ восточной Россіи осину замъняетъ лиственница, хвоя которой, будучи тронута морозомъ, составляетъ положительное лакомство для глухарей. Наконецъ, въ разныхъ мъстахъ замъчены вылеты глухарей по зарямъ на кормежку на овсяныя жнивья и озими, находящияся въ лъсу или у его края, но это конечно имъстъ паименьшее значене въ жизии глухарей, настолько эти вылеты ръдки и случайны всюду за исключенемъ восточной Россіи. Да и тамъ глухари летаютъ на жинвья и озими поздигье—осенью, къ чему мы еще вернемся.

Этотъ очеркъ образа жизни глухариныхъ выводковъ остается дополнить только свъдъніями отпосительно черполъсья. Нервое время глухарята держатся здісь около гитізда, въ ненастиую погоду почти не выл'євая изъ-подъ крыла матери, а въ хороную ото́тая отъ гивада всего на ивсколько десятковъ саженъ. Черевъ недблю, когда у нихъ начиутъ пробиваться перышки, они экскурспруютъ уже дальше, но все-таки не выходятъ изъ чащи, и все время остаются на животномъ кормъ. Во второй половинъ йоня, когда молодые начиутъ перепархивать, они чаще показываются на опушкахъ потныхъ прогадинъ и лужаекъ, гдв нахолять себф въ густой травф болфе насфкомыхъ, нежели въ чащъ лъса; однако далеко отъ опушки не отходятъ. Только въ концѣ іюня, когда глухарята начнутъ уже довольно порядочно летать, и когда выфстф съ тъмъ начинаетъ созръвать земляника, они оставляють чащу лъса, и только на почь и въ самую жару уходять на его опушку. Въ это время они совершенно переходять съ животнаго корма на растительный, преимущественно ягодный. "Въ этотъ періодъ они очень любять купаться въ пескъ и пыли и усердно разыскиваютъ на полянахъ сухія кочки, а за неимѣніемъ ихъ и песка, купаются даже въ трухъ сгнившей валежины. — Покормившись и накупавшись въ пыли, молодые любятъ грѣться на утреннемъ солнышкѣ, лежа на боку гдѣ-нибудь подъ кустомъ, на солнцепекѣ, перебирая и очищая свои перышки. Когда станетъ жарко, часамъ къ девяти-десяти утра, они ищутъ прохлады, уходятъ въ чащу и, пританвшись въ густой заросли, дремлять, пока не спадеть полуденный жаръ. Подъ вечеръ, часовъ въ шесть, они снова выходятъ на луга и съчи, кормятся до поздней зари, а тогда, подбирая на пути ягодки, направляются въ лѣсъ, гдѣ, когда стемнѣетъ, размѣщаются на сосѣднихъ деревьяхъ, и стоя на одной ногъ, спрятавъ головку подъ крылышко, спятъ до ранней зари" (Разевигъ). Вмъстъ съ началомъ сънокоса глухариные выводки оставляють описанныя мъста и переселяются или въ травянистыя сфчи, или въ густые молодняки, гдф также успъли созръть ягоды, обезпечивающія имъ кормъ. Если здъсь не пасется скоть, въ такомъ случав глухарята остаются въ такихъ мъстахъ до конца августа, въ противномъ случав перемъщаются въ высокоствольные лъса, выбирая здъсь мъста болъе низкія, травянистыя, съ густымъ подлъскомъ.

Что касается старыхъ глухарокъ, то они начинаютъ перелинивать съ конца йоня и оканчиваютъ линьку къ концу сентября, т.-е. къ тому времени, когда выводки уже успъютъ разбиться.

Теперь намъ надо возвратиться къ глухарямъ-токовикамъ. Вмфств съ окончаніемъ тока, исхудалые и измученные глухари улетаютъ въ лъсныя кръпи, выбираютъ для своего жительства сырыя и глухія мъста высокоствольнаго лъса и здъсь предаются продолжительному отдыху и возстановленію потраченных в силъ. Въ половинъ іюня они начинаютъ линять и съ этого времени уходятъ еще глубже въ лѣсъ, етановясь на много недѣль совершенно наземной птицей. Чѣмъ больше валежника, поваленныхъ бурей деревьевъ, особенно со свъжей вершиной, и т. п., тъмъ привольнъе живется здъсь глухарю. Если случайно на него наткнется здѣсь собака, онъ не взлетаетъ, а бѣжитъ. чтобы спрятаться подъ кучей хвороста или вершиной упавшаго дерева. Надъясь на прочность такого убъжища, подпускаетъ къ себъ почти въ упоръ и выдерживаетъ продолжительную стойку собаки. Но если взлетаетъ, то съ шумомъ и съ такой стремительностью, что озадаченному охотнику ничего не стоитъ промахнуться. Позднъе, въ іюль, когда линька подвинулась уже далеко и новыя перья успъли окрѣпнуть, глухарь не такъ настойчиво придерживается крѣпей и начинаетъ выходить на лъсныя поляны, гари и съчи, гдъ въ изобили им вется ягодный кормъ и гдв также представляется возможность найти муравыную кучу и выкупаться въ пыли. Зам'ятивъ что-либо подозрительное на такомъ открытомъ мѣстѣ, глухарь взлетаетъ на ближайшее дерево и осматривается; если его подозрѣнія оправдались или по крайней мфрф не разсфиваются, въ такомъ случаф улетаетъ въ глубь лфса.

Я совершенно не понимаю, какимъ образомъ Л. И. Сабанѣевъ могъ опредълить какъ время окончанія линьки старыхъ глухарей іюль мѣсяцъ: пхъ линька оканчивается въ септябрѣ, приблизительно въ одно время съ окончаніемъ линьки глухарятъ. Съ августа глухари, подобно выводкамъ, начинаютъ посѣщать осинники и брусничники и иногда держатся на брусничникахъ до зимы, только въ сентябрѣ, тамъ, гдѣ есть лиственница, обязательно перебираясь сюда для кормежки "закисшимъ" игольникомъ.

Вотъ незамысловатый въ общемъ, по разнообразный въ мелочахъ образъ жизни глухарей и глухариныхъ выводковъ въ теченіе лѣта. Не трудно видѣть, что два фактора опредѣляютъ собою эту группу періодическихъ явленій въ жизни описываемыхъ птицъ: 1) пеобходимость укрыться отъ враговъ и 2) потребность въ изобильномъ кормъ. И то и другое одинаково важно какъ для молодыхъ, такъ и для старыхъ итицъ, и отсюда общее сходетво въ періодическихъ явленіяхъ ихъ лѣтьяго образа жизни.

Эвтияя охота за глухарями сводится къ охотъ за глухариными выводками съ лягавой и на маику, вообще за глухарями по осиннику. Охоту съ лягавой начинаютъ съ Петрова дия, но въ это время глухарята еще малы и охота эта не можетъ доставить инкакого удовольствія. Настоящее время для нея вторая половина іюля и первая августа; поздиве глухарята уже настолько велики и, главное, настолько постоянно держатся на деревьяхъ, особенно въ осинникъ, что охота съ лягавой собакой за ними естественно прекращается.

"При этой охотъ, — говоритъ г. Унковъ, — какъ и при всякой другой подобной, необходима прежде всего хорошая собака и затъмъ знакомство съ мъстностью и съ привычками дичи. Кромъ того не слъдуетъ сбиватъ собаку съ разъ выбраннаго ею направления; не должно торопить ее на поискъ, водкъ и стойкъ. Охотникъ обязанъ внимательно слъдитъ за тъмъ, какъ ведетъ собака: въ одномъ ли прямомъ направлении, или кругами, т.-е. постоянно возвращаясь на старый свой слъдъ. Въ первомъ случать надо предоставлять собакъ полную свободу дъйствій; во второмъ — ее необходимо торопить, нотому что на кругахъ она идетъ "водкой" по слъду стараго глухаря, которому лънь подняться и который старается спутатъ, какъ охотника, такъ и собаку, заставляя ихъ итъсколько разъ возвращаться къ одному и тому же мъсту; спутавъ ихъ такимъ образомъ, онъ поднимается виъ выстръла. Эта хитрость часто удается глухарю, въ особенности если онъ имъетъ дъло съ молодой собакой и неопытнымъ охотникомъ.

"Нужно терпъливо выжидать вылета дичи и всегда держать на готовъ ружье, на случай внезапиаго ея вылета. Подиявшуюся дичь слъдуетъ отпускать на разстояніе върнаго выстръла, по лишь если то позволяетъ мъстность; тамъ, гдъ растительность густая и частая, напримъръ, въ кустарникахъ и миарникахъ, нельзя выжидать, когда птица покажется гдъ-нибудь на прогалинъ, а нужно стрълять въ то мъсто, гдъ слышится хлопанье крыльевъ взлетающей дичи, хотя бы самой ея и не было видио. Только при этомъ непремънно нужна охотничья сметливость, т.-е. охотникъ долженъ умъть быстро и върно прицъливаться, быстро и върно опредълять то мъсто, гдъ происходитъ хлопанье крыльевъ, долженъ знать, какая дичь на какой вышинъ взлетаетъ отъ земли. Не каждый такой выстрълъ будетъ удаченъ, но все же менъе шансовъ пропустить добычу, чъмъ при выжидании ея вылета на чистое мъсто, когда она будетъ уже виъ выстръла.

"Не должно позволять собакт гнаться за поднявшейся дичью и бросаться къ убитой, потому что выводокъ поднимается иногда не разомъ; собака же, бросаясь за дичью, пугаетъ выводокъ, поднимаетъ его зря, вслъдствіе чего охотникъ, не приготовившись къ выстрълу, дълаетъ промахи или отпускаетъ дичь безъ выстръла.

"Не слѣдуетъ также и охотнику торопиться подходить къ убитой птицѣ съ разряженнымъ ружьемъ; часто птица только оглушена бываетъ выстрѣломъ и при приближении человѣка приходитъ въ себя и мгновенно улетаетъ. Выпустивши зарядъ, слѣдуетъ прежде всего

замѣнить его новымъ, а потомъ идти къ добычѣ. Вообще хладнокровіе одно изъ наиболѣе вѣрныхъ средствъ, способствующихъ удачѣ какой бы то ни было охоты".

Охота на манку является собственно не охотой, а промысломъ, и такъ какъ легка и добычлива, то очень распространена между промышленниками.

"Тутъ не требуется хорошо натасканная собака, потому что выводокъ отыщетъ и всякая дворняжка; что она разгонитъ его-это не бѣда; кто охотится на подманку, тотъ умѣетъ подманивать молодыхъ, подражая ихъ голосу, и легко собираетъ къ себф выводокъ. Дфлается это такъ: на томъ мъстъ, съ котораго былъ поднятъ выводокъ, дълается шалашъ изъ сучьевъ, въ который садится промышленникъ или охотникъ и выжидаетъ нѣкоторое время, потому что тотчасъ послѣ перемъщения выводка подманивать его не годится. Охотнику въ шалашѣ приходится въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вести ожесточенную борьбу съ слъпнями, мошками и комарами, буквально облъпляющими человъка; но для привычнаго промышленника такое неудобство ни почемъ, въ особенности въ ожидании върной добычи. Онъ раскуритъ трубочку, иногда затъетъ курево и черезъ полчаса приступаетъ уже къ дълу, т.-е. начинаетъ пикать. Первой откликается на манку глухарка-мать, сначала тихо и недов рчиво, потомъ клохтанье ея усиливается, и она начинаетъ перелетать тревожно съ дерева на дерево, приближаясь къ шалашу; промышленникъ, замфтивъ эти перелсты, пикаеть жалобиве и жалобиве, такъ что глухарка, слыша эти жалобные "піу, піу", забываетъ свою недов врчивость, сп вша на помощь къ своему страждущему дътенышу, подлетаетъ почти къ самому шалашу, садится на дерево, иногда на землю и, поднявъ голову кверху, тихо и протяжно клохчетъ "ко-о", "ко-о". Тутъ изъ шалаша раздается выстрѣлъ, и глухарка падаетъ жертвой своего чадолюбія. Впрочемъ, не каждая глухарка довфрчиво идетъ на манку; иногда промышленникъ, несмотря на свое мастерское подражание голосу птенцовъ, не въ состояніи бываетъ подманить ее на върный выстрѣлъ; недовърчивая глухарка садится на дерево внъ выстръла и тихо клохчетъ, или же втихомолку подходить къ шалашу и, видя въ немъ промышленника, поспъшно улетаетъ. Такая матка ръдко подаетъ голосъ даже и на дъйствительный призывъ своихъ дътей, а также подходитъ къ нимъ молча, и, собравъ ихъ, уходитъ на другое мѣсто.

"Убивъ мать, промышленникъ начинаетъ подманивать дѣтей, пикая тѣмъ же голосомъ. Дѣти обыкновенно долго не откликаются, но слыша неумолчное пиканье, опи, одинъ за другимъ, начинаютъ также пикать въ отвѣтъ, а потомъ и подходятъ къ шалашу. Рѣдкій промышленникъ уходитъ, не уничтоживъ весь выводокъ.

"По мъръ того, какъ глухарята вырастаютъ, голоса ихъ дълаются грубъе и сиповатъе. Промышленники принимаютъ это въ соображение и тоже измъняютъ свой голосъ, сообразио съ возрастомъ выводка. Они такъ искусно подражаютъ пиканью, что даже самый

опытный охотникъ не въ состояни отличить голоса опытнаго, хорошаго манильщика отъ голоса глухаренка. Охота на манку кончается въ первыхъ числахъ августа; она содъйствуетъ истребленію дичи, и потому ни одинъ истинный охотникъ, сознавши вредъ этой охоты, не станетъ заниматься ею. Она губитъ неминуемо весь выводокъ, если онъ даже перебитъ и не весь, потому что довольно убить одну матку (а она стръляется прежде всъхъ), чтобы оспротълый выводокъ сдълался жертвой хишныхъ птицъ; кромъ того, предоставленный себъ, онъ вымираетъ съ голоду и холоду".

Что касается охоты въ осинникъ, то она производится не лътомъ собственно, а во время переходное между лътомъ и осенью, со 2-го августа. Основывается она на томъ, что глухари въ это время любятъ летать въ осинникъ и глодать начинающій уже въ это время желтъть листъ. Новидимому, эти листья производятъ на глухарей опьяняющее дъйствіе, такъ какъ наъвшіеся ими глухари сидятъ на деревьяхъ смирно и безъ особаго труда подпускаютъ къ себъ охотника на ружейный выстрълъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ОСЕНЬ и ЗИМА.

Осенняя жизнь глухарей.—Осеннее токованіе.—Осеннія перекочевки.—Зимняя жизнь.—Осенняя и зимняя охота.—Промысловое добываніе глухарей.—Подсчетъ ежегодно добываемыхъ глухарей.—Такъ назыв. "шахровый" и "раменный" глухарь.—Глухарь въ неволъ.

Итакъ, мы начинаемъ описаніе осенняго образа жизни глухаря съ сентября, когда оканчивается линька этихъ птицъ, и когда разбиваются выводки. Конечно, ръзкой границы между лътомъ и осенью установить нельзя, но до извъстной степени она устанавливается безъ труда. Въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ есть лиственница, начало осенняго періода удачно опредѣляется именно вылетомъ глухарей на лиственники, хвоя которыхъ, тронутая морозомъ, въ продолжение и всколькихъ недъль составляетъ ихъ почти исключительный кормъ. Глухари настолько любять хвою лиственницы, что тамъ, гдф растуть эти деревья, они не летаютъ на осинники, тъмъ болъе, что лиственница рано трогается морозомъ, особенно въ восточной Россіи. Само собою разум вется, что въ разные годы время "закисанія" игольника на лиственницѣ измѣняется въ зависимости отъ того, когда появляется иней, но глухарь зорко слъдитъ за тъмъ, чтобы не пропустить лакомаго блюда; онъ уже заблаговременно навъдывается, какъ, т.-е. легко или еще трудно, выщипывается хвоя, и если легко, то немедленно же начинаетъ свои вылеты сюда. Ежедневно глухарь вылетаетъ на лиственники два раза: утромъ, передъ восходомъ солнца, и вечеромъ, часа за три до его захода. Иногда, именно въ пасмурные и дождливые дни, глухарь цѣлый день остается въ лиственникъ и почти не

переставая треплеть хвою. Точно такъ же днями просиживаетъ на лиственникъ, когда инеи выпадаютъ часто, и хвоя быстро закисаетъ. Зато, тогда какъ при обыкновенныхъ условіяхъ глухарь посъщаетъ лиственникъ въ продолженіи трехъ-четырехъ недъль, при частыхъ инеяхъ этотъ періодъ сокращается вдвое.

Что касается количества глухарей, вылетающих на лиственникъ, то оно зависитъ какъ вообще отъ численности птицы, такъ и отъ того, насколько часты или рѣдки лиственницы въ извѣстномъ районѣ. Повидимому, глухари предпринимаютъ довольно значительныя по размѣрамъ странствованія, чтобы найти любимый кормъ, и этимъ, вѣроятно, объясняется то, что въ иѣкоторыхъ мѣстахъ (напр., въ Пермской губ.) ихъ наблюдали — глухарокъ стадами болѣе чѣмъ въ 100 штукъ, глухарей — штукъ въ 70. Но съ другой стороны, они встрѣчаются и отдѣльными стаями, и штукъ по 5—10 вмѣстѣ, т.-е. еще не разбившимися выводками. Тамъ, гдѣ сплошныхъ лиственниковъ нѣтъ, глухари посѣщаютъ отдѣльныя лиственныя деревья, и оставляютъ ихъ не раньше, какъ когда хвоя съ нихъ спадетъ совершенно, т.-е. въ началѣ октября. Но къ концу этого періода они вылетаютъ сюда ненадолго и кормятся преимущественно ягодами брусники и клюквы.

Въ сентябръ же происходитъ такъ называемое осеннее токовапіе. Съ вижшней стороны оно почти ничжиъ не отличается отъ весенняго, т.-е. глухари токуютъ по утрамъ на деревьяхъ (иногда, впрочемъ, и на землъ), сопровождая свои различныя эволюции характерной пъсней, при чемъ тутъ же присутствуютъ и глухарки. Но, во-1-хъ, количество токующихъ осенью глухарей очень не велико, во-2-хъ, спариванья самцовъ съ самками не бываетъ. Глухарь начинаетъ пграть за часъ до восхода солнца и, поигравъ немного, перестаетъ; затѣмъ съ восходомъ солнца начинаетъ играть снова и иногда играетъ очень долго, до $9^{1}/_{2}$ и даже до 10 часовъ утра. Утверждать, какъ это дълаетъ Л. П. Сабанъевъ, что осенью токуютъ только молодые глухари, мы не можемъ, но весьма въроятно, что большая часть осеннихъ токовиковъ двулътки, не особенно истомленные въ періодъ весенняго токованія, очень окрыпнувшіе и вполит развившіеся ко второй осени въ своей жизни. Иногда осеннее токование идетъ слабо. пгру чуть слышно даже на близкомъ разстоянін; въ другихъ случаяхъ игра не уступаетъ въ своей силъ весенней, и токующій гдухарь выдерживаетъ ифсколько пеудачныхъ выстрфловъ, копечно, если охотникъ принимаетъ тѣ же предосторожности, съ какими стрѣляетъ

Хотя глухарь безусловно лівсная птица, но осенью голодъ заставляєть его выдетать на жнивья и озими, находящіяся въ лівсу или около его края, или когда хлівоть сложенть въ скирды тутъ же на

^{*)} По словамъ г. Ушкова, ему приходилось кромѣ того слышать токующихъ глухарей между 21-мъ іюлемъ и 2-мъ августомъ. Это, такъ сказать, "лѣтнее токованіе" совершенно аномально и никоимъ образомъ не связывается съ осеннимъ; напротивъ, его скорѣе можно отнести къ весеннему.

полъ, то на послъдніе. На скирды глухари летають даже зимою, но обыкновенно послъ періода кормленія хвоею лиственницъ глухари переходять еще разъ на ягоду, именно на клюкву и бруснику, и довольствуются этимъ кормомъ, пока его не запесеть снъгомъ.

Будучи осъдлою птицей, глухарь только кой-гдъ предпринимаеть перекочевки и то обыкновенно въ очень небольшихъ предълахъ. Обычное передвижение глухарей къ началу зимы ограничивается переселеніемъ съ горъ въ низменности; тамъ же, гдб горъ ибтъ, глухари въ разное время зимы держатся въ разныхъ участкахъ лъсной площади. Конечно, главивйшая причина этихъ переселеній — поиски за кормомъ. По крайней мфрф, глухарь спускается съ горъ въ низменные хвойные лъса потому, что здъсь растетъ ель и пихта, хвоя которыхъ составляеть ихъ главный зимній кормъ. Тамъ, гдф ифтъ этихъ деревьевъ, глухарь перебирается на зиму изъ рѣдколѣсья въ частые молодые сосняки, гдв ему хотя твмъ лучше, что теплъе. Но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ перекочевки глухаря весьма загадочны. Такъ, по словамъ Л. П. Сабанѣева, изъ Краспоуфимскаго у., Пермской губ., глухари къ октябрю перекочевываютъ на восточный склонъ, въ Екатеринбургскій убздъ, и въ концф зимы улетаютъ обратно, такъ какъ первая мъстность представляетъ гораздо больния удобства для ихъ лътняго мъстопребыванія и относительно большую безопасность. То же самое замъчается на съверномъ Уралъ, гдъ, по словамъ Воропая, глухари для перелета "за камень", т.-е. за Уральскій хребеть, собираются въ стаи штукъ до 150. Наконецъ, и въ низменныхъ мфстахъ, напр., въ Мензелинскомъ и Елабужскомъ уу., глухари, по свидътельству М. Н. Богданова, также улетаютъ за изсколько десятковъ верстъ отъ своего лътняго мъстопребыванія. Едва ли будетъ ошибкой признать, что для каждой мъстности есть своя частная причина перекочевки глухарей, и было бы односторонне вст перекочевки приписывать только недостатку корма. Иногда, въроятно, переселение вызывается обиліемъ снѣга или направленіемъ господствующаго вѣтра. Какъ ни крѣпокъ глухарь, а на зиму ему нужно мѣстечко потеплѣе, т.-е. или частый, густой лъсъ, или лъсъ на защищенной отъ вътра сторон в горнаго хребта. Въ средней Россіи глухари любятъ держаться зимою въ лѣсныхъ оврагахъ, гдѣ есть незамерзающая рѣчушка или ручеекъ: здѣсь и теплѣе, и корма больше, такъ какъ здѣсь обыкновенно растетъ рябина и калина, ягоды которыхъ очень любимы глухаремъ. Кромъ того, эти птицы кормятся можжевеловыми ягодами, по словамъ Сабанъева, даже опавшими кедровыми оръхами, но все-таки ихъ главную пищу составляетъ хвоя и верхушечныя почки разныхъ хвойныхъ деревьевъ. Послѣднее обстоятельство заставляетъ считать глухаря птицею вредной для лѣсоводства, но у насъ, при отсутствін сколько-нибудь правильнаго лъсного хозяйства и при обиліи лъса, конечно, о такомъ вредъ говорить нечего.

Вмѣстѣ съ выпаденіемъ снѣга и исчезновеніемъ ягоднаго корма, начинается зимняя жизнь глухарей, отличающаяся своимъ однообра-

зіємъ и монотонностью. Въ это время года описываемая птина держится или поодиночкѣ, или небольшими стайками въ 3—5, рѣдко болѣе особей. Выбравши себѣ какое-нибудь мѣсто, глухари цѣлыми недѣлями остаются здѣсь. День они проводять въ лѣсной чащѣ, большею частью на землѣ, подъ нижними сучьями густыхъ елей и сосенъ, но утромъ и вечеромъ вылетаютъ изъ чащи на опушки, и въ сумерки вовсе не рѣдкость видѣть этихъ птицъ сидящими на верхушкахъ высокихъ елей. Въ сильные морозы и мятели глухари забиваются въ снѣгъ, гдѣ имъ по крайней мѣрѣ тепло, хотя и голодно, ѝ либо не вылетаютъ совсѣмъ, либо вылетаютъ на самое короткое время. На ночь же опи почти всегда взлетаютъ на деревья и ночуютъ здѣсь, помѣстившись на сукѣ поближе къ стволу.

Вмѣстѣ съ окончаніемъ зимы, т.-е. въ февралѣ, глухари выбираются изъ лѣсной чащи и переселяются опять въ рѣдколѣсье, пососѣдству съ мѣстами будущихъ токовъ. Какъ только сильнѣе начнетъ пригрѣвать солнце, старые самцы начинаютъ навѣдываться на токовище, сначала присаживаясь на деревья, а потомъ слетаютъ на землю и ходятъ здѣсь, чертя крыльями по насту. Первое время совсѣмъ не подаютъ голоса, затѣмъ начинаютъ текать и мало-по-малу входятъ въ полный жизни весенній періодъ, съ описанія котораго мы начали эту монографію.

Дополняя сказанное объ осеннемъ и зимнемъ образѣ жизни глухаря свѣдѣніями о его жизни въ чернолѣсьѣ, мы получаемъ еще болѣе однообразную картину. Въ сентябрѣ и здѣсь выводки разбиваются, при чемъ наиболѣе долго держатся вмѣстѣ самочки. Въ это время поспѣваютъ жолуди и глухари теперь чаще, чѣмъ когда-либо, попадаются въ дубовыхъ насажденіяхъ. Охотнѣе всего они ѣдятъ полузрѣлые жолуди и потому сами обрываютъ ихъ съ вѣтокъ, а не клюютъ опавшихъ. Однако изъ этого не должно заключать, что глухари въ такомъ же большомъ количествѣ переселяются въ дубовые лѣса, какъ въ осинники: ни чуть не бывало; только осенью ихъ въ дубовыхъ лѣсахъ больше, чѣмъ въ другое время, когда они встрѣчаются здѣсь совсѣмъ рѣдко.

Въ половинъ октября, съ наступленіемъ морозовъ и даже выпаденіемъ перваго снъга, глухари начинаютъ стадиться, собираясь небольшими обществами, штукъ по 6—8, и переселяются въ хвойныя и хвойно-лиственныя насажденія, всюду, гдъ есть таковыя, а тамъ, гдъ ихъ нътъ, забираются въ сплошной лиственный лѣсъ съ густымъ подлѣскомъ, близъ олешниковъ. Перекочевокъ почти не совершаютъ и потому найти ихъ здѣсь можно только случайно. Въ первомъ мѣстѣ они кормятся хвоею, преимущественно сосновою, во второмъ—древесными почками лиственныхъ деревьевъ.

Несмотря на величину и силу глухаря, у него очень много враговъ, не считая даже промышленника. Изъ птицъ на глухарей нападаютъ филины и даже ястреба-тетеревятники, особенно въ пору токованія, изъ млекопитающихъ—куницы, лиса, соболь, медвѣдь и даже

горностан. Медвъди и лисы преимущественно довять линочихъ глухарей и глухарять на землъ, куницы и соболь нападаютъ на нихъ сонныхъ на деревьяхъ. Что касается горностая, то этотъ маленькій хищинкъ, бросаясь на глухаря, перегрызаетъ ему или горло, или затылокъ, при чемъ сильная птица успъваетъ взлетъть иногда на весьма большую высоту и заставляетъ продълать это воздушное путешествіе и горностая. Но послъдній инсколько отъ этого не страдаетъ и, кръпко держась за свою жертву, падаетъ виъстъ съ нею безо всякаго для себя вреда.

Въ заключение намъ остается сказать объ осенией и зимней охотъ на глухаря, промысловомъ значении этой итицы и опытахъ съ ея приручениемъ.

Первая по времени осенняя охота на глухарей есть чисто промысловое добывание молодыхъ глухарей, "селътокъ", при помощи лаекъ. Охота эта состоитъ въ томъ, что промышленникъ, взявъ съ собою собаку, которая пріучена подманивать глухарей, идетъ съ нею въ лъсъ, гдъ ожидаетъ найти еще не разбившеся глухариные выводки, пускаетъ собаку впередъ и, отъ времени до времени подзывая ее къ себъ, прислушивается, не лаетъ ли гдъ она, чтобы затъмъ идти на ея голосъ. Идти до собаки приходится иногда съ версту и даже болье. Найдя глухарять, собака сгоняеть ихъ съ земли, и какъ только они разсядутся на деревьяхъ, начинаетъ даять на нихъ. Если поднятые съ земли глухарята улетаютъ дальше въ лъсъ, это шисколько не смущаетъ дайку: она прямо бросается по тому направленію, куда улетьль выводокь, руководясь не столько верхнимъ чутьемъ, сколько острымъ зръніемъ и слухомъ. Разъ съвъ на деревья, глухарята писколько не боятся лайки, и не только очень долгое время выдерживаютъ ея лай, но даже поддразниваютъ ее, наклоняясь къ ней и "рычкая" или "хрюкая", т.-е. издавая своеобразные хриплые звуки. Темъ временемъ охотникъ подходитъ къ тому дереву, где нашли себф убфжище отъ собаки глухарята, и, благодаря глупости последнихъ, можетъ безъ труда убить 2-3 и даже перестрелять всехъ, такъ какъ глухарята не понимаютъ значенія выстр'вловъ и не боятся ихъ. При этомъ надо только стрълять, начиная всегда съ нижняго, и по возможности убивать птицу наповалъ.

Охота по лиственникамъ въ сущности является небольшимъ видонзмѣненіемъ только что описанной охоты съ лайкой, хотя за глухарями по лиственникамъ можно охотиться и безъ собаки, скрадомъ. Только такъ какъ эта охота производится преимущественно на взрослыхъ птицъ, она гораздо труднѣе только что описанной, требуетъ большого терпѣнія, остраго зрѣнія, знанія мѣстности и привычекъ птицы. Кромѣ того, необходимо умѣть стрѣлять изъ винтовки, т. к. стрѣлять приходится обыкновенно на далекое разстояніе.

Обыкновенно охота эта производится съ собакой, роль которой "заключается въ томъ, чтобы отыскать глухаря и облаять его. Лучшей собакой считается та, которая своимъ лаемъ не спугиваетъ глу-

харя и отыскиваетъ его верхиимъ чутьемъ, а та, которая отыскиваетъ его по "поъди", то-есть по хвойнымъ пиламъ, роняемымъ глухаремъ во время тады на землю, цънится ужъ не особенно высоко. Выходитъ на охоту должно въ одно время съ вылетомъ глухаря на лиственникъ, т.-е. передъ восходомъ солнца, и часа за три до его заката. На собаку вниманія никакого не обращается: она скрывается изъ глазъ охотника и онъ не знаетъ, гдъ она, до тъхъ поръ, пока не услышитъ ея лая, на который и отправляется скорымъ шагомъ. Глухарь, услыша лай собаки, опускаетъ голову виизъ и текаетъ, или, какъ говорятъ промышленники, сердится и дразнитъ собаку. Въ это время онъ не обращаетъ никакого вниманія на окружающее и сосредоточивается исключительно на собакъ, такъ что охотнику нетрудно подойти къ нему на выстрѣлъ.

"Охота скрадомъ труднѣе. Здѣсь отыскивать глухаря приходится самому охотнику, а разглядѣть его на лиственницѣ, несмотря на величину его, чрезвычайно трудно. Случается, что охотникъ во всѣ глаза смотритъ на одну лиственницу, а у него подъ бокомъ сидитъ глухарь на другомъ деревѣ, такъ что зачастую пройдешь мимо и не замѣтишь. Но на сторонѣ этого способа то преимущество, что тутъ можно убивать и глухаря и глухарку; при охотѣ же съ собакой это удается рѣдко, такъ какъ глухарка очень мало времени выдерживаетъ лай собаки.

"Удача охоты въ томъ и другомъ случав бываетъ почти одинакова и много зависитъ отъ состоянія погоды; въ насмурный и немного дождливый день успѣшиве можно охотиться, чвмъ въ ясный. Разстояніе, на которомъ мнв случалось убивать глухарей, различно: начиная отъ 25 саженъ и кончая 82 саженями. Иногда глухарь выдерживаетъ десятки выстрвловъ и не улетаетъ, а иногда улетаетъ послв перваго. Это зависитъ отъ того, гдв пролетитъ пуля: если выше его, надъ головой, тогда глухарь не улетаетъ, если же ниже, и притомъ задѣнетъ за сучья, тогда глухарь снимается съ мѣста.

"Охота на лиственникъ начинается, когда на немъ засыхаетъ игольникъ, а кончается, когда пгольникъ пожелтъетъ и валится на землю". (Ушковъ.)

Само собою разумвется, что описанияя охота, какъ такая, которая требуетъ умвиья стрълять изъ винтовки, доступна только настоящимъ охотникамъ. И вообще говоря, диллетанту въ охотв нечего двлать съ глухаремъ, который и на току, и льтомъ, и осенью требуетъ отъ охотника неутомимости, энергіи, знанія двла и умвиья хорошо стрълять. Можно сказать, что глухарь—завидная добыча, но дается въ руки лишь твмъ, кто двйствительно этого стоитъ.

Кром'в охоты съ дайкой и на лиственникахъ, осенью охотятся также за глухарями на жинвахъ. Но эта охота возможна только тамъ, гдѣ пахатныя поля врѣзываются клиномъ въ лѣсную площадь, т. к. на открытое поле, далеко отъ лѣса, глухарь не полетитъ. Въ литературѣ имъются свѣдънія, что такая охота производится въ лѣсныхъ

утадахъ Орловской губ. (Киртевскій), въ Ярославской (Гладковъ) и Казанской (Богдановъ); но несомитино, что ее практикуютъ не только въ перечисленныхъ мъстахъ, но вообще вездъ, гдъ мъстность этому благонріятствуетъ. Глухари съ наибольшею охотою вылетаютъ кормиться на поля тамъ, гдъ хлъбъ лежитъ въ кладяхъ и остается на поляхъ до глубокой зимы. На эти клади глухари по зарямъ часто летаютъ даже стайками и, узнавъ объ этомъ, охотникъ можетъ подкрасться къ птицамъ во время кормежки.


Если глухари регулярно посъщають какое-нибудь поле, въ такомъ случать здъсь можно даже устранвать шалани или землянки, покрываемые соломой, и для уситха охоты ставить приваду изъ овсяныхъ споновъ, въ которые воткнуты еловыя въточки. Такъ какъ потревоженныя выстръломъ птицы не скоро возвращаются на старое мъсто, такихъ шалашей и привадъ устранвается иъсколько. Такъ какъ охота производится утренними зарями, въ шалашъ надо забираться еще съ ночи. Но эта охота мало добычлива; не говоря уже о томъ, что глухарь зимою чрезвычайно кръпокъ къ ружью, почему убить его очень трудно, почти шикогда не удается выстрълить по птицамъ болъе одного раза.

Ипогда можно подътхать къ глухарямъ, кормящимся на полъ, съ телъги или на саняхъ, по все-таки на такое разстояніе, что стрълять дробью пельзя, и надо браться за винтовку. Успъщнъе можетъ быть охота на нерелетахъ, основанная на томъ, что глухари, подобно всъмъ тетеревамъ, имъя опредъленное мъсто для ночевки и для кормежки, летаютъ туда и обратно по одному и тому же, при томъ прямому направленію. Разъ замътивъ направленіе нерелета и помъстивнись на этомъ пути, съ иъкоторымъ терпъніемъ можно всегда дождаться глухарей и убить 1—2, при удачъ даже трехъ. С. Т. Аксаковъ говоритъ, что при этомъ онъ посылалъ кучера или загоницка сгонять глухарей, что, кромъ выигрыша времени, представляетъ еще то удобство, что спутнутый съ высокаго дерева глухарь всегда беретъ нъсколько книзу. Но и при этомъ промахи неизбъжны, равно какъ пропажа подранковъ, которые достаются гораздо чаще пернатымъ и четвероногимъ хищникамъ, нежели охотнику.

Что касается промысловыхъ способовъ добыванія глухарей, то они сводятся къ ловлѣ петлями, слопцами или давушками и пружками. Впрочемъ, простыя петли ставятся рѣдко—обыкновенно петля укрѣпляется на вершинѣ согнутаго деревца, которое соединяется съ насторожкой, т.-е. простыя петли замѣняются пружками, уже описанными выше, въ статъѣ о рябчикѣ. Давушки для глухарей устраиваются въ свою очередь по тому принципу, какъ давушки для рябчиковъ и тетеревовъ, только ихъ дѣлаютъ прочнѣе, а самая плашка берется тяжелѣе. На прилагаемомъ рисункѣ изображена давушка, употребляемая преимущественно зырянами. Такая давушка ставится на открытыхъ мѣстахъ, обыкновенно по берегу рѣки, т. к. глухари любятъ держаться здѣсь зимою. Если давушка, состоящая изъ воро-

теңъ, надъ которыми насторожена плашка, настораживается еще съ осени, въ такомъ случать, какъ приманка, употребляются какія-нибудь ягоды, напр., брусника, калина; если же она настораживается зимою, то достаточно посыпать снѣгъ въ воротцахъ пескомъ или расчистить здѣсь точекъ. Чтобы вѣрнѣе обезпечить ходъ глухаря въ воротцы, съ боковъ отъ нихъ накладываютъ сучья или втыкаютъ въ снѣгъ вѣточки: тогда птицт некуда идти, кромѣ воротецъ, и она обязательно должна задѣть за насторожку.

Постановкою сильевъ, пружковъ и давушекъ начинаютъ заниматься съ конца йоля, но ловля ими производится лишь съ осени, при чемъ пружками перестаютъ ловить уже въ самомъ началѣ зимы, такъ какъ молодыя деревца на морозѣ теряютъ свою гибкость и негодны для настораживанія. Каждый промышленникъ ставитъ эти снасти сотнями, иногда до 500—600 штукъ, при чемъ въ постановкѣ ихъ обыкновенно участвуетъ вся семья, и старъ и малъ.



Зырянская давушка для глухарей.

Наконець, глухарей ловять въ лисьи капканы, но это уже совершенно случайный способъ добыванія этихъ птицъ.

Переходя теперь къ обсужденію промысловаго значенія глухаря, совершенно ужбстно коснуться въса глухарей. Какъ извъстно, охотники весьма упорно дѣзятъ глухарей на двѣ породы; крупную и мелкую, такъ наз. раменнаго и шахроваго. По ихъ словамъ, старые самцы крупной породы достигають 20—30 фунтовъ въса, тогда какъ старые самцы мелкой породы въсять 10—15 фунтовъ. Однако безъ всякаго сомитьнія въ этомъ заключается и ошибка и преувеличеніе. Начать съ того, что двухъ породъ глухаря не существуетъ. Глухарь, какъ всякая долго живущая птица, конечно будеть тъмъ больше и тяжелъе, чъмъ дольше онъ живетъ и чъмъ спокойнъе протекаетъ его жизнь. Поэтому, на съверъ и вообще въ мъстахъ глухихъ описываемая птица бываеть и больше и тяжелъе, нежели близъ населенныхъ центровъ, гдъ ее выбиваютъ, и гдъ она не успъваетъ достигнуть полнаго развитія. Но темъ не менте я положительно не могу допустить, чтобы въсъ самаго большого глухаря превышалъ 17—18 фунтовъ, да н это псключеніе; въ 15-16 бывають, хотя тоже р'ядко, обыкновенный же вѣсъ стараго глухаря 10—12 фунтовъ, и молодого 7—8. Что касается глухарки, то ея вѣсъ рѣдко превышаетъ 5—6 фунтовъ.

Во всякомъ случать глухарь одна изъ самыхъ крупныхъ охотничьихъ птицъ и все-таки его значеніе какъ предмета промысла очень невелико по сравненію не только съ рябчикомъ и тетеревомъ-косачемъ, но даже съ бълой и сърой куропаткой. Вообще говоря, глухаря добывается разъ въ десять менъе, нежели обыкновеннаго тетерева, и изъ этого количества значительная часть потребляется самими промышленниками, а не поступаетъ въ продажу. Цъпа глухарю на мъсть отъ бо к. до г р., глухарки 40—50 к., молодымъ 50—60 к. за пару. Въ городахъ глухарь цъпитея немного что дороже обыкновеннаго тетерева, по спросъ на него неизмъримо меньше, т. к. мясо его грубъе или, по крайней мъръ, требуетъ болъе сложнаго приготовления, нежели мясо обыкновеннаго тетерева и бълой куропатки, чтобы сравняться съ ними во вкусъ и итъжности.

Однако, но трудности охоты глухарь завидная дичь, и потому добавимъ уже сказанное о немъ описаніемъ опытовъ съ его прирученіемъ, такъ какъ очень возможно, что, намъ, подобно англичанамъ, придется, выбивши глухаря, снова запяться его разведеніемъ.

Что касается прирученія взрослыхь глухарей, то за это не стонть браться, такъ какъ они не выносять неволи и обыкновенно въ теченіе года погибають, находяєь даже въ наплучшихъ условіяхъ. Но если брать глухариныя яйца и подкладывать ихъ подъ домашнихъ птицъ (курица, пидъйка) или, что еще лучше, добыть только что вывединхся глухарять, въ такомъ случать ихъ можно вырастить. Надо только, во-1-хъ, первыя недъли держать птенцовъ на муравыныхъ яйцахъ и насъкомыхъ, во-2-хъ, слъдить, чтобы они не съъли чего-шібудь для нихъ вреднаго и вообще не объълись. Хватову удалось такимъ образомъ воспитать глухарятъ, и въ мартъ ближайшаго года самцы уже начали токовать. Въ концъ апръля глухарки устроили въ отведенномъ имъ сарать гнъзда, вырывъ въ землъ ямки и натаскавъ въ нихъ перьевъ, моху и сухой травы, нанесли ящцъ (неслись черезъ день) и вывели одна 8, другая 6 цыплятъ.

Послъдніе, какъ и матки, совершенно не боялись человъка, и воспитаніе ихъ при матеряхъ не составляло никакого затрудненія. Сначала они также содержались исключительно на животномъ кормъ, а потомъ, когда начали поспъвать ягоды, кормъ ихъ сталъ разнообразнъе, и они быстро поднялись на крылья. Пользуясь полной свободой, они только на ночь возвращались въ отведенный имъ сарай. Самецъ токовалъ все лъто, былъ очень золъ и никого не пускалъ на огородъ, гдѣ жилъ.

Къ сожалѣнію, одна глухарка и глухарята отъ какой-то болѣзни погибли въ іюлѣ, и опыты съ ихъ прирученіемъ должны были прекратиться. Тѣмъ не менѣе, едва ли можно сомнѣваться, что эти опыты могутъ увѣнчаться успѣхомъ, и что глухаря можно сдѣлать если не вполнѣ домашней птицей, то птицей парковъ и даже не особенно большихъ, но хорошо охраняемыхъ лѣсовъ.

77. Куропатка бѣлая. Lagopus albus, Gm.

Табл. 81.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І. стр. 512.

Болѣе распростр. названія: былая куропатка.

Мѣстныя названія: куропать, во множ. куропти (у поморовъ); ∂ —барабанщикъ, питунъ, Q—курочка (Петербург. губ.); куропатка, куропатка (Пермск. губ.); былый тетеревъ (въ Спбири).

Польск.—pardwa.—Фин.—metsäkana, riekko.—Лапл.—reusak, riefsak или rievsak.—Эстон.—raba-kana, soo-kana, также tudo-kana.—Латыш.—baltais

rubbens, sneedse, swihre.—Лоп.—röp. (на Имандрѣ).

Татар. — алунь. — Якут. — хабапрхань, кавіскань, каколекань, неперас. — Вогул. — анш. — Остяц. — шола, тула. — Самовд. — хонден. — Монг. — запань-хоро. — Бурят. — куду. — Тунг. — хелеки (на Еннсев), елакь (Байкал.).

Бѣлая куропатка имѣетъ довольно большое промысловое значеніе, но тѣмъ не менѣе свѣдѣнія объ ея образѣ жизни у насъ очень скудны, что объясняется тѣмъ, что тогда какъ промысловыми способами ее добываютъ въ большомъ количествѣ, охотятся за ней мало. Кореннымъ мѣстопребываніемъ этой птицы надо считать моховое болото, поросшее кустиками ивняка, тощими березками, сосенками, елочками и т. д., однимъ словомъ отнюдь не совершенно открытое болото, и еще менѣе альпійскую область. Бѣлая куропатка—птица низменностей, замѣняемая въ горахъ слѣдующимъ видомъ, и постоянство ея мѣстонахожденій такъ велико, что они мало чѣмъ разнятся на крайнемъ сѣверѣ и югѣ ея области распространенія.

Вообще говоря, бѣлая куропатка принадлежитъ сѣверной половинѣ Россіи, но въ западной части страны она спускается къ югу до 56° с. ш. и въ юго-восточной даже до 51° с. ш. На сѣверѣ она найдена на о. Колгуевѣ, но, новидимому, не встрѣчается ни на Вайгачѣ, ни на Новой Землѣ и очень рѣдка въ береговой зонѣ Ледовитаго океана. Что касается южной границы распространенія описываемой птицы, то я приведу то, что писалъ объ этомъ ранѣе, такъ какъ никакихъ поздиѣйшихъ свѣдѣній, которыя измѣняли бы начерченную мною границу, не имѣется.

"Въ западной части Россін, по Тизенгаузу, юго-западная граница распространенія этой птицы полстольтія тому назадъ болье или мепве точно опредвлялась теченіемъ Намана, по въ настоящее время куропатка далеко не доходитъ до теченія этой ръки. Начинаясь въ Курляндін, южная граница бфлой куропатки переходить затфять въ губ. Ковенскую, отръзывая ея съверную часть, захватываетъ большую часть губ. Виленской, стверный уголъ Минской, всю Витебскую и отсюда пдетъ черезъ Смоленскую и Московскую, лишь слегка подинмаясь къ съверо-востоку. Въ Московской губ. бълая куропатка еще выводится въ Дмитровскомъ и Богородскомъ убздахъ. Далке на востокъ, описываемая птица еще встръчается въ Рязанской губ., гдъ къ югу доходить до Спасскаго убзда, и, въроятно, держится въ пебольшомъ числъ въ самыхъ съверныхъ частяхъ Тамбовской губ. Отсюда граница идеть къ съверо-востоку черезъ Нижегородскую губ., по минуя Казанскую, въ Вятскую и Пермскую, постепенно поднимаясь къ 606—616 на Уралъ. Къ съверу отъ указанной границы бълая куропатка становится все болье и болье обыкновенной по мъръ приближенія къ тундръ, гдъ, наконецъ, встръчается въ очень больномъ количествъ, исключая побережья Ледовитаго океана. Что касается Уральской области, то здъсь распространение бълой куропатки представляется въ такомъ видь: въ съверной части восточной половины Пермской губ. она ръдка вблизи хребта, по мъръ удаленія отсюда въ болѣе низменныя м'ястности встр'ячается все въ большемъ и въ большемъ количествъ. Въ равнинахъ Екатериноургскаго, Шадринскаго и Челябинскаго увздовъ бълая куропатка очень обыкновенна и составляетъ значительный предметъ промысла. Здъсь она населяетъ не только всъ кустарники прибрежьевъ ръкъ и озеръ, но встръчается и въ самыхъ незначительных ивнякахъ по встыт низинамъ и болотцамъ, и часто замъчается здѣсь рядомъ съ дрофой, тиркушкой, сусликомъ и другими настоящими обитателями степей. П. С. Назаровъ говоритъ слъдующее о распространенін бізлой куропатки въ области верхняго теченія різ-

"Распространеніе бѣлої куропатки совпадаетъ съ областью мелколѣсья, кромѣ Мугоджаръ. Въ восточної части области, по восточную сторону Прендыка, а также по сосновымъ колкамъ по р. Суундукъ, по береговымъ колкамъ Губерлинскихъ горъ, по отрогамъ Ирендыка до Орска бѣлыя куропатки встрѣчаются часто. По р. Тоболу бѣлая куропатка спускается далеко на югъ; такъ, она гнѣздится неподалеку отъ оз. Айкэ (51° с. ш.). Въ указанныхъ мѣстахъ она населяетъ прешмущественно береговыя рощицы, растущія на торфяникахъ, близъ ручьевъ и пр., иногда она довольствуется лишь мелкимъ березнякомъ и тальникомъ, но непремѣнно растущимъ по низменнымъ мѣстамъ. За южную границу распространенія бѣлої куропатки вполнѣ можно принять широту г. Орска. Можетъ быть прежде описываемая птица водилась и въ сѣверної части Мугоджаръ, но теперь ея здѣсь нѣтъ. Въ 1857 г. 12-го августа Н. А. Сѣверцовъ замѣтилъ выводокъ бѣлыхъ

куропатокъ на пескахъ у Плека, откуда онъ перелетъли въ кусты; молодой самецъ былъ добытъ (близъ устья Куралинскаго оврага). Хотя съ тъхъ поръ бълыя куропатки значительно уменьшились въ числъ, главнымъ образомъ благодаря вырубкъ лъсовъ, однако, по свидътельству Н. А. Заруднаго, и теперь сохранились кое-гдъ по Уралу и Илеку. Въ долинъ перваго Зарудный находилъ ихъ гнъздящимися въ скалахъ около Каменно-Орской станицы и въ прибрежномъ лъсу около Губерлинска. По Илеку куропатки попадаются еще ръже; тотъ же наблюдатель находилъ выводки по Мечеткъ между Буранной станицей и Изобильнымъ поселкомъ и у устья Кара-Бутака по болотистому урочищу съ ольховымъ лъсомъ.

"Хотя бѣлая куропатка предпринимаетъ зимою лишь сравнительно небольшія странствованія, тѣмъ не менѣе она встрѣчается въ это время за предѣлами указанной гнѣздовой области, напр., въ губ. Казанской, Vфимской и др.".

Какъ выше замѣчено, любимое мѣсто жительства бѣлой куропатки составляютъ или поросшія чахлыми деревцами тундры, или
общирныя моховыя болота среди лѣсной площади, также поросшія
кустиками и деревцами. Тамъ,¹ гдѣ бѣлыхъ куропатокъ много, онѣ
держатся и по небольшимъ моховымъ болотамъ, даже такимъ, которыя
окружены полями (наприм., въ Тверской губ.). Въ средней Россіи ихъ
можно также найти въ горѣлыхъ хвойныхъ лѣсахъ и болотахъ, поросшихъ молодымъ кустарникомъ; въ юго-восточной части страны въ
нвовыхъ и береговыхъ заросляхъ по теченію рѣкъ, окраинамъ болотъ и т. д. Зимою, во время кочевокъ, куропатки до нѣкоторой степени оставляютъ свои лѣтия мѣстонахожденія и встрѣчаются вообще
по открытымъ мѣстамъ, поросшимъ кустарникомъ.

Весною, приблизительно одновременно съ появлениемъ первыхъ вальдшнеповъ и недѣлю спустя послѣ начала тока тетеревовъ, начинаются тока и бѣлыхъ куропатокъ. Иногда эти птицы разбиваются на пары какъ только возвратятся послѣ зимнихъ кочевокъ на мѣста своего гитадовья (конецъ марта), и въ такомъ случат токованіе ихъ самцовъ сводится просто къ любовной пѣснѣ. Но если токъ начинается до спариванья, въ такомъ случат онъ проходить очень горячо и въ значительной степени напоминаетъ токование тетеревовъ. Обыкновенно итьсколько самцовъ описываемой птицы размъщаются въ небольшомъ разстоянін другъ отъ друга на поросшей кустиками полянкѣ и начинаютъ взапуски другъ передъ другомъ выкрикивать свою трель. Одни нередаютъ ее звуками гакъ, ка, ка, ка, а, а, а, гакъ, ка, ка, ка, а, а, а, а, другіе какъ бак-бак-барр, бак-баррр, барррр... Во всякомъ случав, выкрикиваемая ръзкими голосами, она въ значительной степени им ветъ право на сравнение съ барабанной дробью. Эта трель выбивается птицей на одномъ мъстъ, но отъ времени до времени то тотъ, то другой самецъ взлетаетъ съ громкимъ крикомъ эрррракка, а, а, а и затъмъ опускается, выкрикивая каваро, каваро, кавар, кавар, наи же начинаетъ бъгать, вытянувъ шею и распустивъ хвостъ, и покрикивая гао, гао. Въ разгаръ тока самцы съ ожесточеніемъ дерутся между собою.

Начинають токовать бѣлыя куронатки, надѣвъ евой нервый весеный нарядъ, т.-е. съ перелинявними изъ бѣлаго въ ржаво-бурый головой и шеей, но затѣмъ, послѣ небольного перерыва въ линъкъ, продолжается замѣна ржаво-бурыми бѣлыхъ перьевъ спины, верхнихъ кроющихъ крыла, надхвостья и т. д., и такъ какъ токованіе оканчивается послѣ половины мая, кончаютъ токовать бѣлыя куропатки въ очень темномъ нарядѣ. Самки посѣщаютъ тока въ серединѣ періода токованья, когда выбираютъ самцовъ, съ которыми спариваются; въ концѣ тока ихъ не бываетъ на токовниф, развѣ какая-ипбудъ запоздавшая, да и количество самцовъ здѣсь также уменьшается, такъ какъ каждый самецъ, выбравиш себѣ дружку, нервое время послѣ этого посѣщаетъ токовище, а потомъ перестаетъ.

Гитвадо всегда помъщается недалеко отъ токовища и представляетъ собою углубленіе въ почвъ, прикрытое нависшими въточками сосъдняго кустика и выстланное стебельками травъ. Въ началъ или серединть мая въ немъ уже можно найти полную кладку, которая обыкновенно содержитъ отъ 10 до 12 янцъ; но въ видъ исключенія въ кладкъ бываетъ до 15 янцъ, какъ на это указываетъ Руссовъ для Прибалтійскаго края, 14 янцъ въ кладкъ Пирсонъ нашелъ въ одномъ гитвадъ бълой куропатки на Колгуевъ. Длина янцъ 1,75 д., поперечникъ—1,32 д., основная окраска блъдно-оливковая, испещренная темнокрасно бурыми пятнами и точками. Самка сидитъ на яйцахъ очень кръпко, такъ что позволяетъ почти коснуться себя, взлетаетъ молча. Самецъ, покинувни токовище, держится тоже около гитвада, а потомъ, когда выведутся молодые, при выводкъ обыкновенно встръчаютъ обоихъ родителей.

Птенцы родятся съ уже хорошо развитыми маховыми и потому могутъ перепархивать, будучи всего нѣсколькихъ дней отъ роду. Первое время они питаются исключительно животной пищей, которую находятъ въ изобили во мху; въ іюлѣ, когда поспѣетъ голубика и пьяница, кормятся ими и въ концѣ этого мѣсяца, кромѣ того морошкой. Въ августѣ выводки начинаютъ охотно посѣщать брусничники, а въ сентябрѣ, когда молодые сравняются со старыми, вмѣстѣ съ осенней линькой куропатки перебираются въ мѣста болѣе крѣпкія, въ кустарныя заросли, "лозняки". Здѣсь онѣ держатся, пока перелиняютъ окончательно и пока выпадетъ снѣгъ.

Пока птенцы малы, самецъ и самка зорко оберегаютъ ихъ отъ опасности. Обыкновенно первымъ отъ выводка съ крикомъ поднимается самецъ и старается отвести за собою врага, а уже за нимъ молча взлетаетъ самка. Въ началѣ іюля птенчики еще малы, но могутъ летатъ быстро и далеко. Найденный въ кустахъ выводокъ поднимается вдругъ съ рѣзкимъ шумомъ, летитъ далеко, а когда спустится, птенцы еще пробѣгаютъ нѣкоторое разстояніе, прежде чѣмъ спрячутся, и потому найти ихъ здѣсь очень трудно. По минованіи опасности матка

первая начинаетъ скликать дътей; если же молодые лишились родителей, въ такомъ случат они обыкновенно пристаютъ къ другому выводку.

Съ выпаденіемъ снѣга и окончаніемъ осенней линьки бѣлыя куронатки стадятся и начинаютъ странствовать, улетая иногда за много верстъ отъ ихъ гнѣздовой области. Но въ мартѣ онѣ возвращаются къ своимъ роднымъ мѣстамъ и начинаютъ новый годичный циклъ своей жизни.

Что касается охоты, то настояще охотники стрѣляютъ бѣлыхъ куропатокъ лѣтомъ изъ-подъ собаки, когда выводки уже взматерѣютъ, и зимою—разыскивая по слѣду, особенно по порошѣ. Хотя куропатки летаютъ очень быстро, однако подпускаютъ на такое близкое разстояніе, что стрѣлять ихъ не составляетъ труда, и даже промышленники лѣтомъ много бьютъ этихъ птицъ изъ ружья, при помощи, казалось бы, самыхъ неподходящихъ собакъ, каковы дворняжки и гончія.

Зпиняя охота съ ружьемъ коротко, но върно оппсана г. Сысоевымъ, почему я и приведу его подлинныя слова. "Пока снътъ еще мелокъ, — говоритъ онъ, — куропатки придерживаются кочковатыхъ, поросшихъ мелкимъ лъсомъ болотъ, гдъ растетъ брусника, черника и клюква. Съ ягодами куропаткъ приходится разставаться, но за то высокіе стебли чернишника доставляють ей обильный кормъ до глубокаго снъга; жесткими полувершковыми палочками этого растенія она безъ церемоніи набиваетъ полный зобъ. Когда же снізгь настолько скроетъ чернишникъ, что до него птицѣ не добраться, куропатки сдаются на опушки лъса и въ съчи, заросния молодымъ осинникомъ. Выбирая м'єста, гді изъ сугробовъ торчатъ только маковки деревцовъ, куропатка легко опшпываетъ съ нихъ почки, которыми почти исключительно и питается до весны. Такія кормныя для куропатокъ мѣста бывають покрыты целою сетью ихъ узорчатыхъ следовъ. Тутъ же въ сугробахъ онъ дълаютъ ямки для ночлега, оставляя въ нихъ по утрамъ всегда кучу помета. По этимъ слъдамъ и ямкамъ очень легко отыскать пару или всю стаю; особенно хорошо охотиться по свѣжей порошѣ. Собака, конечно, не берется, и охотникъ ходитъ на лыжахъ... Куропатки подпускають близко, летять прямо и тяжело, и стрѣльба ихъ очень легка; спугнутыя пересаживаются недалеко и опять подпускають на выстрълъ. Только, найдя слъды, надо быть всегда на-готовѣ и не теряться отъ неожиданности, когда зарывшаяся въ сугробѣ куропатка взорвется изъ-подъ самыхъ ногъ, а зарывается она мастерски и и всколько саженъ можетъ пройти подъ сивгомъ, такъ что раненую легко потерять даже на небольшомъ пространствъ... Хотя куропатка подпускаетъ близко, по у нея есть одна уловка, часто спасающая ее отъ выстръда и значительно затрудняющая охоту: если поблизости пресл'вдуемой охотникомъ птицы есть елочка или другое густое растеніе, она бъжить къ нему, прячется у кория и, подпустивъ человъка вилоть до себя, подинмается всегда сзади дерева и летитъ низко, такъ что неопытный стрѣлокъ даже не увидитъ птицу, а только услыншть шумъ крыльевъ. Зная же такую уловку, выслѣдя куропатку

до самаго прикрытія, стоить только забѣжать въ сторону или выскочить за дерево—и бить будеть удобно... Такая охота, начиная съ первыхъ порошъ, продолжается до наста, т.-е. марта мѣсяца. Для стрѣльбы слѣдуетъ употреблять дробь не мельче четвертаго номера, потому что бѣлая куронатка— крѣпкая итица, съ толстыми костями и въ илотномъ опереньи. Интаясь такой грубой пищей, какъ вѣтки чернишника и осиновыя почки, она не отличается вкусомъ мяса: оно у нея синее и жесткое. Хотя бѣлая куропатка и не представляетъ пѣпной добычи для охотника, но возможность стрѣльбы въ такое скучное время, какъ декабрь, январь и февраль, дѣлаетъ охоту на нее довольно интересною".

Собственно промысловая охота за бъльми куропатками состоитъ весною изъ охоты на манку и осенью—на узерку, когда побълъвшую послъ линьки птицу легко замътить уже издали на темномъ фонъ ветонии. На манку самцы описываемой птицы идутъ очень охотно, да и подражать голосу самки, которая кричитъ похожее на *iay, iiay,* дъло не трудное. Затъмъ, въ началъ зимы бълыхъ куропатокъ кроютъ шатрами и ловятъ поножами и очипками, устанавливаемыми совершенно такъ же, какъ ихъ устанавливаютъ на тетеревовъ и рябчиковъ, но только въ другихъ мъстахъ. Наименъе распространенная ловля— крыть шатрами, такъ какъ она беретъ много времени, чтобы подготовить шатеръ и пріучить къ нему птицъ, хотя, съ другой стороны, она даетъ наибольшую добычу и наилучшую по качеству.

Въ продажѣ бѣлая куропатка довольно распространена, по крайней мѣрѣ столько же, сколько и сѣрая, и во всякомъ случаѣ имѣетъ большее промысловое значеніе, нежели глухарь, такъ какъ мясо ея вкуснѣе и къ тому же легко сохраняется. Охотники-промышленники продаютъ ее на мѣстѣ давленную по 5--7 к. за пару, стрѣлянную по 20—30 к.; въ Москвѣ цѣна вкругъ стоитъ вдвое, втрое выше, смотря по времени года и качеству дичи. Особенно цѣнятся молодые, стрѣлянные въ концѣ іюля и августѣ, и такъ какъ, найдя выводокъ, перебить его весь начисто не составляетъ труда, лѣтней охотой и объясняется, что бѣлыя куропатки болѣе или менѣе выбиты въ окрестностяхъ большихъ городовъ (Москва, Ярославль и т. д.).

78. Куропатка тундряная. Lagopus mutus, Mont.

Табл. 82, 83.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 518.

Болѣе распростр. названія: тундряная, горная или альпійская куропатка.

Мъстныя названія: тундряная куропатка (у поморовъ).

Лопар. — keram-röp (на Имандръ). — Финс. — kiiruna. — Лапл. — giron, kirun, keron, geron.

Въ Сибири инородч. названія этой птицы общія съ предыдущей (ко-

нечно, тамъ, гдъ онъ сходятся).

Тундряная куропатка распространена у насъ далеко не такъ широко, какъ ея родственница, такъ какъ она водится только въ Лапландін, на Новой Землѣ и въ сѣверномъ Уралѣ. Въ Лапландін она принадлежитъ безлъсному, тундряному побережью Ледовитаго океана и вершинамъ всъхъ горъ внутри страны, къ югу до 67° с. ш., которыя поднимаются за предѣлы кустарной растительности. На Уралѣ тундряная куропатка прослѣжена Гофманомъ отъ 66° до 61° с. ш. Сабанъеву была доставлена съ Конжаковскаго камня, но, по его словамъ, можетъ быть водится также на Павдинскомъ, Сухогорскомъ и Магдалинскомъ камияхъ, равно какъ по каменистымъ вершинамъ ивкоторыхъ горъ Каслинскаго и Уфалейскаго Урала.

Любимое м'всто жительства описываемой птицы составляють каменистыя розсыпи съ растущими на нихъ тощими мхами и лишаями, гдъ она паходитъ себъ лътомъ не только обильный кормъ, но и надежную занциту при своей пестрой окраскъ. Когда же выпадаетъ снътъ, тундряная куропатка, становясь посліз осенней линьки бізлой, какъ ея ближайшая родственища, является даже еще болье скрытой отъ зоркаго глаза орла и кречета, нежели л'втомъ. Такъ какъ птица отлично знаетъ это, то ея обычный пріемъ, чтобы укрыться отъ нападенія, состоить въ томъ, что она какъ можно плотиве прилегаетъ къ землв. Но вспутнутая, она летитъ очень быстро, хотя и на короткомъ разстоянін, и такимъ образомъ можетъ избъжать нападенія большинства

своихъ враговъ. Пину тупдряной куропатки составляютъ исключительно растительныя вещества, особенно ифжные побфти альпійскихъ растеній, ягоды вороницы и т. д. Подобно бізлой куронатків и тундряная живетъ нарами, при чемъ весною самцы точно такъ же токуютъ и дерутся изъ-за самокъ. Но голосъ тундряной куропатки не такъ громокъ, какъ у бълой, и нъкоторые сравниваютъ крики этой птицы съ глухимъ кваканьемъ лягунки. Брачный періодъ въ жизни описываемой итицы начинается раньше или поздиће, смотря по пинроть того мъста, гдъ эта птица гизадится. Въ Ландандін кладка ящъ начинается не раньше конца мая, иногда даже въ началъ йоня, и нормально выводъ итенцовъ долженъ падать здесь на начало іюля. Но иногда яйца находять даже въ концф іюдя, и въ такомъ случаф цыплята едва успфвають вырасти до наступленія холодовъ. Гифздо представляетъ собою небольшое углубление въ почвъ, устланное стебельками травъ, мохомъ и иногда небольшимъ количествомъ перьевъ. Обыкновенно кладка содержить 8— то ящь, но иногда ихъ бываетъ даже 12. По величинъ онъ могутъ даже превышать янца бълой куропатки, хотя часто бываютъ и меньше. Основной цвътъ ихъ измъняется отъ грязно-бълаго до буровато-охристаго, по этотъ фонъ обыкновенно покрытъ крупными и мелкими ярко-шоколадно-бурыми пестринами. Самка сидитъ на яйцахъ не особенно крѣпко, но очень привязана къ дѣтямъ и обыкновенно беретъ на себя отводить отъ шхъ угрожающую опасность. Впрочемъ, залегшій на каменистой розсыпи выводокъ можетъ быть замъченъ только случайно, такъ хорошо укрываетъ ихъ покровительственная окраска. Когда молодые вырастутъ и перелиняютъ, тундряныя куропатки соединяются въ довольно большія стада, которыя въ поискахъ за кормомъ предпринимаютъ весьма отдаленныя странствованія.

Промысловое значение тундряной куропатки ничтожно.

79. Перепелъ.

Coturnix communis, Bonnat.

Табл. 84.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 522.

Болѣе распростр. названія: перепель, перепелка.

Мъстныя названія: *подполюшка* (на прав. бер. Қамы, звукоподражательно); *перепелица* (малоросс.).

Польс. — przepiórka. — Фин. — viiriäinen. — Эстон. — puts pasaras. Ла-

тыш. — paipala, wakkis.

Каз. тат.—бюдбюлдюкъ.—Башк., мещер., кирг.—бюдэнэ.—Хив.—булду-

чинг. — Бухар. — сэпэмпатг. — Қыштым. — будурчинг.

Мордов.—*пра, кочкодокъ.*—Перм. и зыр.—*кватканъ.*—Черем.—*везе.*—Чуваш. и вотяц.—*пуденъ.*—Остяц. на Кеть—*кавіа,* на Сургуть—*льичъ,* на Нарымь— колеёль-тетофанъ.

Армян.—*чилъ*.—Қалмыц.—бёденэ.—Монг.—бёдена́.

Перепелъ пграетъ у насъ очень большую роль въ качествъ промысловой птицы, но не столько въ пстинномъ смыслѣ этого слова, сколько въ переносномъ, не столько за свое мясо, сколько за свой голосъ. Въ южной Россіи еще за нимъ охотятся болѣе или менѣе исключительно какъ за съѣдобной птицей, но въ средней Россіи среди охотниковъ, преслъдующихъ перепела, рѣшительный перевѣсъ берутъ "перепелятники", находяще въ "боѣ" перепеловъ такое же наслажденіе, какое другіе любители находятъ въ соловышомъ пѣніи.

Распространеніе перепела теперь очень велико. Въ Финляндін онъ поднимается къ съверу до 65° с. ш., хотя встрѣчается не вездѣ, но въ качествѣ залетной птицы былъ замѣченъ даже въ области Торнео. Въ области Бѣлаго моря перепелъ встрѣчается подъ Онегой и подъ Архангельскомъ, но сюда онъ вѣроятно проникъ сравнительно недавно, папр., лѣтъ 25—30 тому назадъ, такъ какъ въ 60-хъ годахъ его еще плохо знали около Онежскаго озера. Отъ Бѣлаго моря къ Уралу граница распространенія перепела быстро пошкается и на Уралѣ достигаетъ приблизительно 60° с. ш. Къ югу отъ указанной границы нерепелъ можетъ считаться повсемѣстно распространеннымъ тамъ, гдѣ есть обработанныя поля, луга и степи, но, повидимому, даже въ чер-

ноземной полость, гдть, казалось бы, всть условія благопріятствують жизни этой птицы, есть пфчто, мфинающее ей размножаться здфсь въ такой степени, какъ прежде. Вм'ясть съ тъмъ перепель изм'яняеть здѣсь и своимъ кореннымъ мѣстонахожденіямъ, какъ объртомъ, наприм. сообщаеть для Харьковской губ. г. Дублянскій, который иншеть следующее: "Въ послъднее десятилътіе у насъ наблюдается ръзкое изм'вненіе коренныхъ привычекъ въ образ'ть жизни перепеловъ. Подъ вліяніемъ эпергичнаго пресл'ядованія ихъ нашими многочисленными охотниками и хинцными итицами или по другимъ причинамъ, изъ года въ годъ все болъе и болъе они, оставляя свои обычные притоны, поля, луга и бурьяны, скрываются въ кустарникахъ, срубахъ, заросляхъ, тернахъ, по преимуществу въ балкахъ и байракахъ или около нихъ, и неръдко забиваются въ такую лъсиую чащу, куда не залъзеть и куропатка". Я не думаю, чтобы прямое преследование со сторопы твхъ или другихъ его враговъ такъ вляло на перепела; скорже причина лежитъ въ хозяйственномъ строф страны, въ измфненіи способовъ веденія полевого хозяйства и т. п., но фактъ остается фактомъ. Едва ли можно также сомнъваться въ томъ, что съ этимъ измъненіемъ въ привычкахъ птицы стоитъ въ связи и ея распространеніе на съверъ; какъ бы то ни было, если перепель за последнія 30-25 леть заняль более обширную площадь, онъ зато сталъ вездъ гораздо ръже. За исключеніемъ Закавказья, гдф перепель зимуеть въ небольшомъ количествф, онъ у насъ вездъ является перелетной птицей. Въ вертикальномъ распространенін на Кавказ в перепель пдеть до 8000' н. у. м.

Начиная описаніе образа жизни этой птицы, мы прежде всего видимъ, что перепелъ сравнительно поздно прилетаетъ на родину. Въ Крыму онъ обыкновенно является послѣ десятаго апрѣля и лишь въ видъ исключения въ послъднихъ числахъ марта. Точно такъ же въ началѣ апрѣля появляются перепела въ Ставропольской губ. и на западномъ побережьи Каспійскаго моря, однако зимующія въ Закавказь в особи могутъ попадать на съверный берегъ Каспія и ранъе. Въ Харьковской губ. прилетъ перепеловъ происходитъ около середины апръля и тянется до конца второй трети этого мѣсяца; но что касается одиночных особей, то Н. Н. Сомовъ совершенно справедливо заключаетъ, на основаніи своихъ наблюденій, что онъ появляются здѣсь болѣе или мен ве нормально въ первой половин в апр вля. Подъ Оренбургомъ прилетъ начинается въ последней трети апреля, а несколькими днями позднъе, т.-е. въ концъ этого мъсяца, перепелъ появляется въ области слитія Волги и Камы, хотя собственно прилетъ происходитъздѣсь въ началѣ мая. Въ центральную Россію и Польшу перепела прилетаютъ во второй половинъ апръля. Въ Прибалтійскомъ крат и въ Петербургской губ., гдф перепель очень рфдокъ, онъ появляется только въ началъ мая. Наконецъ, въ области Бълаго моря перепелъ едва ли прилетаетъ ран ве половины мая.

Перепела прилетаютъ ночью и первое время по возвращении на родину держатся на сухихъ лугахъ, въ озимыхъ поляхъ, по жнивью

и даже въ лѣсныхъ кустарникахъ, опушкахъ и срубахъ. Не находя себѣ въ своихъ любимыхъ угодьяхъ достаточной защиты, т.-е. не имѣя хорошаго прикрытія, перепелъ сначала молчаливъ, почему найти его и узнать о его прилетѣ можно только случайно; но спустя нѣсколько дней послѣ прилета, то тамъ, то сямъ по утреннимъ зарямъ уже можно услышать перепелиный бой, а вмѣстѣ съ тепломъ и развитіемъ растительности перепела начинаютъ бить и по вечерамъ, и днемъ. Перепелъ исключительно наземная и преимущественно ночная птица. Бѣгаетъ онъ легко и быстро, и подобно другимъ курпнымъ любитъ копаться въ землѣ, то разбрасывая и разгребая ее ножками, то усѣвинсь въ ямкѣ и возясь тамъ, какъ это дѣлаютъ куры, куропатки и т. д.

Летаетъ перепелъ очень быстро, часто махая крыльями, но передъ тѣмъ какъ сѣсть нерѣдко пролетаетъ нѣкоторое разстояніе, совершенно не шевеля ими. Вспугнутый—летитъ низко надъземлей и скоро опять опускается въ траву. Но на пролетѣ летитъ, кажется, очень высоко, по крайней мѣрѣ, насколько объ этомъ можно судить по голосу летящихъ птицъ. Степь и затѣмъ хлѣбныя поля, особенно просяныя, составляютъ любимое мѣстопребываніе перепела. Здѣсь онъ кормится преимущественно сѣменами травъ и хлѣбными зернами, но пока все это еще не вызрѣло, птица держится на животномъ кормѣ, т.-е. питается насѣкомыми. Днемъ перепелъ не выходитъ на открытыя мѣста и въ жаркое время подолгу лежитъ, развалившись въ выкопанной имъ ямкѣ; но какъ только наступаетъ вечеръ, перепелъ оживляется и проводитъ въ движеніи всю почь, до самаго утра.

Какъ только трава или зеленя поднимутся настолько, что скроють перепела, а вибсть съ тъмъ установится и теплая весенняя погода, для описываемой птицы наступаетъ такое же горячее время, какое представляеть собою для тетеревовъ періодъ тока. Перепелъ полигамъ, какъ и тетеревъ, и всъ разсужденія о томъ, будто эти птицы разбиваются на пары, основаны на одномъ недоразумѣніи. Дѣло въ томъ, что даже тъ, кто отстанваетъ этотъ взглядъ, признаютъ, что самцы перенела инкогда не встръчаются при выводкъ, и въ сущности этимъ все сказано, такъ какъ если самецъ не бываетъ при выводкъ, то нътъ и настоящихъ паръ. Конечно это вовсе не исключаетъ возможности встръчать перепеловъ парами, когда самка съ выбраннымъ ею самномъ держится въ теченіе дня гдь-нибудь въ укромномъ мізсть, пока наступитъ вечеръ, а съ нимъ вмѣстѣ и время, когда нары расходятся. Тогда покинутые самцы опять начинаютъ щеголять другь передъ другомъ и передъ самками своимъ "боемъ", опять увлекаютъ имъ самокъ и вмъстъ съ восходомъ солица опять уходятъ съ своими дружками на цълый день въ сосъднія поля. Какъ токованье тетеревовъ есть призывъ самцовъ къ самкамъ и выражение страсти, такъ и бой перепеловъ; но тетерева токуютъ на опредъленномъ мъстъ, а перепела кричатъ гдв понало.

Крикъ перепела состоитъ изъ двухъ колъпъ: сначала птица хриило "вавачетъ" или "мамачетъ", то-есть кричитъ вродъ ва-вва́,

ва-вва, пормально не болъе тремъ разъ, а потомъ слъдуетъ собственно "бой", который можно передать звукоподражательно словами nodbполоть, или еще точнъе звуками фить-пиль-вить. Это кольно итица издаетъ голосомъ чистымъ, громкимъ и повторяетъ отъ четырехъ до десяти разъ. При ваваканіи птица присъдаетъ, надувая зобъ; при первомъ ударъ приподымается, при второмъ стоитъ совершенно прямо, поднявши голову, при третьемъ отклоняется ифсколько назадъ, при четвертомъ или поздиве можетъ даже упасть на сипну. Самка отв'вчаеть на этотъ призывъ тихимъ двусложнымъ крикомъ и какъ только самцы заслышать его, стремглавъ бросаются къ ней. Тф, которые были поближе, бъгутъ, дальніе перелетаютъ и, столкнувшись другъ съ другомъ у самки, иногда даже начинаютъ драться между собою. Вирочемъ, чаще все вицмание самцовъ сосредоточивается исключительно на самкъ, а когда послъдняя, утомленная ихъ ласками, спасается паконецъ отъ нихъ бъгствомъ, они снова пускаются на ея розыски и тогда бой ихъ раздается съ особенной горячностью.

Какъ извъстно, бой перепеловъ продолжается большую часть льта, хотя въ средней Россіи въ іюль этихъ птицъ можно слышать только изрѣдка. Такая продолжительность времени боя уже сама по себф указываеть на продолжительность гифздового періода, и прямыя наблюденія не оставляють никакого сомивнія въ томъ, что птенцы перепелять выводятся въ теченіе всего літа. Однако, наъ этого не сатьдуетъ, что перепела повсемъстно нормально выводятся два раза въ лъто. Это приложимо только къ южной Россіи, гдъ первые птенцы обыкновенно бывають находимы въ последней трети мая и вторые не ранъе второй трети іюля. Въ средней же Россіи пужны исключительно благопріятныя условія, чтобы перенелята усп'яли вывести сь въ концѣ мая: обыкновенно это происходитъ здѣсь въ концѣ іюня, даже въ іюлѣ, и на вторичный выводъ дътей времени не остается. Однако, говоря такимъ образомъ, я вовсе не отрицаю, что нѣкоторыя перепелки успъваютъ вывести дътей два раза въ лъто и въ средней Россін; только я думаю, что большинство запоздавшихъ выводковъ принадлежить темъ самкамъ, которыя почему-либо утратили яйца первой кладки или первыхъ птенцовъ. Позднихъ перепелятъ встръчаютъ въ средней полосъ не только въ августъ, но даже въ сентябръ. М. Н. Богдановъ въ свое время привелъ даже совершенно исключительные случан нахожденія не оперившихся перепелять до 22-го сентября. Распространяться о судьбъ этихъ позднихъ выводковъ конечно много не приходится-все зависить отъ погоды. Если конецъ льта и начало осени сухіе, перепелята при обильномъ корм'в могутъ достаточно окръпнуть, чтобы по країней мъръ откочевать къ югу и уже тамъ набраться силы для отлета. Если же пойдуть дожди и рано ударять утренники, въ такомъ случат всемъ имъ грозить гибель, весь вопросъ только во времени.

Возвращаясь теперь къ описанію брачнаго періода въ жизни перепелокъ, мы прежде всего должны сказать, что въ степной полосъ

онь устранвають свои гизада предпочтительно на лугахъ и по суходоламъ, равно какъ и въ самой степи, въ средней Россіи-въ хлѣбахъ. Гивздо представляетъ собою неглубокую ямку, то едва выстланную травками, то густо выстланную ими, при чемъ отдѣльныя травки не просто накладываются другь на друга, а нѣсколько переплетаются между собою; иногда внутренность гивзда выстилается даже собственными перышками птицы. Разм'тры гитзда относительно величины птицы довольно велики, по это объясняется количествомъ яицъ, которыхъ бываетъ отъ 8 до 20. Наичаще встръчающееся количество ящъ въ кладкѣ 12—16. Форма ящъ грушевидная, поверхность маслянистоблестящая. Основной цвътъ измъняется отъ известково-бълаго до глинисто-буроватаго, или даже желтовато-оливковаго; по немъ разбросаны оливково-бурыя и черно-бурыя пестрины, иногда рѣдко, иногда такъ густо, что почти сливаются; или черно-бурыхъ пестринъ совствить нать, и онт заменны мраморнымъ глинисто-желтымъ рисункомъ, или, наконецъ, поверхность покрыта вмѣсто крупныхъ пестринъ множествомъ точекъ. Длина янцъ 1,1 — 1,2 д., поперечникъ 0,82-0,92 д.

Самка сидитъ на яйцахъ около трехъ недѣль, послѣ чего изъ ящть выклевываются перепелята съ пеньками на крыльяхъ, изъ которыхъ уже въ теченіе нъсколькихъ дней развиваются перышки. Вибстб съ тъмъ перепелята получають возможность перепархивать, почему ихъ и называютъ "поршками". Въ случав если матка погибаетъ, перепелята или пристаютъ къ одному выводку, или разбиваются по нѣсколькимъ, почему вовсе не рѣдки случаи, когда при маткъ находятся діти разнаго возраста. Первое время по выводі перепелята держатся около гивзда, но чвмъ больше они становятся, твмъ дальше они отбъгаютъ отъ него. Сначала мать кормитъ ихъ насъкомыми, которыхъ ловитъ тутъ же, гдф держится выводокъ, затфмъ мало-по-малу переводить на растительный кормъ, и вмъстъ съ тъмъ въ степной полосъ переселяется съ дътьми въ хлъбныя поля, въ средней Россіи просто начинаеть кочевать по хлюбнымъ полямъ. На обильномъ кормѣ перепелята вырастаютъ и отъвдаются очень быстро; что же касается старыхъ перепеловъ, то къ концу лъта опи бываютъ чрезвычайно жирны, такъ что даже взлетаютъ неохотно и только въ случать крайней необходимости. По мфрф того какъ хлъбъ косять и жнутъ, перепела отступаютъ въ уцълъвине участки, потомъ забираются подъ снопы, копны, и здъсь лежатъ очень кръпко. Когда хлъбъ свезутъ съ полей, перепела кормятся по жишвамъ, особенно на такихъ десятинахъ, которыя начинаютъ скоро зеленъть, и въ этихъ перекочевкахъ изъ-за корма для нихъ проходитъ все время до отлета.

Относительно времени отлета перепеловъ надо имѣть въ виду, что изъ средней и, конечно, изъ сѣверной Россіи эти птицы откочевываютъ постепенно, начиная съ августа. Собственно осенній пролетъ длится въ средней Россіи съ конца августа до конца сентября и только въ видѣ исключенія перепела можно встрѣтить здѣсь въ октябрѣ. Въ

южной Россіи время осенняго пролета весьма различно въ разпыхъ мъстахъ. Но словамъ Н. Н. Сомова, въ Харьковской губ, число перепеловъ начинаетъ ръдъть пвогда уже съ конца августа, по настоящій отлетъ происходитъ постепенно съ начала сентября. Собственно пролетные, которые держатся отдівльно отъ містныхъ, замізчаются уже съ начала августа, но они ръдко появляются въ большомъ количествъ. Тянется пролеть до конца сентября; затьмъ на пролеть эти птицы попадаются уже въ незначительномъ числъ, и въ половниъ октября пролеть оканчивается. Въ Ставропольской губ., по наблюденіямъ Н. Я. Диниика, пролеть начинается въ концъ августа и болъе или менъе заканчивается къ половинъ сентября, такъ что послъ этого остаются только одиночныя особи, которыя встржчаются до половины октября. Въ степной части Крыма отлетъ начинается съ 10-го августа, въ южной части полуострова изсколько поздиже, около 15, и оканчивается около 20 сентября. Гораздо поздиће происходить пролетъ перепеловъ въ юго-восточной части страны. Подъ Оренбургомъ пролетъ длится съ начала сентября до начала октября, но одиночные встрѣчаются здісь до начала поября. Изъ окрестностей Гурьева перепела улетаютъ въ теченіе октября, но запоздавніе встрфчаются здісь даже зимою, въ январъ и въ февралъ, когда замерзинхъ перепеловъ находять также въ стогахъ сфиа. Въ Закавказъф перепела обыкновенно держатся осенью до ноября, послів чего большинство этихъ птицъ отлетаетъ все-таки дальше къ югу. На осениемъ пролетв перепела нногда летять на незначительной высоть, ночью. Такъ, по словамъ Н. Н. Сомова, въ ночь съ 6-го на 7-е сентября 1889 г. былъ очень большой пролетъ перепеловъ черезъ г. Харьковъ; множество этихъ птицъ, ударяясь о стъны и трубы домовъ, съ глухимъ ніумомъ падали на мостовую и на крыни.

Враговъ у перепела очень много Такъ какъ самка сидитъ на яйцахъ очень крѣпко, въ это время ее безъ труда ловитъ и лисица, и хорекъ, и кошка. Но вмѣстѣ съ тѣмъ сидиція на яйцахъ перепелки въ большомъ количествѣ гибнутъ подъ косою при косьбѣ хлѣба, такъ какъ лязгъ косъ и даже говоръ людей въ непосредственной близости не могутъ согнать птицу съ гнѣзда, и она остается въ немъ, не понимая въ чемъ дѣло и надѣясь остаться незамѣченной. Яйца перепеловъ выпиваютъ хомяки, ежи, луни и т. д., а когда періодъ гнѣздованія кончится, перепела много терпятъ отъ разныхъ соколовъ и ястребовъ-перепелятниковъ. Но самый крупный врагъ описываемой птицы все-таки человѣкъ, изобрѣвшій весьма разнообразные способы ловли и добыванія этой вкусной и миловидной птички.

Какъ извъстно, перепелъ добывается ради двухъ цълей: такъ называемые криковые перепела добываются изъ-за ихъ крика, до котораго есть страстные охотники, и, во-вторыхъ, перепеловъ и стръляютъ и добываютъ другими способами ради ихъ мяса. О криковыхъ пере-

нелахъ мы имъемъ двъ дъльныя статън, принадлежащія г. Данилову и г. Турбину, и я приведу здъсь изъ нихъ все самое существенное.

"Голосъ перепеловъ, говоритъ г. Даниловъ, по-охотничьи раздѣляется на ваваканье, или мамаканье, и на крикъ. Мамаканье обыкновенно повторяется отъ одного раза не "до трехъ" разъ *), а иногда и гораздо больше, такъ какъ бываютъ такіе перепела, которые пногда не кричать, а только мамачуть, и у охотинковъ называются "мамаками". Это по большей части очень старые перепела, съ большимъ чернымъ пятномъ подъ горломъ, по встръчаются "мамаки" и изъ молодыхъ. Вообще "мамакъ" между перенелами не мало и ихъ потому только незам'тью, что мамаканье песравненно слабфе крика и издали его неслышно; по стоитъ только созвать побольше перепеловъ дудкой или самкой, чтобы убфдиться, какъ много изъ нихъ этихъ "мамакъ". "Крикъ перепеловъ въ каждомъ "разъ", по-охотничы, состоить изъ трехъ особыхъ колънъ: "подъема, проволочки и отлива". Характеръ звуковъ этихъ колънъ у разныхъ перепеловъ бываетъ безконечно разнообразенъ. У огромнаго большинства, т.-е. у плохихъ, но-охотинчын, перепеловъ, всъ колъна крика бываютъ отрывистокоротки и сливаются въ одинъ поспъшный, ифсколько свистящий ударъ, ввуками въ родъ: фвать-фаль-вать! или фвить-фвиль-вить! Такіе перепела называются "частохватами" или "чистохватами" и ни во что не цънятся охотниками, хотя число ударовъ за одинъ пріемъ у частохватовъ вообще бываетъ самое большое и всегда положительно больше, чъмъ у самыхъ лучшихъ перепеловъ. Изъ этого видно, какъ мало зналъ г. Аксаковъ охоту криковыми перепелами, когда писалъ, что "перепель считается темъ дороже, чемъ громче опъ кричитъ, и чемъ большее число ударовъ двлаетъ за одинъ пріемъ".

"Дорогой перепель еще можеть кричать "громко", хотя это не составляеть въ пемъ особеннаго достопиства, но дѣлать много ударовъ "за одинъ пріемъ" онъ рюшительно не можето. И это естественно: по-охотничьи, чѣмъ напряженнѣе, протяжнѣе, равномѣрнѣе и раздѣльнѣе колѣна каждаго удара въ крикѣ перепела, тѣмъ онъ "дороже цѣпится"; а каждый подобный ударъ крика непремѣню извлекаетъ изъ легкихъ перепела гораздо больше воздуха, пежели ударъ короткій и всегда вмѣстѣ съ тѣмъ легкій и отрывистый. Отлично-хорошій перепель часто дѣлаетъ только одинъ ударъ и рѣдко больше двухъ-трехъ "за одинъ пріемъ". Но для послѣдияго числа ударовъ нужно уже особенно сильныя легкія. Хорошіе перепела бываютъ и "съ хринью" и "безъ хрини", по отлично-хорошіе всегда имѣютъ самую полную, самую густую "хринь".

^{•)} Здісь г. Даниловь возражаєть Аксакову, котораго вообще не считають знающимь хорошо нерепелиную охоту. По діло вь томь, что г. Даниловь, какъ завзятый "перепелятникъ", уже черезчурь строго относится къ маленькимь погръщностямь Аксакова относительно перепеловь. Въ главномъ Аксаковь не сділаль никакихъ ошибокъ и что касается въ частности перепелинаго боя, то совершенно вірно, что огромное большинство перепеловъ вавачать не болье трехъ разъ подъ рядь, это подтвердить и любой ружейный охотникъ.

Прим. автора.

"Между "частохватами" и отлично-хоронними перепелами отличають иѣсколько сортовъ такъ называемыхъ "изрѣдковъ", начиная отъ "изрѣдочка" до "изрѣдка хоть-куда". То-есть, начиная самымъ посредственнымъ и кончая самымъ хоронимъ "изрѣдкомъ". Но изрѣдокъ, какъ онъ ни будь хоронъ, по-охотничьи все еще "не настоящій перепелъ".

"Отличительные достоинства и педостатки "изрфдковъ" опредфляются большимъ или меньшимъ приближениемъ ихъ крика къ охотничьему идеалу крика "настоящаго перепела". А отличительная черта крика "изредковъ" состоитъ въ томъ, что колена ихъ, впрочемъ, всегда больше или меньше протяжнаго крика бывають не равномърны, или не такъ "разстановисты", не такъ рельефно выдъляются одно отъ другого, какъ у отлично-хоронняхъ перепеловъ. Въ "изръдкахъ" у одного рельефиве выдвляется изъ остальныхъ колбиъ "подъемъ"; такой называется "подъемистымъ"; у другого-"проволочка",--"съ проволочкой", а у третьяго "отливъ" — "отливистымъ". Чаще всего короче прочихъ колънъ бываетъ "отливъ" (послъднее колъно), что по-охотничьи опредъляется словомъ "срываетъ"! И это происходитъ оттого, что у перепела не хватаетъ силы легкихъ (не достаетъ воздуха), чтобы додержать протяжность до конца последняго колена. Еще хуже, если "изредокъ", начавин крикъ протяжнымъ "подъемомъ", начинаетъ "срывать" съ "проволочки", т.-е. сокращать больше или меньше оба последнія колена, - это уже почти тотъ же "частохвать".

"Хрипь, какъ и протяжность, у отлично-хорошаго перепела проходить равномърно черезъ всѣ колъпа крика. У самыхъ лучшихъ хрипь обыкновенно достигаетъ высшей напряженности въ "проволочкъ" и какъ бы дѣлитъ это колѣно на два тона: пѣсколько высшій и пѣсколько низшій (болѣе густой). Такая "хрипь", бывающая всегда совмыстно съ самымъ протяжнымъ и самымъ разстановистымъ крикомъ, считается верхомъ совершенства крикового перепела, котораго на каждой перепелиной ловлѣ такъ внимательно и чутко отыскиваетъ слухъ и такъ желанно ждетъ сердце каждаго охотника!.."

Изъ этихъ словъ читатель легко усмотритъ до какой степени своеобразно прихотливы бываютъ любители въ своихъ требованіяхъ, и какъ въ сущности сложно опредъленіе достоинствъ лучшаго крикового перепела. Такіе перепела цѣнятся не десятками, а сотнями рублей и, какъ извѣстно перепелинымъ любителямъ, добываются только въ извѣстныхъ мѣстахъ *). Въ этомъ отношеніи перепелъ для однихъ то же, что соловей для другихъ.

Добываютъ криковыхъ перепеловъ сѣтью на манку (дудочкой) или на самку. Для этого охотникъ прежде всего по зарямъ выслушиваетъ перепеловъ и, опредѣливъ въ извѣстной мѣстности хорошаго

^{*)} Изъ нихъ перечислимъ нѣкоторыя: Суджанскій уѣздт, Курской губ., большая часть Воронежской, Малоархангельскій, Ливенскій и Елецкій—Орловской, Новосильскій и Ефремовскій—Тульской, Лебедянскій, Липецкій и Усманскій—Тамбовской, Сумскій, Ахтырскій, Богодуховскій, Харьковскій и Волчанскій—Харьковской.

крикупа, старается подманить именно его. Если перепела кричать мало, въ такомъ случав ивкоторые охотшки стараются убить самокъ, чтобы твмъ самымъ вызвать болве горячій бой самцовъ. Съ этою цвлью весною за перепелами отправляются съ ружьемъ и собакой, и т. к. въ періодъ спариванья днемъ очень часто удается найти и поднять парами перепеловъ (самца и самку) вмъстъ, при чемъ самка всегда летитъ впереди самца, этимъ и пользуются, чтобы разбить пару. Иногда послъ такого маневра самцы начинаютъ кричать крайне горячо съ перваго же дия потери самокъ, и охотникъ безъ труда опредъляетъ достоинство перепеловъ въ своемы районъ.

Хотя охота за криковыми перепелами кажется и легкой, однако требуетъ сноровки и знанія повадокъ птицы, что пріобрѣтается только долговременнымъ упражненіемъ. Изъ инструментовъ для этой ловли необходима сѣть и манки, или дудочки, посредствомъ которыхъ можно подражать призывному крику самки; но манки могутъ быть замѣнены и живою самкой, для чего берется непремѣнно годовалая и перезимовавшая въ клѣткѣ. Изготовленіе всѣхъ этихъ принадлежностей и самую охоту г. Турбинъ описываетъ слѣдующимъ образомъ.

"Для плетенія съти употребляются преимущественно тонкія и кръпкія льняныя нитки. Пеньковыя идуть только въ крайнихъ случаяхъ. Съти изъ такихъ нитокъ никогда не имъютъ необходимыхъ легкости и прочности. Любители изъ достаточнаго купечества пробовали заводить съти шелковыя, но онъ сильно путаются и потому признаются неудобными. Сѣть плетется всегда рѣдкая, ячен дѣлаются не менѣе квадратнаго дюйма и не болъе ³/, квадрат, вершка. Съть съ ячейками менъе дюйма будетъ тяжела и замътна, болъе $^{3}/_{1}$ вершка даетъ возможность выпорхнуть попавшейся птицъ. Длина и ширина сътей бываетъ разная. Самыя малыя съти дълаются, при ширинъ въ 5 аршинъ, длиною въ 6 арш. Самыя большія (какія только мн'т приходилось видіть) были квадратныя, имфвшія какъ въ длину, такъ и въ ширину по 12 арш. Нитки для свтей всегда употребляются суровыя, такъ какъ онв крвпче бвленыхъ, да и при ловл'я мен'я зам'ятны. Сфти иногда зеленятъ, т.-е. вымачиваютъ въ соку свѣжей травы или ржаной озими. Впрочемъ въ зеленънін пътъ особенной надобности.

"Перенелиныя дудочки многіе охотинки дѣлаютъ сами, другіе покупаютъ готовыя. Но самодѣльная снасть почему-то всегда считается надежнѣе покупной. Для приготовленія дудочки берется или плотный опоекъ или тонкій выростокъ, черный или бѣлый это все равно. Изъкожи вырѣзывается кусокъ въ видѣ транеціи, съ равными не параллельными сторонами, высота транеціи должна быть не менѣе какъ на 1/3 длиниѣе дѣлаемой дудочки. Непараллельныя стороны прикладываются одна къ другой и илотно тачаются по краю, тонкою, хорошо навощенною дратвою. Повъ разглаживается, и получается что-то въ родѣ бездоннаго мѣшка или чехла, въ которомъ нижній конецъ всегда шире верхияго. Мѣнюкъ на пѣсколько времени кладутъ въ воду, а потомъ натягиваютъ на гладкую конусообразную палку съ вырѣзанными на

ней круглыми углубленіями. Далже, мокрый кожаный чехоль притягивають къ углубленіямъ палки крѣнкою бечевкою или стеклядью. Каждый рубецъ лучие всего завязывать отдельно и потуже. После обвязки палка кладется на сутки или двое въ воду, потомъ вынимается, просушивается въ тъни и на вольномъ воздухъ; когда же весь приборъ высохиетъ, срѣзываютъ обвязки и снимаютъ чехолъ, на которомъ полученные отъ стекляди рубцы или сборки сохраняются надолго. Нижній, широкій конецъ чехла задблывается наглухо, а къ верхнему, узкому, прилаживается пищикъ изъ кости гусинаго папоротка, отпиленной по концамъ. Полученная изъ кости трубочка не бываетъ длиннъе вершка или вершка съ четвертью; одинъ ея конецъ, остающійся вибшнимъ, почти до половины наливается воскомъ или густою смолой (варомъ). Въ серединъ дълается круглая дырочка для издаванія звуковъ. Отъ дырочки до конца трубочки проръзывается отверстіе. Наконецъ, пижняя оконечность трубочки вставляется въ узкую часть кожанаго чехла и плотно привязывается нитками. Дудочка готова. Но ее еще надобно наладить (настроить). Для того требуется имъть очень тонкій слухъ и большую опытность. Кожаный чехоль имътъ сборки, которыя равномърно сжимаются и растягиваются. При сжиманін выходящій воздухъ производить звукъ изъ средины костяной трубочки. При растягивании внутренняя полость чехла снова наполняется воздухомъ. Свистъть перепелиною дудочкой сумфетъ каждый, но подражать на ней призывному голосу самки требуетъ навыка и составляетъ своего рода искусство, которое при всемъ стараніи инымъ и не дается. А подчасъ бываетъ и такъ: напримъръ, я, или кто-нибудь мастерски манить въ комнатъ, а на дълъ плохо. Плиотлично ум'ветъ подманивать горшковаго *) перепела, а доведись довить хорошаго, руки задрожали и выйдеть удивительная чепуха, способная только разгонять, а не заманивать. Всф эти обстоятельства заставляютъ охотниковъ вмѣсто дудочекъ пользоваться самками. Тѣ уже не фальшивятъ и не сбиваются. Поймать перепелку самку, въ особенности когда она съ дътьми, не трудно, но дъло въ томъ, что такія самки, перегодовавши, далеко не всъ тюрюкаютъ (иные говорятъ трюкають), т.-е. манять; значить, заботы и труды ухаживанія и сохраненія потеряны. Самки изъ молодыхъ, изъ поршковъ по-охотничьи, несравненно надежиће. Ловить поршковъ довольно легко, даже цѣлыми выводками, но при этомъ является такое затруднение: пока птички въ первомъ перѣ, самцовъ нельзя отличить отъ самокъ (обыкновенно первыхъ бываетъ больше, чъмъ вторыхъ). Почему необходимо сохранять весь выводокъ до тѣхъ поръ, пока онъ перелиняетъ, т.-е. до слъдующаго года. Но иногда случается то, что всѣ уцѣлѣвшія изъ перезимовавшихъ птичекъ оказываются самцами, следовательно опять "труды и подвиги пошли подъ ноги", по словамъ старинной пословицы.

^{*)} Γ оршковий перепель значить такой, который кромѣ какъ въ горшокъ, т.-е. на \$ду никуда не годенъ.

"Заведя вст необходимыя снасти, охотникъ приступаетъ къ ловлта. Лучнимъ временемъ считается май, йонь и первая половина йоля. Раньше травы на дугахъ и всходы яровыхъ поствовъ малорослы. Озимей почему-то перепела не любятъ. Поздите они или совершенно перестаютъ кричатъ, или кричатъ очень ръдко, да къ тому же и самки не манятъ. Самыми удобными для ловли днями считаются тт, въ которые не бываетъ росы, что во многихъ мъстахъ Великой Росси называется сухоросицей. Раниия утра такихъ дней самые добычливые часы охоты. Когда же бываетъ роса обильная, то ловлю начинаютъ только тогда, когда трава обсохиетъ, т.-е. около полудня. Въ дни дождливые перепела не идутъ на манку. Повсемъстно замъчено, что мокрые самцы не сближаются съ самками.

"Обыкновенно ловля производится такъ: заслышавши гдѣ-нибудь хорошаго перепела, любитель, или какой-бы то ни было горшечникъ *), по нескошенной травъ или яровому посъву (кромъ гречихи) **) разстилаетъ съть, что дълать вдвоемъ несравненно скоръе и удобнъе, но можно и одному. Постъ разстилки съти охотникъ садится у края, противоположнаго той сторонъ, съ которой слышенъ крикъ перепела. Особенно близко подходить къ крикуну не нужно; онъ хорошо и далеко слышить. Дудочки пускаются въ дъло только во время крика. Замолчалъ перепелъ, должна молчать и дудочка. Если же ловятъ на самку, то она и сама знаетъ когда следуетъ манить. Во время разстилки съти, клътку съ самкою необходимо чъмъ-нибудь прикрыть, иначе самка можетъ начать манить преждевременно и тѣмъ испортить охоту. Плохіе перепела, которыхъ несравненно больше, ловятся гораздо легче и скорфе, чъмъ хорошіе. Нной отличный боецъ подойдетъ къ съткъ близко, но подъ сътку не пойдетъ. "Будетъ маячить кругомъ да около, а въ руки не дастся". Когда перепелъ зашелъ подъ сътку, охотнику стоитъ только встать на ноги, птица вспархиваетъ и запутывается въ ячеяхъ съти. Гдъ перепеловъ много, а охотниковъ мало, случается въ одну настилку съти ловить штукъ по десяти и даже больше. Не наманенные, т.-е. не напуганные, перепела чрезвычайно смълы, и не опасаясь человъка, неръдко вскакиваютъ подъ сътью на клътку съ самкой. Иногда даже не подходя подъ съть, бросаются въ нее съ налета сверху. Охоты въ такихъ мѣстахъ бываютъ чрезвычайно добычливы, конечно только въ одномъ горшечномъ смыслѣ. Хорошіе перепела везд'я п всюду р'ядки. Сплошь п рядомъ, странствуя двѣ-три недѣли подъ рядъ, можно слышать цѣлыя тысячи перепеловъ и ни одного изъ нихъ порядочнаго, о хорошихъ же нечего и говорить.

"Замѣтныхъ по хорошему крику перепеловъ всегда разсаживаютъ

^{*)} Т. е. перепелятникъ-промышленникъ, который, ловя перепеловъ, заботится не о качествъ ихъ, а о количествъ.

^{**)} По гречих и по кустикам изобъгают разстилать съти по двумъ причинамъ: во 1-хъ, здъсь она сильно цъпляется, отчего перепела часто выбиваются изъ-подъ нея не запутавшись: во 2-хъ, снимать съть, благодаря тому, что она цъпляется, крайне затрудиштельно.

поодиночкъ. Стъпки перепединыхъ клютокъ непремънно дълаются изъ частой сътки, въ ячейки которой итица не должна просовывать голову. Непривыкийе къ клюткамъ перепела вначалъ прыгаютъ и зашибаются, для избъжанія чего въ клюткахъ вишвается полотияный верхъ, вродъ потолка. Всъмъ етарымъ и опытнымъ охотникамъ извъстно, что плохіе перепела къ клюткамъ привыкаютъ скоро и педъщ черезъ двъ-три начинаютъ кричатъ, чего почти не случается съ хороними. Настоящій боецъ върпъе всего перегодуєтъ и только тогда станетъ утъпать хозяпна.

"Бойцовъ ни весною, ни лътомъ не держать въ компатахъ. Клътки съ такими перепелами вѣшаются на щоглахъ. Такъ называется длинная прямая жердь, на тонкомъ концф которой устранвають двухскатную кровельку, съ переднею и задинии стъпками. Подъ кровелькою помъщается клътка съ перенеломъ, поднимаемая на инуркъ по блоку. Нижній конець жерди укръиляется въ земль. У людей богатыхъ и щеголеватыхъ вмъсто щоглы ставится чуть не мачтовое бревно, раскрашенное и размалеванное разными узорами. Кровелька снабжается затыливой рызьбою и тоже раскранивается. Кровелька со стынками закрываетъ перепела отъ дождя, вътра и солнечнаго зноя. Прибавимъ кстати, что въ перепелниую казъточку недьзя ставить воды, потому что птица всегда ее прольсть или расплескаеть. Необходимая же для питья вода пом'вщается виб клътки: съ боку, въ баночкъ, надъ которою прорѣзывается круглое отверстіе. Голосъ хорошого перепела въ тихую погоду можно слышать версты за двф, а по вфтру даже дальше. При сильныхъ ударахъ бойца даже самая мачтообразная щогла вздрагиваетъ, а обыкновенная просто пошатывается".

Теперь намъ падо перейти къ охотничьему и промысловому добыванію перепеловъ, въ общеупотребительномъ смысл'я этихъ словъ.

Какъ было упомянуто, той же сътью, которой ловятъ криковыхъ перепеловъ, ловятъ вообще и этихъ птицъ, и этотъ способъ добыванія далеко не можетъ почесться исключительно промысловымъ, такъ какъ и на него существуютъ любители. Но чаще всего прибъгаютъ къ наволочной съти, для чего нужно участіе двухъ лицъ и присутствіе собаки. Охота эта не трудна. Стть употребляется такая же, какъ и при простой ловать перепеловъ, но къ нижнему ея краю прикртьпленъ довольно тяжелый грузъ, а черезъ верхний продъвается тонкая веревка, которая обыкновенно укрѣпляется на длинныхъ легкихъ шестахъ. Когда собака, найдя перепела, сдълаетъ надъ нимъ стойку, тогда съть тянутъ сюда, наволакиваютъ на то мъсто, гдъ находится перепель, покрывая ею виъсть съ тъмъ и собаку, и вспутнутая птица запутывается въ ячейкахъ съти. Необходимое условіе при такой охотѣ, чтобы собака была вѣжливая, такъ какъ если она срываетъ и гоняетъ, то не только можетъ порвать сѣть, но и вообще испортить всю охоту.

Ружейная охота на перепеловъ производится лѣтомъ и подъ осень, начиная съ уборки хлѣба. Выше уже говорилось, какъ упорно

держатся перепела въ несжатыхъ клочкахъ хлѣбнаго поля, подъ снонами и копнами. Поэтому, само собой понятно, что охота за этими птицами здѣсь вовсе не трудна: сытая и даже ожирѣвшая птица взлетаетъ неохотно, подпуская собаку почти въ упоръ, и если вспугнутая летитъ все-таки очень быстро, за то прямо, такъ что на открытомъ мѣстѣ стрѣлять ее легко. Отсюда понятно, что многіе охотники пренебрегаютъ стрѣльбою перепелокъ, какъ дѣломъ очень легкимъ, но въ общемъ эта охота своеобразна и заиятна. Стрѣлять въ открытомъ полѣ, въ хорошую погоду, видѣть понски и стойку собаки—для охотника песомнѣнное удовольствіе, и иѣсколько дпей въ концѣ лѣта можно всегда удѣлить этой охотъ.

Затѣмъ въ то же время года перепеловъ добываютъ разными промысловыми способами, какъ-то сачкомъ, чирахомъ и колокольчикомъ и т. п.

Повля сачкомъ практикуется преимущественно въ Туркестанскомъ краѣ, и прежде всего требуетъ отъ охотника ловкости и навыка. Сачокъ походитъ на сѣтку, которая употребляется при ловлѣ бабочекъ, но значительно больше послѣдней, такъ что діаметръ обруча нѣсколько болѣе аршина и соотвѣтственно этому глубина сѣтки также довольно велика. Сѣтка вяжется изъ тонкихъ, но крѣпкихъ нитокъ, обручъ насаживается на палку, сажени въ двѣ длиною. Необходимая принадлежность этой охоты—собака. Послѣдняя ищетъ на небольшомъ разстояніи впереди охотника, который идетъ за нею, держа обѣими руками конецъ палки и стараясь, чтобы сѣть была возможно ближе къ собакѣ. Какъ только послѣдияя вспугнетъ перепелку, охотникъ немедленно покрываетъ ее сѣтью. Охота эта очень добычлива, по требуетъ со стороны охотника неослабиаго вниманія и ловкости.

Еще оригинальнъе охота съ "чирахомъ и колокольчикомъ", которую описываетъ для Кубы г. Щ—въ.

"Чирахъ — глиняный сосудъ, имъющій форму женской ботинки съ двумя отверстіями — одно сверху, въ которое наливается черная нефть, другое—на носкъ, въ которое вкладывается фитиль изъ мочалы, неньки и т. п., а чаще и совству безъ фитиля. Эта лампа мъстнаго приготовленія обыкновенно употребляется туземцами вм'єсто світчи. Ловець-охотникъ, при закатъ солица, выслушиваетъ около хлъбныхъ полей, гдѣ больше кричатъ перепела, и остается здѣсь ждать, покуда стемн'ветъ. Зат'вмъ, разставивъ сътку такъ, чтобы удобно было сверху накрыть подобжавшую птицу, онъ, какъ только стемиветъ, зажигаетъ "чирахъ" и начинаетъ звонить въ колокольчикъ. Огонь и звонъ колокольчика, при окружающей тиннить, имъють на перепеловъ поразительное и необъяснимое дъйствіе, нбо они, услыхавши звонъ, какъ сумасшедшіе, одшь за другимь, бітуть на огонь, подбітая подъ стку, которою ихъ и накрывають; доставая потомъ оттуда живьемъ, въ разъ иногда 3-4 нітуки, ихъ кладутъ преспокойно въ мізшокъ и снова настораживаютъ сътку, снова звонять и снова накрываютъ и опускають въ менюкъ новыя жертвы, пока ловецъ не удовлетворится количествомъ добычи, которая зависить отъ умфнья выбрать мфсто и ловкости накрывать подбъжавшихъ подъ сътку перепеловъ. Случается, что послф 2—3 часовъ такого лова охотникъ возвращается съ 15—20 перепелами въ мфикф; самая неудачная охота но количеству бываетъ 5—8 штукъ".

Наконецъ, послъдній, заслуживающій упоминанія способъ ловли перепеловъ, практикуемый крымскими татарами, описывается слъдующимъ образомъ у г. Гребенки.

"Къ осени, —пишетъ онъ, —перепела становятся очень жирны и, должно полагать, по этой причинѣ неохотно подымаются, боясь, что во время тяжелаго ихъ лета могутъ легко попасть въ когти ястреба; особливо они близко подпускаютъ къ себѣ животныхъ, такъ что часто лошадь переступаетъ перепелку, которая ни за что не рѣшается оставить своего мѣста, и прильнувъ къ землѣ, робко слѣдитъ за движеніями четвероногаго и только тогда выпархиваетъ, когда видитъ прямо надъ собою копыто, готовое раздавить ее. Пользуясь этимъ свойствомъ перепелокъ, крымскіе татары изобрѣли особенную сѣть, которою ловятъ перепелокъ въ неимовѣрномъ количествѣ.

"Съть вывязывается изъ сученыхъ нитокъ въ видъ конуса, аришна два съ половиной въ вышину, и въ основании привязывается къ желъзному обручу, вершковъ двънадцати; въ серединъ съти прикръпляется другой легкій деревянный обручъ, сообразный діаметру съти въ томъ мъстъ; вершина связывается веревочкой и — съть готова.

"Осенью, когда посѣщаютъ Крымъ многочисленныя стада перепелокъ, летящихъ далѣе на югъ, за море, татары отправляются верхомъ на поля за перепелками, держа въ правой рукѣ описанную выше сѣть, собранную въ руку посредствомъ веревочки. Увидя перепелку, что очень легко при обозрѣніи кругомъ поля съ лошади, татаринъ подъѣзжаетъ къ ней, сразу останавливаетъ лѣвой рукой лошадь, и въ то же мгновеніе выпускаетъ сѣть, вершина которой постоянно привязана у него къ большому пальцу; желѣзный обручъ, по своей тяжести, быстро опускается внизъ и накрываетъ сѣтью перепелку, а испуганная птица, вспорхнувъ кверху, попадаетъ въ вершину конуса сѣтки, т.-е. прямо въ руки охотникъ; охотникъ вынимаетъ ее, прячетъ въ мѣшокъ и, подобравъ сѣть, попрежнему ѣдетъ далѣе. Этимъ способомъ ловитъ иногда въ день одинъ человѣкъ по сту и болѣе перепелокъ".

Кромѣ того, перепелокъ ловятъ спльями, которые разставляютъ въ клеверныхъ и другихъ поляхъ, и травятъ ястребами. Послѣдній способъ охоты я не описываю, такъ какъ онъ практикуется преимущественно нашими инородцами. Вмѣстѣ съ тѣмъ, если описыватъ травлю ястребами перепеловъ, надо вообще говорить объ охотѣ съ ловчими птицами, а эта охота у насъ почти не существуетъ, да и вообще ранѣе другихъ видовъ охоты отжила свой вѣкъ.

Такъ какъ перепела добываются въ очень большомъ количествъ, они имъютъ немаловажное значение для населения, но вслъдствие своей дешевизны не столько въ качествъ продажной дичи, сколько въ качествъ провіанта для самихъ ловцовъ. Однако въ этомъ отношеніи промысловое значеніе у насъ перепела далеко не такъ велико, какъ на итькоторыхъ островахъ и побережьи Средиземнаго моря, гдъ перепела для населенія значатъ почти то же, что сельди и треска для прибрежныхъ жителей съверной и западной Европы.

80. Куропатка сѣрая. Perdix cinerea, Briss.

Табл. 85.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 527.

Болѣе распростр. названія: куропатка, страя куропатка.

Мѣстныя названія: полевой, польской, овинный рябчикъ (Пермск. губ.); рябчикъ голеножки (тамъ же); слободской рябчикъ (въ Тагилъ); полевой, степной рябчикъ (въ Сибири); куринки, куриньянки (Малоросс.).

Польск.—kuropatwa.—Фин.—turkinpyy.—Эстоп.—nurm kana, pöld pü—. Латыш.—lauka-irbe.

Татар. — бусюрг. — Башк. — буджург. — Қиргиз. — тинтг. — Қалмың. — утоенг. істтонг. — Мордов. — пуа. — Арм. — калавг.

Соединеніе въ куропаткъ крайней степени довърчивости или, какъ обыкновенно говорятъ, глупости вмѣстѣ съ весьма большой способностью размножаться въ короткое время въ значительномъ числъ дълаетъ то, что чрезвычайно трудно даже приблизительно указать для даннаго времени, гдв эта птица редка и гдв обыкновенна. Вообще говоря, распространение у насъ куропатки очень общирно, такъ какъ съверная граница ея области поднимается въ Финляндіи до 66° с. ш. и въ Архангельской губ. по Двинъ до 64° с. ш.; но къ востоку отсюда съверный предълъ распространенія куропатки быстро понижается и на Кам'в едва ли идетъ съвернъе 58½° с. ш., ближе къ Уральскому хребту спускается еще южиће, а на восточномъ склонъ доходитъ только до 56%. Къ югу отсюда куропатка распространена повсемъстно, за исключениемъ песчаныхъ пространствъ въ юго-восточномъ углу страны и сплошныхъ лѣсныхъ областей, но въ разные годы численность птицы въ одномъ и томъ же мъстъ подвержена большимъ колебаніямъ. У куропатки три главныхъ врага: суровая, сифжная зима, ястребъ-тетеревятникъ и человфкъ. Въ холодную и снѣжную зиму птица не можетъ найти себѣ корма въ открытомъ поль, волей-неволей приближается къ жилищамъ человъка и здъсь безжалостно истребляется послъднимъ. Но если при снъжной зимъ морозы чередуются съ оттепелями, тогда куропаткъ плохо приходится

и безъ участія человъка: забравшись при оттепели въ снѣгъ, эти птицы не могутъ выбиться наружу, если поверхность его быстро скуетъ морозъ, и гибиутъ отъ голода подъ снѣгомъ. Наконецъ, ястребъ всегда истребляетъ куропатокъ во миожествъ.

Въ литературъ существуютъ для разныхъ мѣстностей весьма многочисленныя свъдънія о временномъ уменьшенін и даже почти полномъ исчезновении куропатокъ, при чемъ обыкновенно указывается, что послѣднее бываеть въ результатѣ не одной, а двухъ неблагопріятныхъ зимъ. Но вифстф съ трмъ изъ этихъ сообщений следуетъ и то, что если въ извъстномъ участкъ хотя немногимъ парамъ куропатокъ удалось пережить тяжелыя времена, онъ быстро размножаются и черезъ 10—15 лѣтъ являются столь же многочисленными, какъ были прежде. Кром'в того, изв'встную м'встность даже искусственно нетрудно заселить куропатками: для этого стоитъ только весною выпустить здёсь нёсколько паръ. Этимъ пріемомъ охотники часто пользуются съ двоякой цълью: съ одной стороны, чтобы просто развести коропатокъ, съ другой—чтобы приготовить себф на осень хорошую охоту. Но для того, чтобы не было обманутыхъ надеждъ, одновременно съ разведеніемъ куропатокъ надо заботиться о двухъ обстоятельствахъ: объ истреблении хищныхъ птицъ и объ охранъ куропатокъ отъ промышленника.

Въ виду сказаннаго совершенно возможно, что куропатка, какъ гласитъ преданіе, была ввезена въ Петербургскую губ. при императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, или Екатеринѣ II, и уже отсюда разселилась по Финляндіи. Съ другой стороны, расчистка лѣса на сѣверѣ также представляетъ удобство для куропатки, которая достигла до Архангельска только въ семидесятыхъ годахъ XIX столѣтія.

Чтобы покончить съ распространеніемъ описываемой птицы, остается сказать, что будучи очень многочисленной на сѣверномъ Кавказѣ, она распространена спорадично въ Закавказъѣ и не переходитъ къ югу за горы Арменіи.

Въ средней Россіи любимое мѣсто жительства куропатокъ составляютъ поля, чередующіяся съ кустарниками и мелколѣсьемъ, въ южной—поля или степи, пересѣченныя балками, заросшими терномъ и высокимъ бурьяномъ, или разнообразящіяся кустарниками и лѣсочками. Равнымъ образомъ любятъ куропатки степные сады, и вообще было бы ошибочно думать, что эта птица избѣгаетъ, лѣсовъ: большихъ конечно избѣгаетъ, но разсѣянныхъ въ открытой мѣстности лѣсныхъ колокъ, уремъ и даже боровъ отнюдь не избѣгаетъ. Въ глубину ихъ она тоже не заходитъ, по на опушкѣ охотно держится, вѣроятно чувствуя себя здѣсь въ большей безопасности отъ ястреба. Подобно перепелу, куропатка совершенно наземная птица, отлично бѣгаетъ, превосходно роется въ землѣ и обладаетъ очень сильнымъ и быстрымъ полетомъ. Поднимаясь, производитъ такой шумъ, что даже путаетъ неожидавшаго этого взлета охотника, на лету быстро машетъ крыльями, производя ими характерный звукъ, и летитъ не-

высоко надъ землею; собпраясь състь, пролетаетъ нъкоторое разстояніе совершенно не шевеля крыльями. Впрочемъ, куропатки летаютъ только когда отправляются съ мъста ночлега на мъсто кормежки, или обратно, и въ случат преслъдованія человъкомъ. Большую же часть своей жизии онъ проводять на земль, или перебъгая съ мъста на мъсто въ поискахъ за кормомъ, или просто отдыхая, или роясь въ земль, подобно курамъ. На послъднихъ онъ походять вообще всъми своими привычками, равно какъ и голосомъ. Найдя, напр., кормъ, онъ начинаютъ клевать его, кудахча совершенно по куршюму, только тише и мелодичиње. Если куропатка замътитъ ястреба, она издаетъ предостерегающій пискъ, опять-таки напоминающій пискъ куръ въ соотвътствующихъ обстоятельствахъ. Но тревожный крикъ куропатки отличенъ отъ куринаго. Любимый кормъ куропатки—просо и гречиха, но когда его нътъ, опъ таять зерна другихъ хлъбовъ, съмена сорныхъ травъ, червяковъ и насъкомыхъ.

Кром'в брачнаго періода, куропатки живутъ стаями, иногда довольно значительными. Но какъ только на поляхъ появятся проталицы, что въ южной Россіи бываетъ уже въ половин'в марта, стаи разбиваются на пары, которыя занимаютъ м'вста своихъ будущихъ гн'вздовій, опушки мелкихъ л'всныхъ порослей, балки съ териовниками, уремы и просто озимыя поля. Самцы, не нашедшіе себ'в дружекъ, живутъ, гдѣ случится, летаютъ всюду, но легко находя кормъ, не приближаются къ жилью человѣка. Съ м'всяцъ живутъ пары, не приступая къ гнѣздовитію, вѣроятно, вслѣдствіе еще довольно сильныхъ утренниковъ, и все это время самецъ не оставляетъ самку, а повсюду слѣдуетъ за нею и обнаруживаетъ къ ней самую упорную привязанность.

Гнъздиться парочки начинають только въ мат, въ началъ, половинъ или концѣ этого мѣсяца, смотря по положенію мѣста; но очень можетъ быть, что на югѣ гнѣздовой періодъ начинается и раньше, уже въ концѣ апрѣля. Гнѣздо располагается подъ кустикомъ, бурьяномъ или просто въ хлѣбѣ и представляетъ собою неглубокую ямку, слегка выстланную и обложенную по краямъ перьями и пухомъ птицы. Число ящъ въ кладкъ варьируетъ очень сильно; молодыя самки кладутъ 12—15, старыя—отъ 15 до 20 и даже до 24. Яйца блѣдно-оливковаго цвѣта, имѣютъ въ длину 1,5—1,3 д. и въ поперечникѣ 1,15—1,05. Насиживаніе продолжается около трехъ недѣль, и большинство куропатокъ выводится въ средней и южной Россіи въ іюлѣ, опятьтаки въ разныя числа, въ зависимости отъ того, когда происходила кладка. Птенчики начинаютъ бъгать и порхать за стариками какъ только обсохнутъ по выклюнутін изъ яйца, а спустя нѣсколько дней начинаютъ даже перелетывать на небольшое пространство. Отецъ и мать одинаково заботятся о выводкъ, всячески охраняютъ его и не оставляютъ даже на короткое время. Первыя недъли они не уводятъ птенцовъ далеко отъ кустовъ, травы или хлѣба, чтобы въ случаѣ опасности было гдв ихъ спрятать, но и при этомъ выводки часто

попадаются лисамъ, хорькамъ и другимъ четвероногимъ хищникамъ, не говоря уже о пернатыхъ. Первымъ начинаетъ отводить отъ выводка самецъ, совершенно забывая о своей безопасности, и за это часто платится своей жизнью. Мъсяцъ спустя, когда птенцы уже достаточно подрастуть, старики начинають водить ихъ опредъленно на кормежку въ болъе отдаленныя отъ ночлеговъ мъста, и такимъ образомъ начинаютъ складываться суточныя кочевки выводковъ. День куропатки проводять въ лъсочкахъ, балкахъ или болотахъ, но передъ вечеромъ старики голосомъ собираютъ молодыхъ, которые уже отходять отъ нихъ на изсколько саженей, и всфиъ выводкомъ летятъ на ближайшее скошенное хлюбное поле. Здъсь онъ остаются до позднихъ сумерекъ, затъмъ старики сзываютъ молодежь и улетаютъ съ нею на ночлегъ на открытыя мъста, на пригорки или къ лъснымъ онушкамъ. На другой день выводокъ поднимается еще до зари, летитъ кормиться обыкновенно въ болфе удаленныя мфста и здфсь остается сравнительно долгое время, пока его не потревожатъ люди или пока не начнетъ припекать солнце. Тогда куронатки улетаютъ на весь день, до вечерней экскурсій, въ болбе укромныя мъста, но если въ поляхъ остается нескошенный хлъбъ, или хотя и скошенный, но не связанный, охотно цълыми часами остаются здъсь. Эти, сравнительно небольшіе, перелеты на мъста кормежекъ выводки дълаютъ до тъхъ поръ, пока хажба не будуть совствиь убраны, посать чего имъ приходится летать кормиться пногда за нъсколько версть отъ мъста почлега, и, наконецъ, совершенно отбиваться отъ него и ночевать гдв придется, такъ какъ доставать кормъ становится вся трудиве и трудиве.

Выше уже было сказано, что любимый кормъ куропатокъ составляють просо и греча, изъ которыхъ первое, какъ извъстно, сильно осыпается при косьбъ. Благодаря этому тамъ, гдъ съютъ просо, т.-е. въ южной Россіи, куропатки кормятся имъ съ уборки хлѣбовъ почти до заморозковъ. Но послъ довольно сильныхъ морозовъ, когда просо примерзаетъ къ мокрой землъ, куропаткъ уже трудно его взять. Поэтому до поздней осени въ южной Россіи куропатки держатся около просяныхъ полей, а поздиве, съ 20-го приблизительно поября, переселяются къ болотистымъ порослямъ (уремамъ), гдв остается много некошенныхъ бурьяновъ и сорныхъ травъ (лебеда, щавель), сфменами которыхъ эти птицы кормятся. Въ такихъ мъстахъ, если зима не сибжная и ибть сильныхъ морозовъ, куропатки остаются до начала марта, пребывая въ полной безопасности отъ петель и сътей промышленинка, тъмъ болъе, что во-1-хъ эти мъста удалены отъ жилья, а во-2-хъ куропатки не держатся здъсь около одного мъста, а кормятся повсюду. Не то въ средней и восточной Россіи: здѣсь куропаткамъ становится голодно уже съ начала осени, а раннее выпаденіе снъга, особенно въ восточной Россіи, не только липаетъ ихъ такихъ надежныхъ прикрытій, какъ бурьянъ и кустарныя заросли, по отнимаетъ возможность находить кормъ въ обычныхъ мъстахъ и заставляетъ сначала выбътать на дороги, а затълъ подходить и къ жилью человъка, слъдовательно къ губительнымъ петлямъ. Пока сиътъ петлубокъ и рыхлъ, куропатки легко добываютъ себъ кормъ изъ-подъ пето, разрывая его пожками; но чъмъ больше его выпадаетъ, тъмъ печальнъе становится положеніе этихъ птичекъ. Обыкновенно еще до разсвъта прилетаютъ куропатки на гумна, кормятся здъсь часовъ до десяти, если ихъ не сгонятъ, затъмъ улетаютъ куда-инбудь въ мелколъсье, а подъ вечеръ опять возвращаются на гумно, гдъ остаются до ночи. Ночь проводятъ забиваясь въ сиътъ, какъ тетерева, если же поднимается метель, прячутся въ кучи соломы, подъ клади и т. п.

Въ кошть йоля или въ августь на югь, въ половинь сентября въ средней Россіи молодыя куронатки догоняють въ рость старыхъ, по пока линька не кончена, легко узнаются по остаткамъ перваго наряда, а по ея окончаніи становятся уже не отличимы отъ старыхъ. Въ кошть же льта выводки начинаютъ сходиться вмъсть и этимъ кладется начало осеннимъ, а поздиве зиминмъ стаямъ куронатокъ. Какъ огромное большинство осъдлыхъ птицъ, куропатка въ неблагопріятное время года ведетъ кочевую жизнь, странствуя съ мъста на мъсто на цълыя версты. Но въ самой южной полосъ Россіи эти кочевки совершаются съ гораздо большей правильностью, чъмъ обыкновенно, и производятъ внечатлъніе настоящихъ перелетовъ.

Первый обратиль на это внимание г. Давидовичь, указавь, что одесскіе охотшики наблюдають осенній и весенній палеть куропатокъ и думають, что осенью онт улетають за море, а весною прилетають оттуда. Затъмъ, С. Н. Алфераки, еще ранъе упоминавшій объ осеннемъ дет в куропатокъ подъ Таганрогомъ съ востока на западъ, высказался объ этомъ гораздо опредълениће, въ дополнение къ замъткъ г. Давидовича. Но его словамъ, летомъ подъ Таганрогомъ почти нетъ куронатокъ, а въ концѣ сентября и въ октябрѣ онѣ въ большомъ количествѣ появляются въ окружающихъ степяхъ, становясь предметомъ оживленной охоты. Куропатки эти меньше мъстовыхъ и положительно накочевывають съ востока, почему ихъ отличають подъ особымъ назвапіемъ "киргизокъ". Қъ концу октября большинство этихъ куропатокъ улетаетъ и, какъ думаетъ С. Н. Алфераки, именно эти куропатки появляются поздите въ Германіп и даже Франціп. Фактъ осенняго пролета куропатокъ наблюдается по всему съверному побережью Азовскаго моря, но что касается весенняго возвратнаго прилета, то здъсь никто его не наблюдалъ. Позднъе эти свъдънія были дополнены еще другими лицами, сообщавшими о перелетахъ куропатки въ долинѣ Волги и въ области Войска Донского, и послужили для нѣкоторыхъ поводомъ говорить о настоящихъ перелетахъ куропатокъ и даже утверждать, что причина этихъ перелетовъ заключается въ восточныхъ вътрахъ, которые зимою приносятъ съ собою въ восточную Россію невыносимые сибирские морозы и выоги. Однако, едва ли о такой причинъ можно говорить серьезно, если вспомнить, что куропатки преблагополучно выносять вст эти будто бы невыносимыя условія зимняго существованія въ Оренбургской губ. и юго-западной Сибири. Что же

касается самаго факта перелетовъ, то, не отрицая справедливости относящихся сюда наблюденій, я продолжаю думать, что это чисто мъстное, но ръзко выраженное явление кочевокъ. О такихъ переселеніяхъ осенью къ берегу моря говоритъ г. Шершеневичъ для Херсонской губ.; о перелетахъ куропатокъ изъ приволжскихъ степей въ займище еще ранъе сообщалось въ хорошей стать в, посвященной описанію охоты въ Астраханской губ. и пом'вщенной въ журналь "Природа и Охота" за 1878 г. Что здѣсь нѣтъ правильнаго перелета, я вывожу изъ того, что въ разныхъ мѣстностяхъ куропатки слѣдуютъ въ совершенно различныхъ направленіяхъ. Наконецъ, о весеннемъ возвратъ этихъ птицъ никто не говоритъ, кромъ одесскихъ охотниковъ, что указываетъ на постепенный возвратъ куропатокъ на родииу, въроятно, въ теченіе довольно продолжительнаго періода. Что же касается одесскихъ наблюденій, то быть можетъ тамъ весенній возвратъ рѣзче выраженъ благодаря, съ одной стороны, пустынности здъсь черноморскаго побережья, съ другой-близости Бессарабіи, какъ зимней станціи для кочевыхъ птицъ.

Было бы важно составить болже опреджленное представленіе о появленіи такъ называемыхъ восточныхъ куропатокъ въ западной Европж, но для этого нжтъ данныхъ, что равносильно указанію на неправильность и непостоянство этого явленія.

Въ заключение описания образа жизни куропатокъ скажемъ нъсколько словъ объ ихъ разведении тамъ, гдф ихъ выбиваютъ или вылавливаютъ. Ловить этихъ птицъ надо зимою, а выпускать довольно поздно, когда снѣгъ уже растаетъ. Въ тепломъ помѣщеніи держать ихъ отнюдь не должно — въ теплѣ онѣ захирѣютъ, лучше всего для этого имъть отдъльный сарайчикъ, куда нътъ надобности входить по другимъ дъламъ, такъ какъ куропатки пугливы, и сюда приносить имъ кормъ и воду или снъгъ для питья. Хотя С. Т. Аксаковъ высказалъ убъжденіе, что куропатку легко сдълать домашнею птицей, однако едва ли это върно; по крайней мъръ пойманныя взрослыми, онъ остаются пугливыми и дикими, сколько бы ни сидъли. Такъ какъ при неосторожномъ входф въ ихъ помъщение куропатки срываются съ мфста и, ударяясь головами о потолокъ и ствны, могутъ разбиться на смерть, противъ этого надо принимать мѣры или кладя въ сарай кучу хвороста, или соломы: въ такомъ случаѣ, увидя входящаго человъка или даже заслышавъ шумъ, куропатки не взлетаютъ, а бросаются подъ хворость или зарываются въ солому. Когда настанеть время выпускать куропатокъ, ихъ отнюдь не надо ловить руками, такъ какъ при этомъ онть опять изобыются, а крыть въ сарат сттью. Заттых пойманныхъ отнести на мѣсто подъ вечеръ и, чтобы не пугать собою, не вынимать изъ корзинки, или ръшета, или кузова, а поставивъ то или другое съ куропатками на землю, отойти на изв'встное разстояние и поднять крышку или всю корзинку бечевкой. Каждая пара выпускается отдъльно, не близко отъ другой и, если мъстность благопріятна, въ первое же льто даеть хороний приплодъ. Выпущенныя куропатки,

самець и самка, не уходять далеко, а перекликаясь отбъгають лишь немного. Но изкоторые охотники совътують, чтобы куропатки лучше привыкли къ мъсту, смазывать имъ крылья передъ выпускомъ жидко разведенной глиной; засохнувъ, глина не даетъ итицъ летать, а потомъ при первомъ же дождъ размокнетъ и свалится. Однако, едва ли этотъ пріемъ удаченъ: у куропатки много враговъ, и если птица въ теченіе изсколькихъ дней будетъ лишена способности летать, она легко сдълается добычей лисицы, хорька или другого какого хищинка. Гораздо лучше, чтобы куропатки не убъгали далеко отъ того мъста, гдъ ихъ выпустили, заблаговременно насынать для нихъ тамъ и сямъ корма.

Обращаясь теперь къ охоть за куропатками, надо сказать, что настоящая охота за инми существуетъ только одна: обыкновенная ружейная охота съ собакой, но что касается промысловой охоты, то ея способы довольно многочисленны.

Съ конца іюля обыкновенно начинають охоту за выводками куропатокъ. Хотя въ это время молодые летаютъ уже бойко, однако старики еще продолжають свои заботы о нихъ и потому весь выводокъ довольно легко дается въ руки охотника. Обыкновенно какъ только собака поведеть къ выводку, самецъ сейчасъ же начнетъ вертъться передъ ней, чтобы отвести ее въ другую сторону, и опытный охотникъ, направившись въ другую сторопу, безъ труда разыщетъ матку и молодыхъ. Поздиће выводокъ, найденный собакой или охотникомъ, срывается весь, обыкновенно вит выстрта, и улетаетъ по прямому направленію, чтобы укрыться за пригоркомъ, въ некоси или бурьянъ. Но онъ улетаетъ недалеко и найти его вторично не трудно; а найденный, на этотъ разъ подпускаетъ ближе и часто поднимается не сразу, а по 2, по 3 штуки. Въ такомъ случат стрълять легко, такъ какъ если птицы взлетаютъ поодиночкт или въ небольшомъ количествѣ одновременно, подойти къ нимъ и перебрать ихъ всѣхъ не составляетъ труда. Задача охотника состоитъ въ томъ, чтобы разбить выводокъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ это положительно не удается. Конечно, причина этому бываетъ та, что птицы уже раньше были напуганы преслѣдованіемъ и даже выстрѣлами, и потому такую стаю лучше на нѣсколько дней оставить въ покоф. Иногда куропатка, найденная собакой, не выдерживаетъ стойки и не взлетаетъ, а просто уходитъ; тогда, замѣтивъ такую продѣлку, надо, оставивъ собаку на мъстъ, зайти куропаткъ навстръчу и этимъ заставить ее подняться. Вообще охота за куропатками, начиная съ конца сентября, когда молодыя перелиняли и выводки состадились, вовсе не всегда можетъ считаться изъ легкихъ, т.-к. найти куропатокъ можно только при хорошемъ знаніи мъстности или исходивъ много десятинъ. Надо помнить, что въ это время онт все еще охотно постащаютъ хлтабныя поля, особенно десятины изъ-подъ гречи и проса, а разъ найденную и ненапуганную стаю на мъстъ кормежки стрълять легко. Но если такихъ десятинъ нѣтъ, куропатки не разъ убѣгутъ незамѣченными, т.-к.

усмотръть ихъ въ травъ, между кустарниками и даже въ высокомъ жнивът дъло трудное. Напротивъ, по первому снъгу очень удобно находить куропатокъ, какъ потому, что онъ гораздо замътнъе, такъ и нотому, что оставляютъ слъды. Стая куропатокъ бъжитъ широко, слъдовательно найти ея слъды легко; по найти стаю еще не значитъ взять ее. Обыкновенно она поднимается, не подпустивъ на выстрълъ, или сначала куропатки разбъгаются, а потомъ поднимаются разомъ; въ такомъ случать хорошо если удается выстрълить и свалить одну—двухъ. Но если удалось такъ или иначе разбить стаю, тогда при терпъніи можно перебрать большую часть ея. Зимою, когда куропатки привыкнутъ летать кормиться на гумпа, ихъ можно стрълять здъсь просто подкарауливая въ извъстное время, но едва ли такая охота можетъ представлять интересъ.

Затъмъ, что касается промысловаго добыванія куропатокъ, то ивкоторые способы удивительно примитивны. Таково, напр., добывание на приваду, практикуемое въ Перниговской и другихъ губерніяхъ. Когда выпадеть глубокій сивгь, и куропатки начнуть посівщать гумна, промышленникъ, выбравъ недалеко отъ гумна мъсто, посыпаетъ его нъсколько дней подъ рядъ мякиной. Когда куропатки привыкнутъ къ этой привадъ и начнутъ летать сюда ежедневно, промышленникъ посыпаетъ гречихою узкую дорожку отъ привады черезъ отверстіе въ воротахъ во внутрь гумна. Куропатки, прилетъвъ на приваду и замѣтивъ гречиху, начинаютъ поклевывая подвигаться по дорожкѣ къ воротамъ, проходятъ черезъ отверстіе въ шихъ и вбѣгаютъ на гумно. Тогда наблюдавний за этимъ промышленникъ съ шумомъ отворяетъ ворота и входитъ на гумно, что, какъ говорятъ, до того поражаетъ куропатокъ, что онъ, потерявъ всякое сознаніе, прячутся въ солому и позволяють не только убить себя палкою, по даже взять живьемъ руками.

Съ привадой же связана и ловля сътью или шатромъ, представляющая собою видоизм'вненіе ловли шатромъ тетеревовъ, хотя м'встами (въ восточной Россіи) куропатокъ кроютъ и настоящимъ тетеревинымъ шатромъ, что темъ легче, что опъ очень легко идутъ на приваду и подходять подъ шатеръ уже на другой, много на третій день. Обыкновенно же это добывание производится такъ. Какъ только выпадетъ сифтъ, промышленникъ, захвативъ съ собой пукъ немолоченной гречишной соломы, объдзжаетъ всв любимыя мъста куропатки, какъ-то явски, ложки, бобники и т. д. Найдя сявды этихъ итицъ, онъ кладеть на нихъ пукъ гречинной соломы — приваду — и ѣдетъ дальше, чтобы повторить то же самое въ другихъ мъстахъ. На другой день онъ отправляется (опять-таки въ саняхъ) повърять приваду, оправляетъ солому, если была мятель или поземка, и старается раземотрѣть, не было ли на ней куропатокъ. Обыкновенно это не составляетъ труда, т.-к. куропатки не только истопчутъ снѣтъ около соломы, но разроютъ, разбросаютъ ее, и при иткоторой опытности можно даже опредалить приблизительную численность табуна, подходившаго къ

привадъ. Замътивъ, что куропатки были на какой-пибудь привадъ, промышленникъ подкладываетъ сюда еще соломы, насыпаетъ гречихи, а другія привады уничтожаєть. Благодаря своей привязанности къ мъсту, куропатка, найдя изобильную пищу, придетъ сюда и на другой и на третій день, а промышленникъ, подложивъ корму еще разъ-другой, черезъ педівльку, а то и раньше принимается за довлю. Снасть его очень проста: взявъ большой обручъ аршина въ два-три въ діаметрф, опъ натягиваетъ на него съть, и такъ называемый шатеръ готовъ. Въ извъстный день, забравъ его, промышленникъ еще до разсвъта отправляется къ привадъ, ставитъ надъ ней шатеръ, подипрая одну его сторону налочкой, отъ этой налочки протягиваетъ къ ближайшему кусту бечевку, а въ кустъ прячется самъ. Какъ только наступить сърое зимнее утро, куропатки туть какъ тутъ: нерегоняя другь друга, бъгуть опъ къ привадъ, но замътивъ незнакомый предметь, останавливаются и изкоторое время не рышаются идти далже. Если вътеръ кольшетъ сътью, итицы могутъ даже отлетъть въ сторону, по это шичего: спустя немного времени, онъ подбъгаютъ къ привадъ опять и наконецъ та, которая поголодифії, рфивется взоїти подъ шатеръ. За ней подбътаютъ и остальныя и, какъ только стадо собралось подъ шатромъ, промышленникъ дергаетъ веревку и стремительно бросается на куропатокъ, чтобы расправиться съ пими по-своему, т.-к. онв очень сплыны и въ случав промедленія съ его стороны не только могутъ поднять шатеръ, но и разорвать съть. Этотъ способъ лован очень губителенъ, т.-к, имъ уничтожается стадо за стадомъ. Если итвсколько штукъ и спасется отъ нерваго покрытія, черезъ 2—3 дня оп'в опять прибъгутъ на приваду и промышленникъ все-таки изловитъ ихъ.

Не менъе пожалуй губительна и ловля сильями или петлями, практикуемая въ южныхъ губерніяхъ. На шнурокъ, длиной въ аршинъ, привязывается отъ пяти до десяти волосяныхъ петель и концы этого шнурка привязываютъ къ кустамъ терна, преимущественно на дорожкъ, ведущей во внутрь куста. Обвязавъ такимъ образомъ кругомъ всъ кусты, находящеся въ балкъ, охотникъ отправляется на лошади, запряженной въ саночки, въ степь и, завидя куропатокъ, которыхъ по снѣгу видно далеко, старается согнать ихъ съ противоположной кустамъ стороны. Согнанныя такимъ образомъ куропатки летятъ въ балку, чтобы скрыться въ кустахъ, и, какъ извъстно, передъ кустомъ всегда садятся на землю и потомъ уже бъгутъ въ кустъ. Вотъ эта-то минута и есть самая губительная для куропатокъ: пробъгая подъ шнуркомъ (на петли куропатка не обращаетъ вниманія), она головой захватываетъ петлю и остается тутъ же на мъстъ. Подобное добываніе возможно только по снѣгу, а чтобы судить о настойчивости промыпіленника, достаточно сказать, что пногда въ одной балкъ обвязываютъ до 500 кустовъ, что считая по 5 петлей на шнуркѣ, даетъ 2500 петель. Этотъ способъ, губительный самъ по себъ, не хорошъ еще тъмъ, что много пойманныхъ куропатокъ пропадаетъ безъ пользы заметенныхъ снѣгомъ, а другихъ растерзываютъ лисицы и особенно

ястреба, которые, разъ замѣтивъ такое мѣсто, гдѣ ловятся куропатки, съ трудомъ могутъ быть отогнаны отсюда. Въ средней Россіи петли ставятъ въ рядъ около кустовъ, а не на самые кусты.

Ловля шатромъ или сѣтью и петлями можетъ считаться общераспространенной, но въ низовьяхъ Волги куропатокъ ловятъ еще перевъсными съвтями и вентеремъ. Осенью куропатки начинаютъ перелетать изъ степей въ займище (долина Волги) и вотъ тогда-то жители праваго берега Волги, Камышинскаго и Царицынскаго уѣздовъ, разставляютъ сѣти вдоль берега Волги надъ обрывомъ, въ вертикальномъ положении, и ожидаютъ вечера, когда стаи куропатокъ, одна за другою, летятъ въ займище. Нѣкоторыя стаи, конечно, благополучно минуютъ сѣти, другія же попадаютъ въ нихъ цѣликомъ. Тогда промышленникъ быстро набрасывается на попавшихся, самымъ грубымъ образомъ придушиваетъ ихъ и, поправивъ сбившуюся и спутавшуюся сѣть, попрежнему припадаетъ поодаль къ землѣ, въ ожиданіи новой добычи.

Что касается добыванія куропатокъ вентеремъ, то я приведу слѣдующее полное описаніе этого способа ловли, сдѣланное анонимнымъ авторомъ въ журналѣ "Природа и Охота" за 1885 г.

"Вентеремъ называется круглая сътка, вродъ кишки, длиною саженъ въ десять. Устье этой киники представляетъ круглое отверстіе въ поларшина въ діаметрѣ, а хвостъ, постепенно суживаясь, сходитъ, какъ говорятъ мужички, на-нътъ и сплетается въ бечевку, привязанную къ прочному и острому колышку. Чтобы кишка эта не сплющивалась, она растопыривается обручиками изъ ивовыхъ или еще лучше таволожновыхъ прутиковъ. Обручики уменьшаются постепенно въ діаметръ по мъръ приближенія къ хвосту вентеря. Къ устью вентеря прикрапляются съ обанхъ сторонъ крылья, или узкія сътковыя полосы, саженъ по 10 въ длину и даже болъе каждая. При установкъ вентеря крылья, легонько натягивая, отводятъ отъ него въ стороны по круговой линіи, стараясь охватить возможно большее пространство. Сътка крыльевъ прикръпляется къ ивовымъ прутикамъ, которые втыкаются въ землю и поддерживаютъ сътку. Въ самомъ усть вентеря придълывается вмъсто обручика дужка, то же изъ нвы или таволожки; концы этой дужки обхвачены всегда остроконечными колпачками изъ листового желъза и имъютъ видъ копій. Дълается это съ цълью болве легкаго втыканія дужки въ землю при ставленін вентеря Къ вентерю для ловли необходимъ щитъ. Такъ называется ишрокій кусокъ холста, вродѣ небольшой (примѣрно въ полчеловъка) скатерти, принитый къ двумъ палкамъ, которыя могутъ распяливаться третьей, помѣщаемой перпендикулярно къ нимъ и между ними. Одинъ конецъ этой распорки дѣлается съ уступомъ и втыкается натуго въ выдолбленную пазуху нижней палки, а другой, свободно входить въ отверстіе, продъланное въ верхней щитовой палкъ, и выдается поверхъ ее. Надъ этимъ выдающимся концомъ пристраивается искривленный немного рычажокъ, съ однимъ концомъ

свободнымъ, а другимъ прикръпленнымъ къ шарниру на верхней нитовой палкъ. Противъ свободнаго его конца придълывается на концъ той же палки ремениая петля. Когда въ щитъ изтъ надобности, онъ наматывается обыкновенно на распорку въ трубку. Когда же его нужно бываетъ пустить въ дъло, полотно раскатываютъ, вбиваютъ сначала распорку въ широкое отверстіе верхней щитовой налки, потомъ вколачиваютъ другой ея конецъ въ выдолбленную пазуху нижней щитовой палки и начинаютъ нажимать рычажкомъ на конецъ распорки, высунувнийся въ отверстіе щитовой налки. Отъ этого нагнетанія распорка подается винзъ, увлекаетъ съ собою нижнюю щитовую палку и такимъ образомъ натягиваетъ полотно. Лишь только свободный конецъ рычажка будетъ пригнутъ до щитовой палки, на него насовывають ременную нетлю, и щить готовъ. Щить этотъ имътетъ назначение скрывать ловца отъ птицы. Но чтобы первый могъ видѣть послѣднюю, въ верхней половинъ щита дълается узкій прорѣзъ, чрезъ который ловецъ можетъ видъть все, что дълается передъ щитомъ. Вотъ и вся нехитрая спасть, которой ловять здѣсь куропатокъ. А ловить ихъ очень нехитро, такъ какъ довърчивъе этой птицы и найти нельзя.

"Перейду теперь къ описанію самой ловли.

"Прежде всего промышленникъ выслушиваетъ на зарѣ куропатокъ, затъмъ, если возможно, высматриваетъ ихъ, а затъмъ приступаетъ уже къ довдъ. Зная очень хороню до мельчайнихъ подробностей нравы этой птицы, онъ устанавливаетъ прежде всего вентерь въ напболъе подходящемъ мъстъ, наблюдая одно непремънное условіе-это, чтобы впереди дужки вентеря пом'єстить хоть маленькій кустикъ. Воткнувъ передъ нимъ дужку, ловецъ тянетъ вентерь за хвостъ и, натянувъ въ мъру, втыкаетъ въ землю колышекъ, къ которому привязывается хвостъ вентеря; затъмъ онъ раскидываетъ крылья. Когда все это будеть имъ сдълано, онъ заходитъ такъ, чтобы птица была между имъ и вентеремъ, и начинаетъ загонять ее. Укрываясь за щитомъ, который онъ держитъ лѣвой рукой за распорку, онъ начинаетъ подгонять куропатокъ, глядя чрезъ отверстіе и направляя ихъ въ пространство между крыльями вентеря. Согнувшись, потихоньку, еле передвигая ноги, ступаетъ онъ, легонько постукивая камешкомъ о распорку щита. Куропатки, заслыша стукъ, вначалъ безпокоятся, но не видя врага и, въроятно, принимая щитъ за большой камень, успоканваются и продолжають безмятежно пастись, направляясь, однако, въ противоположную сторону отъ мѣста, гдъ раздается странный и назойливый стукъ. Если они приняли необходимое дли ловца направленіе, т.-е. пошли въ пространство, охваченное крыльями вентеря, онъ торжествуетъ. Сердце его начинаетъ биться все сильнъе по мъръ приближенія передней куропатки къ дужкъ вентеря, руки и ноги дрожатъ; въ глазахъ помутилось, и вмъсто куропатокъ у него предъ ними мелькаютъ то огненные, то красные, то зеленые, то темные круги, и горе ему, если онъ не вы-

держить себя въ этотъ важный для него моментъ: если онъ поспъшить и сдълаеть какое-либо неловкое движеніе, или уронить изъ руки камешекъ, или стукнетъ имъ посильнъе, чъмъ надо, тогда прощай куропатки!.. вся стая пырхнетъ съ трескомъ и поминай ее какъ звали. Такая стая ръдко подходитъ въ другой разъ подъ вентерь. Но если охотникъ опытный, если опъ ужветъ владъть собою, вся стая будеть въ вентерф. Онъ не смутится даже и тъмъ, что передняя куропатка, увидъвъ сътку крыла, остановится въ недоумъніи и первинимости. Вижето того, чтобы сивинить въ этотъ моментъ загономъ, онъ, напротивъ, совершенно притихнетъ, замретъ на мѣстѣ и ждеть, что будуть дівлать куропатки. Если онів успокоятся и пойдутъ впередъ, онъ осторожно подвинется самъ и пристукнетъ камешкомъ. Теперь опъ почти увъренъ въ успъхъ... Вотъ куропатки замътили кустикъ и бъгутъ къ нему... Вотъ передняя юркнула подъ него, какъ разъ въ предательскую кишку вентеря, изъ которой нътъ возврата, если она хорошо сдълана и хорошо поставлена. Если передняя юркнула въ вентерь и ходко поина въ немъ къ хвосту кишки, вся стая будетъ тамъ. Охотнику остается только бъжать, свалить дужку вентеря и начать избіеніе добычи. По большей части это такъ и бываетъ; но случается, однако, и иначе. Юркнувъ въ кустикъ, передняя куропатка пной разъ немедленно возвращается назадъ п отводить отъ кишки всю стаю. Опытнаго ловца и это не смущаетъ. Онъ знаетъ, что главная задача его-не спутнуть куропатокъ, а потому онъ даетъ имъ свободно выйти изъ вентеря. Онъ заходить съ другой стороны, собъетъ стаю и тъмъ поставитъ впереди ея менъе разборчивую и болже довърчивую птицу и гонить ее опять въ вентерь; тогда д'вло его въ ніляп'в".

Воть и всв наиболже распространенные способы добыванія куронатокъ. Конечно, въ зависимости отъ мъстныхъ условій, практикуются и другіе, но послъдніе носятъ болже случайный характеръ. Такъ,
въ Бессарабіи осенью стръляютъ куропатокъ изъ-подъ собаки въ
кукурузникахъ, какъ и другую дичь. Охота выходитъ легкая и добычливая, благодаря простору стръльбы и обилію дичи въ кукурузникахъ, и можетъ продолжаться очень долго. Зимою стръляютъ куропатокъ, просто подъфзжая къ нимъ на саняхъ, для чего только
надо издали замътить стаю и затъмъ ъхать не прямо на нее, а слегка
въ объфздъ. Такимъ образомъ нъкоторымъ удается добытъ 7—8 куропатокъ на 1—2 выстръла по сидящей и поднимающейся стаф, но
подъфхать два раза къ одной и той же стаф не удается. Наконецъ,
итъкоторые прикармливаютъ куропатокъ на гумнахъ и стръляютъ ихъ
просто подкарауливая, когда онъ приходятъ кормиться.

Вообще говоря, такъ или иначе куропатокъ добывается много, но промысловое значеніе птицы, если можно такъ выразиться, неровное: не только для одной и той же мъстности куропатокъ добывается то много, то мало и даже совсъмъ ничего, но въ разные годы вообще количество добываемыхъ куропатокъ подвержено огромнымъ колеба-

ніямъ. Отсюда колебанія и въ цфиф: въ населенныхъ центрахъ пара куропатокъ перѣдко стоитъ 1 р. 20 к. и даже 1. 50 к., въ провищиальныхъ городахъ і р. и даже меньше, у промышленниковъ торговцы оптомъ берутъ эту птицу часто по 30 к. за нару. Въ установлении цѣны большое значеніе пмѣютъ конечно условія сбыта. Такъ, въ западной Сибири и восточной Россіи на куропатокъ всегда стоятъ болбе или менфе опредбленныя цфны; что же касается южной Россін, гдф иногда эти птицы ловятся въ огромномъ количествъ, онъ часто совстмъ не находять себт сбыта и тогда просто пропадають. Однако, въ хороніе годы южно-русскіе промышленники продають по 400-600 паръ, что даже при низкой цъпъ даетъ хорошій заработокъ. Какъ бы то ни было, промысловое значение сфрой куропатки никакъ не ниже промысловаго значенія бълой, такъ какъ качество и высокая цібна возмѣщаютъ количество, а способность этой птицы легко размножаться можетъ даже поднять ея промысловое значеніе, стоило бы только мъстнымъ охотинчынмъ обществамъ озаботнъся ея охраненіемъ для размноженія, а, если нужно, то и искусственнымъ размноженіемъ.

81. Куропатка каменная. Perdix chukar, Gray.

Табл. 86.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 533.

Болѣе распростр. названія: *каменная, горная куропатка,* также *красная куропатка* (неправильно).

Мъстныя названія: юрная курочка (у кавказ. охотник.)

Татар.— бухарск. – кекликъ. — Осет. — хуръ-гаркъ. — Груз. — какаби. — Арм. — врмиу. — Персид. — кабкъ.

Я позволю себѣ привести здѣсь описаніе распространенія и образа жизни каменной куропатки или горной курочки, сдѣланное мною ранѣе, и только дополню его замѣчаніями объ охотѣ за этой птицей.

"Горная курочка, образъ жизни которой превосходно описанъ г. Свиридовымъ, распространена во всей горной странѣ Кавказа, по въ его сѣверной части мѣстами уже стала рѣдка и только въ Закавказъѣ обыкновениа. Будучи совершенно горною птицей, она лѣтомъ часто встрѣчается даже на высотѣ около 7.000 фут. н. у. м., но зимою постепенно спускается ниже и во время стужи держится въ нижнихъ поясахъ горъ.

"Любимое мъсто жительства горной курочки глубокія и скалистыя ущелья, кое-гдъ поросшія мелкимъ кустаринкомъ и горными травами, или почти обнаженныя каменистыя стѣны горъ. Не только лѣсовъ, но даже высокой травы эта птица избѣгаетъ, но иногда встрѣчается пританвшейся подъ кустикомъ на самой опушкѣ лѣса. Поэтому въ лѣсистой мѣстности горныя курочки живутъ въ небольшомъ числѣ, да и то исключительно на непокрытыхъ лѣсомъ скатахъ горъ. Здѣсь, виѣ брачнаго времени, курочки держатся обыкновенно стайками отъ б до 40 штукъ, но въ брачный періодъ встрѣчаются парами и поодиночкѣ. Подобно другимъ горнымъ куропаткамъ, горная курочка превосходный бѣгунъ. Будучи пичѣмъ не потревоженной, она бѣжитъ довольно медлению, слегка вытянувъ впередъ голову, часто остана-

вливается, посматриваеть по сторонамъ, объгая камин и перебъгая рвы. Но если ее преслъдуютъ, она бъжитъ очень быстро, съ слегка приподнятыми крыльями, перепрыгиваетъ и перепархиваетъ черезъ рвы и камин, съ необычайною легкостью и ловкостью проскальзываетъ вверхъ по скатъ и въ самое короткое время исчезаетъ. При этомъ курочка всегда бъжитъ въ гору или вбокъ по откосу и инкогда внизъ; если бъжать вверхъ нельзя, въ такомъ случать курочка поднимается на крылья. Будучи чрезвычайно подвижною итицей, горныя курочки въ хорошую погоду бъгаютъ почти цълый день, не только чтобы достать корму, но и просто изъ желанія побъгать; въ дождливое же время онъ бъгаютъ только за кормомъ, а остальное время сидятъ нахохливинсь.

"Но что касается летательныхъ способностей горной курочки, то въ этомъ отношении она далеко уступаетъ обыкновеннымъ куропаткамъ: полетъ ея торопливый, порывистый и не очень быстрый; летаютъ эти птицы немного и только въ крайнихъ случаяхъ, какъ, наприм., когда ихъ захватятъ врасилохъ на совершенно открытой мѣстности, или когда надо перебраться изъ одного ущелья въ другое для отыскиванія корма. По своей охотѣ курочки взлетываютъ молча и летятъ довольно медленно; но испуганныя срываются сразу съ шумомъ и улетаютъ съ крикомъ птийи, птийи. На лету держатся врозь, невысоко надъ землею и всегда облетаютъ гору, а не летятъ черезъ нее; опускаясь, нѣкоторое время парятъ, а едва сядутъ на землю, какъ разбѣгаются въ разныя стороны. Перелетѣвши на новое мѣсто, всегда опускаются на среднну горы. Впрочемъ, курочки очень неохотно мѣняютъ разъ выбранное мѣсто и, будучи вспугнуты, непремѣнно возвращаются туда въ тотъ же день, не позднѣе вечера.

"Питаются каменныя куропатки весьма разнообразнымъ кормомъ: въ теплое время года насѣкомыми, по преимуществу жуками и прямокрылыми, гусеницами, пауками, сѣменами и луковицами разныхъ горныхъ растеній, ячменемъ, пшеницей, льномъ и пр.; зимою же, когда кормъ сокращается и птицѣ приходится иногда очень глубоко разрывать снѣгъ, чтобы достать кормъ изъ-подъ него, преимущественно разными ягодами и сѣменами. Весною къ зимнему корму прибавляются почки и молодые побѣги горныхъ кустарниковъ.

"Каменная куропатка очень живая и крикливая птица и издаетъ различный крикъ, смотря по тому, въ какомъ случать. При спокойномъ полетть она иногда издаетъ тихое дюрр-дюрр....; сидя спокойно или отыскивая кормъ, куропатка кричитъ кута-та, кута-та, сильно напоминающее кудахтанье курицы; въ пасмурную погоду куропатки кричатъ почти цтлый день, въ ясную—преимущественно утромъ и вечеромъ. Наконецъ, сзывающая выводокъ или предупреждающая его объ опасности матка сильно квохчетъ. Въ теплое время года куропатки кричатъ чаще, чтмъ зимою, и такъ какъ при этомъ птицы, покричавъ, очень быстро перебъгаютъ съ одного мтста на другое, то иногда по крику кажется, что въ ущельи много этихъ птицъ, а на самомъ дтлть

ихъ всего тамъ штуки двъ-три. Не будучи напуганы, куропатки очень довърчивы и смълы, такъ что зимою подходятъ даже къ саклямъ и гумнамъ горцевъ, по напуганныя дълаются очень осторожны. Во время преследованія описываемая птица обнаруживаеть большую находчивость и сообразительность. Въ каменистой, изрытой ложбинами мѣстпости куропатка убъгаетъ, пользуясь всякимъ прикрытіемъ, или же вдругъ, на бъгу, припадаетъ къ землъ въ какомъ-нибудь углублени, и когда охотникъ или звърь пройдетъ мимо, вскакиваетъ и убъгаетъ въ противоположную сторону. Иногда цълое стадо, залегши, подпускаетъ охотника въ упоръ, и тогда вдругъ взлетаетъ, разсыпаясь въ разныя стороны. Тамъ гдф есть трещины и нещеры, куропатки мастерски прячутся въ нихъ, а если охотникъ, замътившій бъглянку, станетъ доставать ее изъ неглубокой трещины рукою, то птица отчаянно обороняется клювомъ и ногами. Раненая, она иногда притворяется мертвой и лежитъ съ закрытыми глазами и распущенными крыльями, выжидая, не зазтвается ли охотникъ, заряжая ружье или по какому другому поводу; тогда птица изъ всёхъ силъ вскакиваетъ и убъгаетъ или улетаетъ. Говорятъ, что иногда куропатка вырывается такимъ образомъ изъ рукъ охотника и даже изъ сътки ягдташа.

"Забравшись рано утромъ, до восхода солнца, въ какое-нибудь глухое ущелье, гдъ попадаются каменныя куропатки, -- говоритъ г. Свиридовъ, – и помъстившись за высокимъ камнемъ, можно съ удобствомъ дълать наблюденія надъ этими милыми птичками. Чуть только темное ущелье освътится первыми лучами восходящаго солнца, изъ-подъ камней, разсълинъ скалъ, пещеръ и трещинъ горъ, по объимъ сторонамъ ущелья, появляются (въ-одиночку, по-парно или пять-шесть разомъ) каменныя куропатки. Осмотр'явшись и встряхнувшись, он'я быстро разбъгаются въ разныя стороны. Кажется, что онъ вовсе не осторожны и совершенно беззаботно бъгаютъ взадъ и впередъ между камнями и кустарниками, но это далеко не в'врно; послышится ли подозрительный шорохъ, крикъ, сорвется ли камень съ горы и, прыгая съ скалы на скалу, покатится съ глухимъ шумомъ внизъ по горъ; послышатся ли шаги, топотъ лошади, или покажется вдали пернатый хищникъ, -- каменныя куропатки уже остановились, насторожились и собрались въ кучку, безпокойно оглядываясь и прислушиваясь. Миновала опасность или тревога была фальшивою, — птицы вновь разбѣгаются; въ противномъ случат онт стремглавъ бъгутъ въ противоположную отъ мѣста появленія врага сторону или улетаютъ въ сосѣднее ущелье.

"Нафвинсь досыта, каменныя куропатки отправляются пить къ ближайшему ручью. Тамъ, въ тъпи высокой травы или подъ нависинми камнями, онъ сидять во время полуденнаго жара, встряхиваясь, ощупывая и расправляя перышки или разыскивая разныхъ паразитовъ. Какъ только жаръ спадетъ, птицы вновь отправляются за кормомъ на прежнее мъсто, или куда-нибудь по-сосъдству. Разыскиваніе корма разнообразится часто драками, до которыхъ каменныя куропатки большія охотницы. Эти птицы вообще далеко не мирнаго нрава; онъ ссо-

рятся между собою и дерутся при всякомъ удобномъ случать, по большей части безъ всякаго повода, а такъ, какъ говорится, зря. Такія драки, впрочемъ, непродолжительны. Другое дѣло если одно стадо забредетъ въ районъ пастьбы другого, или понытается завладѣть мѣстомъ ночлега,—сраженіе немедленно возгарается; въ бой вступаютъ, наподобіе древнихъ германцевъ, мужья, жены и дѣти—и побъдителями по большей части остаются правые, т.-е. владѣльцы атакуемой мѣстности. Отличаясь драчливостью, каменныя куропатки не могутъ похвастать и уживчивостью: онт не териятъ въ своемъ обществѣ другихъ итицъ и, по разсказамъ туземцевъ, всегда прогоняютъ случайно попадающихъ въ ихъ стадо сфрыхъ куропатокъ. Въ неволть каменныя куропатки дерутся со всѣми встрѣчающимися имъ птицами, горячо преслѣдуютъ воробьевъ, голубей, не затрудняются напасть на курицу и утку и даже, порою, своими дрязгами выводятъ изъ себя флегматичныхъ индюковъ.

"Передъ заходомъ солица каменныя куропатки держатся обыкновенно вблизи своихъ мѣстъ ночлега. Въ это время онѣ любятъ взбираться на уединенно-стоящіе камни или выступы скалъ. Помѣстившись на краю скалы, онѣ перекликаются между собою, ощупываются или просто сидятъ нахохливнись. Вскорѣ послѣ захода солица онѣ отправляются спать. Мѣстомъ почлега обыкновенно служатъ небольшія разсѣлины или трещины горъ, небольшія пещеры и вымонны подъскалами; иногда, особенно лѣтомъ, птицы располагаются на ночлегъ по выступамъ большихъ камней и скалъ."

"Брачный періодъ начинается у каменныхъ куропатокъ очень рано. Уже въ концъ февраля или началъ марта онъ начинаютъ разбиваться на пары, при чемъ между самцами начинаются ожесточенныя драки изъ-за самокъ. Дерутся эти птицы по-долгу и иногда до того, что одинъ изъ противниковъ остается на мѣстѣ; подойти къ дерущимся можно на пять шаговъ — и они все-таки не оставляютъ другъ друга, пуская въ дѣло клювъ, ноги и крылья. Наконецъ, пары образовались и вотъ гдѣ-нибудь въ трещинѣ скалы, подъ камнемъ, подъ кустикомъ вереска или можжевельника самка и самецъ устраиваютъ гнѣздо, выстилая небольшое углубленіе травой, мхомъ и листьями. Яйца можно находить съ марта до іюля, но нормально каменная куропатка гитэдится одинъ разъ въ году, и вторично несетъ яйца, если первыя почему - либо погибли. Полная кладка содержить отъ 8 до 12, ръдко до 14 япцъ; вторичная кладка бываетъ меньше. Япца желтоватаго цвъта съ черными пятнышками и имъютъ отъ 1,6 до 1,5 д. въ длину и отъ 1,22 до 1,18 д. въ поперечникъ. Самецъ помогаетъ самкъ въ насиживаніи, но остается на гнъздъ меньше самки, такъ какъ только замъняетъ ее, когда она идетъ пить или кормиться; остальное время онъ остается около гнъзда и оберегаетъ самку, прогоняя холостыхъ самцовъ. Самка сидитъ на гивадв такъ крвико, что иногда удается схватить ее руками. Цыплята очень скоро по выклюнутии изъ ящь научаются лазить по камнямъ, бъгать, прятаться и собствен-

ными силами добывать кормъ. Спачала родители уводятъ ихъ за кормомъ отъ гивада только среди дня, но постепенно остаются съ ними внъ гиъзда всё больше и больше и наконецъ возвращаются къ гитаду только на ночлегъ. Матка очень привязана къ датямъ и употребляеть всв усилія, чтобъ отвести отъ нихъ охотника или другого непріятеля, тогда какъ цыплята мастерски прячутся и вылівзають изъ-подъ прикрытія только по голосу матки или отца. Если же одинъ изъ стариковъ погибъ, тогда всъ заботы о выводкъ беретъ на себя другой. Въ случаћ гибели обоихъ родителей выводокъ присоединяется къ другому, чемъ и объясняется, что иногда при двухъ старикахъ бываетъ до 30 цыплятъ. Черезъ три мфсяца по выходф изъ ящь молодыя куропатки становятся ростомь ео взрослую птицу и продолжаютъ жить выводкомъ, или же нфсколько выводковъ соединяются въ большую стаїку. Позднею осенью, когда снъга въ горахъ накопится очень много, такъ что птицамъ трудно станетъ добывать изъ-подъ него кормъ, а холода начнутъ усиливаться, куропатки постепенно спускаются ниже, но ни въ это время, ни въ другое онъ никогда не встръчаются не только на равнипахъ, но даже и въ горныхъ долинахъ, а лишь переселяются изъ болѣе высокаго пояса горъ въ болѣе низкий и обратно, смотря по времени года".

Что касается охоты за горными куропатками, то, безъ сомнѣнія, это одна изъ наиболѣе трудныхъ, такъ какъ охотнику приходится лазить по кручамъ и осыпямъ, пробираться едва проходимыми ущельями, испытывать голодъ и жажду и въ добавокъ рисковать оборваться съ утеса или наткнуться на медвѣдя, а то и пантеру. Къ тому же стрѣлять приходится на бѣгу или въ летъ, часто въ очень неудобномъ положеніи, а потому какъ же не дорожить такой дичью? Практическіе совѣты относительно охоты за описываемой птицей мы приведемъ словами г. Свиридова.

"Самые лучшіе мъсяцы для охоты за шими августъ, сентябрь и въ особенности октябрь. Въ это время куропатки очень жирны, попадаются значительными стайками, лънивы на подъемъ и подпускаютъ довольно близко охотника. Въ это время и солнце не такъ печетъ и воды больше въ горахъ. Лучшая пора для охоты — съ раиняго утра до 2 часовъ дня и затъмъ отъ 4 до 7 вечера. Въ пасмурный, дождинвый и въ особенности вътренный день охота бываетъ особенно удачна. Тогда гораздо легче находить куропатокъ, потому что опъ кричатъ цълый день. Вътеръ, шумя по ущельямъ, заглушаетъ звукъ шаговъ и надающихъ кампей и даетъ возможность подойти ближе къ птицамъ, которыя въ такое время чаще и дольше сидятъ на мъстъ.

"Охотясь въ первый разъ въ новой мѣстности, лучше отправляться на охоту верхомъ съ двумя проводниками, съ тѣмъ чтобы подлѣ мѣста охоты спѣшшться и отправить лошадей впередъ, въ условленное мѣсто. Послѣднее тѣмъ удобиѣе, что на такой охотѣ стрѣлокъ заходитъ пногда очень далеко отъ жилъя. По окончаніи охоты утомленному и нагруженному добычею стрѣлку тяжело возвращаться пѣшкомъ. Обратные

переходы ущелій и горъ очень утомительны, уже не говоря о томъ, что при быстро наступающей темнотѣ легко заблудиться пѣникомъ. Горныя же лошади знаютъ отлично мѣстность и шкогда не собьются съ пути.

"На такой охотъ нужно быть легко одътымъ, чтобы удобнъе было ходить, но при себъ пужно имъть что-инбудь теплое (осенью и весною), потому что въ обратный путь по большей части приходится возвращаться почти мокрымъ или покрайней мъръ сильно разгоряченнымъ, а при такомъ состояніи внезапный вътеръ въ ущелы, или на горъ прохватитъ до костей и пожалуй наградитъ основательной простудой. Помимо съъстныхъ припасовъ не мъщаетъ брать съ собою мятныхъ или валеріановыхъ канель: очень часто въ ущельяхъ встръчается вода, прозрачная, холодная, но насыщениая нъкоторыми минеральными солями, очень вредно дъйствующими на желудокъ. Въ такомъ случать вино не поможетъ, да оно скоро и выпивается. Каменныхъ куропатокъ рѣдко когда приходится стрѣлять близко: minimum разстоянія—пятьдесятъ, шестьдесятъ шаговъ, поэтому лучше всего стрѣлять ихъ вальдшнепинникомъ, а зимою даже мелкимъ утинникомъ.

"Слъдуетъ ли брать на охоту собаку? На счетъ этого существуетъ два противоположныхъ мивнія: один охотники говорять—да, другіе и я въ томъ числъ-нътъ. Разумъется собака доставляетъ пъкоторыя удобства охотнику: она раньше его узпаетъ по слъдамъ присутствіе куропатокъ, догонитъ раненую (не всегда впрочемъ), достанетъ убитую. Но и неудобствъ съ ней не мало - каменныя куропатки боятся собакъ (въ особенности сеттеровъ) и стойку рѣдко выдерживаютъ, а напротивъ, завидя собаку, удираютъ во всю мочь; если собака горяча, то она разгонитъ встхъ куропатокъ ранте, чтмъ подойдетъ охотникъ, которому трудиће лазить по горамъ. Очень часто собака, горячо преслъдуя каменныхъ куропатокъ, обрывается въ пропасти и разбивается о камни. Многія собаки не выдерживають долгаго лазанья по горамъ, скоро устають и тогда только мѣшають охотнику. Я охотился постоянно безъ собаки, часто добывалъ по пятнадцати, двадцати куропатокъ въ день и за весьма немногими исключеніями ръдко когда нуждался въ помощи собаки. Впрочемъ, это дъло вкуса и привычки. Нъкоторые охотники, напримѣръ, не могутъ стрѣлять бекасовъ и дупелей безъ собакъ, а въ Закавказъѣ это сплошь и рядомъ дѣлается многими охотниками. Охотясь за каменными куропатками, необходимо идти посрединѣ склона горъ; если охотникъ идетъ по дну ущелья, то ему приходится постоянно высоко держать голову; спасаясь отъ охотника, птицы по большей части бъгутъ вверхъ, къ вершинамъ горъ, такъ что за ними нужно высоко лъзть. Если же охотникъ идетъ по вершинъ хребта, то птицы раньше видять его, чёмъ онъ ихъ, и быстро убфгаютъ внизъ незамъченными, если же ему и удастся замътить стадо, то подойти къ нему близко все-таки будетъ очень трудно: какъ бы тихо ни ступалъ охотникъ, мелкіе камешки все-таки выскальзываютъ изъ-подъ ногъ и, катясь съ шумомъ внизъ, пугаютъ птицъ; при

первой же попыткъ приблизиться стадо бросится вразсыпную и, пробъжавъ немного, пролетитъ внизъ, чуть не касаясь крыльями земли; въ этомъ случат промахъ весьма въроятенъ. Между тъмъ какъ огибая гору посреднить легче разсматривать большое пространство, удобите и быстртве подняться выше или спуститься внизъ. Лучше всего подкрадываться къ каменной куропаткт въ то время, когда она кричитъ, и стоять тихо когда она замолчитъ. Она обыкновенно кричитъ итъсколько секупдъ, иногда до 2 минутъ, затъмъ слъдуетъ молчаніе довольно короткое, потомъ опять крикъ. На стоящаго тихо охотишка птицы обращаютъ мало вишманія.

"Подкрадываться всего лучше противъ вѣтра, – каменныя куропатки имѣютъ отличный слухъ и поспѣшатъ заранѣе убраться, заслыша, но не видя человѣка".

Кромф русскихъ, за каменными куропатками охотятся главнымъ образомъ горцы, и то не всѣ, а только мусульмане-татары и изрѣдка курды. Кромф того, татары и армяне очень любятъ держать каменныхъ куропатокъ дома въ качествѣ ручныхъ птицъ и пѣтушковъ въ качествѣ бойцовыхъ. Пойманныя взрослыми куропатки или убѣгаютъ, или погибаютъ, но ни въ какомъ случаѣ не приручаются. Напротивъ, цыплята, выведенныя изъ ящцъ, которыя были подложены подъ курицу, вырастая, становятся совершенно ручными и бѣгаютъ около дома вмѣстѣ съ другой домашней птицей.

Наконецъ, кавказскіе туземцы любятъ охотиться за каменными куропатками съ соколами и ястребами.

82. Индѣйка горная кавказская. Tetraogallus caucasicus, Pall.

Табл. 87.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 540.

Болѣе распростр. названіе: горная индлыйка.

Туземныя названія: Осетпи. — жиль. — Груз. п имерет. — индауре. — Сван. — мулькауре, мулькаре. — У петок. Ріопа — джеруни.

"Горная индъйка водится почти на всемъ протяжении главнаго Кавказскаго хребта и его ближайшихъ отроговъ, но только тамъ, гдъ есть въчные сиъга; на высокихъ же скалистыхъ горахъ, лѣтомъ совершенно лишенныхъ сиъга, эти итицы не живутъ. Такимъ образомъ, данное М. Н. Богдановымъ опредъленіе области распространенія горной индъйки "горныя луга Кавказа" невѣрно, такъ какъ въ нижней части этого пояса, нокрытой высокою травой, коренномъ мъстопребываніи кавказскаго тетерева, горная индъйка вовсе не встръчается, а живетъ только въ самой верхней части его, покрытой мелкой приземистою травкой.

"Горная индъйка живетъ въ такихъ дикихъ и мало доступныхъ м'єстахъ, что эту птицу хорошо знаютъ только охотники за турами, живущими вывсть съ горной индъйкой. Любимое мъстопребывание ея обрывистые горные склоны вблизи вѣчныхъ снъговъ, съ площадками, поросшими альпійскимъ травянистымъ растеніемъ Potentilla, которымъ преимущественно питаются и туры и индъйки. Описываемая птица держится парами, но обыкновенно и всколько паръ встр в чаются недалеко другъ отъ друга. Замътивъ опасность, индъйка даетъ знать объ этомъ своимъ сосъдямъ произительнымъ свистомъ и крикомъ, вродъ тирекъ, тирекъ, тослъ чего итицы улетаютъ. Полетъ ихъ быстрый и прямой, напоминающий полеть стрепета, и предпочтительнъе птица всегда летитъ къ леднику; собираясь състь, индъйка многократно поворачивается то въ ту, то въ другую сторону. Бѣгаетъ индъйка прекрасно даже по снъту, и съ изумительною ловкостью прячется между обломками скаль. Въ апрѣлѣ самка приступаетъ къ кладкѣ. Никакихъ подробностей объ образъ жизни горныхъ индъекъ въ брачный періодъ у насъ иттъ, но по разсказамъ охотниковъ, мъстомъ для гивзда выбирается прикрытое выступомъ камия пространство, гдв самка собираеть изкоторое количество сухихъ альпійскихъ травъ, дълаетъ изъ нихъ край гитзда и внутри очерченнаго такимъ образомъ пространства кладетъ свои яйца. Говорятъ, что число ящъ бываетъ до 20; встрѣченный Радде выводокъ состоялъ приблизительно изъ 15 птенцовъ. Длина ящть 2,65 д., поперечникъ около 1,80; они или бл вдно-охристы съ одниковымъ оттвикомъ, или болве зеленоватооливковы; по этому основному фону разбросаны небольшія буроватыя пестрины. Въ іюнъ уже можно встрътить выводки горныхъ индъекъ, охраняемые стариками. Самецъ занимаетъ болъе сторожевой постъ, самка принимаетъ ближайшее участіе въ охраненіи птенцовъ; завидъвъ опасность, и старые и молодые прижимаются къ землъ и лежатъ такъ крѣпко, что почти позволяютъ наступить на себя; но затѣмъ съ необычайной быстротой и съ шумомъ, какъ всѣ куропатки, разлетаются по разнымъ направленіямъ. Повидимому, родители знаютъ, что спрятавніеся среди обломковъ молодые безопасны отъ пресл'ядованія, потому что улетаютъ далеко отъ выводка и возвращаются къ нему не раньше какъ убъдятся, что опасность миновала. Тогда самка свистомъ даетъ объ этомъ знать дътямъ, и выводокъ опять собирается. Говорять, что на зиму горныя индейки собирають запасы почекъ Potentilla и другія растенія, которыя складываютъ подъ защитой утесовъ. Горная индівіка живеть на высоті оть 7 до 16,000'. Зимою изъ верхняго альпійскаго пояса спускается въ нижній, по никогда не бываетъ даже въ средней полосѣ горъ".

Вотъ то немногое, что я могъ сообщить о распространенін и образѣ жизни горной индѣйки въ моихъ "Птицахъ Россіи" и что я теперь могу дополнить слѣдующими интересными наблюденіями надъ этой птицей, сдѣланными Е. В. Цвѣтковымъ въ Цейскомъ ущельѣ (изъ рукоп.).

"Въ Цейскомъ ущельт горная индъйка весьма многочисленна. Лътняя область ея распространенія здъсь вполить совпадаеть съ таковой же тура. Если раздѣлить всю область альпійской растительности отъ верхней границы лѣса до верхнихъ возможныхъ предѣловъ растительности на три пояса, то нижній, включая и самую верхиюю полосу древесной растительности, выпадетъ на долю кавказскаго тетерева, средній—на долю горнаго ситпря и верхній—на долю горной индъйки. Тощая растительность въ этомъ послѣднемъ поясть ютится по небольшимъ площадкамъ, карпизамъ и трещинамъ скалъ, и вся мѣстность настолько дика, сурова и малодоступна, что проинкнуть туда можно, только имъя сноровку альпійскаго охотника. Сверху область эта замыкается обыкновенно линіей въчнаго ситра, но индъйки живутъ и на такихъ веришнахъ, которыя лѣтомъ (іюль и августъ) совершенно линіены ситъта. Такъ, вершина Сау-хохъ *) въ хребтѣ, раздѣляющемъ

^{*) &}quot;Сау-хохъ" на Осетинскомъ языкѣ значитъ: черная гора.

Цейское и Садонское ущелья, лътомъ на восточной, южной и юго-запалной сторои в совершенно лишена сибга, а между тъмъ это излюбленное мъсто пидъекъ, и ингдъя не встръчалъ ихъ въ такомъ больномъ количествъ, какъ на этихъ склонахъ. Иътомъ индъйка не спускается ниже 9-8 тысячъ футовъ, но зимою и особенно раннею весною она идетъ довольно низко. Помимо увъреній мъстимуть охотниковъ и жителей, я им'ью и другія доказательства этого: я находиль весенній пометь индъекъ и всколько выше аула Чей (около 6000') и по верхней границъ лъса; находилъ въ такихъ мъстахъ, куда онъ не могъ быть запесенъ весеннимъ сибговымъ заваломъ. Весною, съ появленіемъ растительности все въ высшихъ и высшихъ поясахъ, индейки постепенно поднимаются кверху и приблизительно съ середины мая окончательно водворяются въ літней области распространенія. О зимнихъ залетахъ индъйки миъ не приходилось слышать инчего, да и врядъ ли это ктолибо могъ наблюдать, т.-к. зимою высокія мѣста горъ абсолютно нелоступны.

"Ивтомъ горныя пидвіки живуть отдівльными выводками "), но иногла два выводка сбиваются вибств. Такъ, 27-го іюня въ среднемъ альпійскомъ пояст передъ вечеромъ я наткнулся на выводокъ нидтьекъ при двухъ старкахъ. Цыплята были величиною съ перепела, всего около то штукъ. Я полагалъ вначалъ, что это самецъ и самка, но когда добыль ихъ, то убъдился, что это объ самки и при томъ выводковыя—съ голымъ брюхомъ. Это обстоятельство заставило меня обратить большее вииманіе на самцовъ, и по моимъ наблюденіямъ эти последніе почти шикакого участія не принимають въ охраненін п воспитаніи птенцовъ. Наоборотъ, н'ясколько самцовъ сбиваются иногда вмъстъ и ведутъ такъ сказать "холостую жизнь". Напримъръ, въ тотъ же день почти на самомъ перевалѣ я встрътилъ 7 холостыхъ индѣекъ, изъ которыхъ многія по величинѣ и яркости окраски показались мнѣ самцами. При внезапномъ появленіи челов'тка старыя пидійки обыкновенно покидаютъ цыплятъ, надъясь на ихъ искусство прятаться, и улетаютъ довольно далеко. Спустя нѣкоторое время, онѣ возвращаются, и, если опасность еще не миновала, то вновь улетаютъ. Иногда мнѣ приходилось наблюдать, что самки стараются отвести въ сторону охотника, какъ это дълаетъ куропатка, но это только въ томъ случать, если позволяетъ мъстность. Если цыплята настолько велики, что летаютъ хорошо, то нѣкоторые изънихъ взлетаютъ вслѣдъ за старкой. Послъдняя, взлетъвъ, уморительно вертится изъ стороны въ сторону, держа наклонно туловище и оглядываясь на летящихъ позади цыплятъ, какъ бы стараясь замѣтить, какое они приняли направленіе. Если выводокъ разбитъ, то самка особымъ крикомъ, нѣсколько напоминающимъ клохтанье курицы, сзываетъ цыплятъ и старается увести ихъ

^{*)} Выводки въ этомъ году были чрезвычайно малочисленны — 5 — 6 птенцовъ. По всей въроятности много яицъ погибло отъ весеннихъ морозовъ. Приходилось встръчать старку и съ однимъ только цыпленкомъ.

какъ можно выше; при этомъ она всегда опускаетъ крылья и приподнимаетъ хвостъ. Цыплята отвъчаютъ ей жалобнымъ свистомъ, которому очень легко подражать, и такимъ путемъ удается иногда подманитъ старку. Выводокъ взлетитъ только въ томъ случаѣ, если вы
натолкиулись на него неожиданно, если же старики замѣтятъ человѣка
издали, что обыкновенно и бываетъ, то заблаговременно уводятъ
цыплятъ къ самой вершинъ хребта. Миѣ ип разу не пришлось наблюдать, чтобы индъйка летѣла предпочтительно къ леднику: спутнутая,
она летитъ въ сторону отъ опасности и всегда иѣсколько подъ гору.
Взлетая и на полетѣ индъйки какъ старыя, такъ и молодыя издаютъ
особый крикъ. Собираясь сѣстъ, индъйка не "поворачивается многократно то въ ту, то въ другую сторону", а дълаетъ это такъ, какъ
гориая курочка, т.-е. часто машетъ крыльями и нѣсколько поднимаетея вверхъ.

"23-го іюля, спускаясь рано утромъ съ вершины хребта Сау-хохъ, чтобы всполошить индвекъ, я сдълалъ выстрълъ *). Послъ выстръла внизу взлеталь выводокъ изъ четырехъ стариковъ и десятка молодыхъ, и опустился въ средней полосф альпійскихъ луговъ, на склонф крутого гребия. Я сталь спускаться къ инмъ, но въ это время наткнулся на двухъ старыхъ индъекъ, сталъ ихъ преслъдовать, и онъ завлекли меня далеко въ сторону. Только въ полдень я былъ на томъ м'вств, гдв опустился замфченный мною утромъ выводокъ, потому я никакъ не ожидалъ встрѣтить его здѣсь и не приготовился. Двѣ старыя индѣйки, по всей въроятности самцы, взлетъли далеко впереди меня и скрылись за сосвдиимъ гребиемъ. Нъсколько въ сторонъ отъ того мъста, откуда онъ взлетъли, я нашелъ выводокъ. Изъ-подъ самыхъ моихъ ногъ съ шумомъ и крикомъ вълетвло итукъ пять молодыхъ, но я стоялъ на опасномъ мфстф и не имфлъ возможности выстрфлить. Послф этого я началь, какъ говорять охотники, "вытантывать" оставшихся молодыхъ и добылъ одного. Въ моментъ выстръла замътилъ еще старую индъйку Q, которая распушившись и опустивъ крылья поспѣшно спускалась внизъ по гребию; я сдълалъ по ней выстрълъ, но неудачно. Она взлетъла и опустилась на вершин сосъдияго гребия; туда же перелетъла и четвертая старая пидъйка Q, бывшая далеко внизу и вначаль незамьченная мною. Едва я усивль перемьнить патроны и спрятать убитаго цыпленка, какъ одна изъ самокъ верпулась и съла шагахъ въ 60 отъ меня. Я сдълалъ по ней выстрълъ, но опять неудачный; индъйка удетьла въ томъ же направлении. Никакъ не ожидая, что послъ этого можеть верпуться кто-либо изъ стариковъ, я хотфль было идти разыскивать ихъ, но въ это время вновь вернулась та же самка (говорю "та же", потому что она прилетала и улетала по одному и тому же направленію) и опустилась шагахъ въ 40 отъ меня; я сдълаль третій пеудачный выстрыль и она улетьла опять въ томъ

¹⁾ Выстріла индійки боятся и почти всегда взлетають.

же направленіи. Совсѣмъ обезкураженный тройной неудачей, я сѣлъ отдыхать подъ скалой, раздумывая о настойчивости, съ какой индѣйка возвращалась къ мѣсту, гдѣ полагала найти выводокъ. Черезъ ½ часа вернулись обѣ самки, но опустились далеко отъ меня. Одна изъ нихъ стала сзывать цыплятъ, опустивъ крылья и поднявъ хвостъ, и постепенно взбиралась все выше и выше, другая кричала виизу подо мной; я поползъ туда и добылъ ее.

"Вообще индѣйка чрезвычайно осторожная птица, и добыть ее не легко. (Изъ 6 убитыхъ мною индѣекъ только 2 оказались вполнѣ годными для препаровки, остальныя свалились съ такой высоты, что шкурки оказались совершенно испорченными и негодными для препаровки).

"Замѣтивъ издали охотника, индѣйки всегда бѣгутъ вверхъ на вершину хребта. Если вы продолжаете преслѣдованіе, то онѣ, достигнувъ перевала и не подпуская васъ шаговъ на 100—200, слетаютъ внизъ куда-либо въ недоступное ущелье, иногда пролетая при этомъ надъ самой головой вашей.

"Кормятся индѣйки по утрамъ и вечерамъ. Лишь только закраснѣютъ снѣга на высочайнихъ вершинахъ, повсюду раздаются громкіе и разнообразные крики индѣекъ. Такъ кричатъ опѣ нѣкоторое время, а затѣмъ слетаютъ внизъ на травянистыя площадки или на мѣста, гдѣ много зеренъ бѣлаго кварца *). Отыскивая кормъ, индѣйки постепенно поднимаются кверху и часамъ къ 8—9 онѣ опять наверху, среди голыхъ скалъ.

"Въ жаркую пору дня индъйка никогда не кричитъ, а отдыхаетъ или купается въ пескъ подъ выступомъ скалы на тъневой сторонъ ущелья или утеса. Мъстные охотники говорятъ: "днемъ тура ищи тамъ, гдъ сидитъ индъйка". И это вполнъ справедливо. Въ послъднихъ числахъ йюля, скрадывая съ охотникомъ-осетиномъ отдыхающихъ въ полдень туровъ въ скалахъ, окружающихъ верхнюю часть Рекомскаго ледника, я безъ малъйшаго шороха пробирался по узкому карнизу почти отвъснаго утеса, по его тъневой сторонъ. И здъсь изъ-подъ самыхъ моихъ ногъ вылетъли двъ старыя индъйки, сидъвшія подъ навъсомъ камня. Онъ взлетъли такъ неожиданно, что я вздрогнулъ и чуть не потерялъ равновъсія.

"Вечеромъ индъйки отправляются на поиски корма послъ заката солнца, и этому опять предшествуютъ несмолкаемые крики.

"Крики индъйки чрезвычайно чисты и пріятны и настолько громки, что слышны почти за версту. Мнѣ кажется, что онѣ настолько музыкальны, что могли бы быть положены на ноты. Свой характерный свисть, о которомъ говорять всѣ наблюдавшіе индѣйку, она издаетъ ***) не только тогда, когда замѣтитъ опасность и хочетъ пре-

^{*)} Послъдняя особенность хорошо извъстна и мъстнымъ охотникамъ.

^{**)} При этомъ индъйка выпрямляется и далеко закидываетъ назадъ голову.

дупредить товарищей, но почти все время, пока отыскиваетъ кормъ и находится въ движении.

"Естественные враги пидъйки—бородачъ, беркутъ *) и какой-то звърекъ, нохожій на горностая, но иъсколько большихъ размъровъ. Этого звърка я наблюдалъ одниъ разъ издали 2-го іюля, когда онъ сдълалъ неудачный прыжокъ къ молодой пидъйкъ.

"Остатки растерзанныхъ индъекъ, какъ старыхъ, такъ и молодыхъ, мнъ приходилось находить часто".

^{*)} Относительно этихъ двухъ видовъ говорю со словь охотниковъ.

83. Индѣйка горная каспійская. Tetraogallus caspius, Gm.

Табл. 88.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 543. Болъе распростр. названіе: горная индъйка.

Туземныя названія: татар. въ Ленкорани—уръ-кэклукъ. Перс.—кабкъ-идаре.—Въ Талышъ—шенакасъ.

"На Кавказъ, писалъя въ своихъ "Птицахъ Россіи", этотъ видъ горной индъйки распространенъ по высочайшимъ, отдъльно стоящимъ горамъ Арменін и въ пограничной области, именно въ горахъ у истоковъ Чороха и на Тальшской границъ къ востоку отъ Савалана, на Араратахъ, на Ашихъ-дагъ и въ иъкоторыхъ другихъ мъстахъ. Кромъ того, этотъ же видъ былъ найденъ Н. А. Заруднымъ въ Закаспійскомъ краж на Копеть-дагж и по верхнему теченію Чандыра, откуда генералъ Комаровъ любезно прислалъ, по моей просьбѣ, прекраснаго самца. Внъ Россін этотъ видъ горной индъйки широко распространенъ въ Малой Азін, Курдистанъ и съверной Персін. Въ Малой Азін Дэнфордъ въ подробностяхъ прослъдилъ образъ жизни этой птицы, но я нахожу излишнимъ приводить его наблюденія, такъ какъ условія жизни, представляемыя мало-азіатскими горами и горными вершинами Закавказья, весьма различны. Можно только пожелать, чтобы наконецъ нашелся достаточно энергичный изслъдователь Кавказа, который сообщилъ бы намъ наблюденія надъ рфдкими кавказскими животными".

Къ сожалѣнію за десять лѣтъ, протекшихъ съ тѣхъ поръ, какъ я писалъ эти строки, мое желаніе не успѣло еще исполниться.

84. Турачъ.

Francolinus vulgaris, Steph.

Табл. 89.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 545. Болъе распростр. названіе: франколинъ (книж.).

Мѣстное названіе: *турач*z (у кавказ. охотн.), изм'єнен, персид. названіе дурражz.

Турачъ живетъ у насъ только въ Закавказът и здъсь только по рѣкамъ Курѣ и Араксу. Что касается долины р. Куры, то К. А Сатунинъ встрѣчалъ его здѣсь отъ станціи Пойлы до Аджи Кабула. Отсюда, по словамъ Радде, онъ пдетъ черезъ Сальяны до с. Тезякендъ, находящагося верстахъ въ 20 ниже Сальянъ по р. Акушѣ, рукаву Куры. Встръчается также на нижнемъ теченіи р. Тертера. Въ долинѣ Аракса турачъ держится исключительно по среднему теченію этой рѣки, отъ с. Маральянъ на западѣ до границъ Джеватскаго уѣзда, и особенно многочисленъ около селенія Бегманлу, Джебраильскаго увзда. Еще очень недавно турачъ былъ распространенъ гораздо западиће, поднимался довольно высоко по долинамъ рѣкъ Океры и Охчичая. Въ низовьяхъ Аракса и при впаденін его въ Куру турача нфтъ. Эти свфдінія надо дополнить указаніями В. В. Щ., что въ концф семидесятыхъ годовъ турачи были еще очень обыкновенны около г. Гокчая и отсюда по линін черезъ Зардобъ къ Шушѣ, по степи, слѣдовательно были распространены, съ одной стороны, въ степи къ съверу отъ Куры, съ другой-между Курой и Араксомъ.

Любимое мъстопребывание турача составляютъ кустарныя заросли, большею частію близъ воды, но иногда онъ встръчается и далеко отъ воды, только всегда по равнинамъ. По характеру своему турачъ не любитъ открытыхъ мъстъ и, за исключеніемъ весны, неохотно выходитъ изъ кустовъ, гдѣ съ удивительной ловкостью шныряетъ между ихъ густо переплетающимися вѣтвями. На сучья турачъ положительно не садится, являясь чисто наземной птицей, и вдали отъ жилищъ человъка это даетъ ему надежную защиту отъ его главныхъ враговъ—пернатыхъ хищниковъ, хотя не спасаетъ отъ преслъдованія дикихъ котовъ. Но тамъ, гдѣ поселился человѣкъ, турачу нѣтъ отъ него спасенья, чѣмъ и объясняется быстро прогрессирующее уменьшеніе въ числѣ этой птицы. Голосъ самца, похожій на слоги чекъ, чекъ, ти-ти-торъ, напоминаетъ собою чеканье чернаго дрозда и слышится какъ диемъ, такъ и ночью. Самка же очень молчалива.

Турачи живутъ, повидимому, парочками. Въ апрълъ и маъ самецъ, помъстивнись на открытомъ пригоркъ, издаетъ особый крикъ, напоминающій собою стрекотанье сороки, но быстро скрывается, какъ только зам'ятить что-либо подозрительное. Гивадо представляеть собою неглубокую, выстланную сухою травою ямку подъ кустомъ или въ самомъ кустъ (большею частю ежевичномъ), и сюда въ концъ апръля самка несетъ отъ 12 до 18 япцъ. Они ярко-охристо-бураго цвъта, покрыты бъльми точками, отъ 1,65 до 1,6 д. въ длину и отъ 1,3 до 1,27 въ поперечникъ. Насиживание продолжается 21 день. Выдупляющіеся циплята покрыты сфрымъ пухомъ, который уже черезъ нъсколько дней начинаетъ замъняться перьями. Бъгаютъ они отлично съ перваго же дня рожденія, летать начинають черезъ двіз недізли. Такъ какъ любовную трель самца можно слышать до августа, и только что выведшихся турачатъ встръчаютъ не только въ разные лътніе мѣсяцы, но даже въ началѣ сентября, то очень можетъ быть, что эти птицы нормально размножаются два раза въ лето.

Охота за турачами производится разными способами. Русскіе охотятся за ними съ ружьемъ, высматривая въ заросляхъ бурьяна или между кустарниками. Собака при этомъ не нужна, развѣ для того только, чтобы находить убитыхъ птицъ, т. к. турачъ не выдерживаетъ стойки, а подпустивъ собаку довольно близко, отбѣгаетъ, и повторивъ этотъ маневръ нѣсколько разъ, чѣмъ очень портитъ собаку, наконецъ взлетаетъ совершенно по-фазаныи, т.-е. сначала съ особымъ крикомъ и шумомъ крыльевъ поднимается столбомъ вверхъ, а потомъ летитъ прямо впередъ и, постепенно спускаясь, падаетъ въ кустарники, пролетѣвъ небольшое пространство. Турачи на рану слабы и ихъ нужно стрѣлять дробью № 9, хотя кавказскіе туземцы употребляютъ № 5 и даже № 4 дроби; но если турачъ раненъ такъ, что ноги у него не повреждены, тогда его не догонитъ никакая собака.

Туземцы добываютъ турачей не столько охотясь съ ружьемъ, сколько слѣдующими способами: 1) такъ наз. охотой съ западками, 2) охотой по порошѣ и 3) охотой съ ловчими птицами.

Охота съ западками производится слѣдующимъ образомъ. На тропинкахъ кустарныхъ и бурьянныхъ зарослей, по которымъ такъ любятъ бѣгать эти птицы, роются продолговатыя ямки, каждая около аршина глубиною и не болѣе четверти аршина шириною. Ямка закрывается тоненькой дощечкой, укрѣпленной черезъ средину на туго натянутой веревкѣ или на конскомъ волосѣ. Затѣмъ дощечка прикрывается сухой травой, соломой или листьями, и западня готова. Какъ только птица попадаетъ на дощечку, послѣдняя перевертывается, и

птица падаетъ въ яму. Иногда такимъ образомъ въ одну яму попадаетъ двѣ птицы.

Охота по порошть еще губительные и только то обстоятельство, что въ области занятой турачомъ сибгъ выпадаетъ не ежегодно и, если выпадаеть, лежитъ не долбе изсколькихъ дней, спасаетъ турача отъ быстраго и окончательнаго истребленія. Дѣло въ томъ, что турачъ, не привыкшій къ сибгу, боится его и забивается въ тотъ кустъ, около котораго его засталъ сибгъ. Здѣсь онъ сидитъ до тѣхъ поръ, пока голодъ не заставитъ его отправиться на поиски за кормомъ, но и тогда, побѣгавъ немного, онъ сиѣшитъ опять укрыться въ кустъ. Зная это, туземцы отправляются разыскивать турачей по слѣдамъ, и подходя къ шихъ почти въ упоръ, убиваютъ безъ промаха не только изъ ружей, но даже изъ пистолетовъ, стрѣляя большею частью неполнымъ зарядомъ и не дробью, а рубленымъ свинцомъ, мелкими гвоздями, кусочками чугуна и т. д. Иногда можно даже ударить турача налкой или поймать руками, до того крѣпко онъ забивается въ кустъ.

Несмотря на высокія качества турачинаго мяся, пара этихъ птицъ обыкновенно идетъ въ продажѣ по 30 к.

85. Кавказскій фазанъ. Phasianus colchicus, L.

Табл. 90.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 548. Болѣе распростр. названіе: фазанъ.

Мъстныя названія: миджарскій пътухъ (у русскихъ поселенц. на Терекъ, Кумъ и Кубани).

Киргиз.- тат. — карка-уль. — Қалм. — пуртуль. — Грузии. — хохоби. — Армян. — фазіянь. — Персид. — картоваль и партауль.

Распространеніе и образъ жизни фазана были указаны мною настолько подробно, что едвали къ этому надо еще что-нибудь дополнять.

"Кавказскій фазанъ, —писалъ я, -- имфетъ своею родиной рфчныя долины съвернаго Кавказа и Закавказья, восточный и отчасти южный берегъ Чернаго моря и западный Каспійскаго. Вообще говоря, эта птица водится на Кавказъ еще во множествъ, но мъстами съ необычайною быстротой истребляется промышленниками, и потому можно насчитать много мъстъ, гдъ прежде фазанъ водился въ очень большомъ количествъ, а теперь совсъмъ не встръчается. Бываетъ, впрочемъ, и такъ, что немногіе уцълъвшіе почти отъ поголовнаго истребленія фазаны извъстной области, благодаря своей плодливости, успъваютъ вновь размножиться въ большомъ количествъ въ немного лътъ; или же кто-нибудь благоразумно перевезеть итсколько паръ фазановъ туда, гдѣ они истреблены, и эти, искусственно ввезенныя особи вновь населять временно опустошенный участокъ. Н. Я. Динникъ сообщаеть стъдующія интересныя свъдънія о распространеніи фазана на съверномъ Кавказъ: "Фазанъ встръчается почти всюду на Кавказъ, -- говоритъ онъ, — гдѣ только есть удобныя для него мѣста, т.-е. небольшіе лъса, пересъченные полянами и перемежающеся съ кустарниками, или же камыши; кром'ь того, фазанамъ очень нравится близость воды, поэтому любимымъ мъстопребываніемъ ихъ служатъ долины почти всъхъ кавказских в фъкъ, окаймленных в бол ве или мен ве широкими полосами

лѣса, кустарниковъ или камышей. Фазаны живутъ всегда и на рѣчныхъ островахъ, если только они покрыты подходящею растительпостью. Въ Кубанской области они распространены почти отъ самаго впаденія Кубани въ море до Хумаринской крівпости. Около послівдней я пъсколько разъ убивалъ по 5 или 6 фазановъ въ заросляхъ, состоящихъ главнымъ образомъ изъ облѣпихи или, какъ ее называютъ на Кавказъ, дерезы (Hyppophaë rhamnoides); выше Хумары по Кубани фазановъ уже игьтъ вовсе. Что касается притоковъ Кубани съ дівой стороны ея, то только по Тебердів и Доуту, протекающимъ между высокими горами, фазановъ нътъ вовсе; по долинамъ же Больного и Малаго Зеленчука, Урупа, Лабы, Балой и т. д. фазаны живутъ вездъ, за исключениемъ верховьевъ этихъ ръкъ. На Маломъ Зеленчукъ, наприм., они доходять до ст. Кардоницкой, на Б. Зеленчукъ-до ст. Зеленчукской, на Лабъ до Каладжинской и т. д., - словомъ, до мъстъ, лежащихъ на высотъ около двухъ или двухъ съ половиной тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря, гдф долины сильно суживаются и окружаются высокими горами.—Что касается Ставропольской губернін, то въ запалной половинъ ея фазановъ вовсе нътъ. Ихъ нътъ и въ долинъ Калауса; сохранились они только въ восточной части губерніи, именно по долинъ Кумы и въ Караногайскихъ степяхъ. Прежде они водились около Ставрополя, теперь ихъ тамъ нѣтъ вовсе. На Кумѣ они попадаются, начиная отъ границы Ставропольской губерній и Терской области (недалеко отъ Георгіевска), и отсюда распространились виизъ по теченію до самаго Каспійскаго моря. Около Серебряковской пристани и въ Караногайскихъ степяхъ, изобилующихъ болотами и камышами, фазановъ очень много, а по притокамъ Кумы — Буйволъ, Тумузловкъ и Карамыку, нътъ вовсе. Пораздо богаче фазанами Терская область. По Тереку они водятся, начиная почти отъ Владикавказа и до береговъ Касийскаго моря *). Чамъ ближе къ морю, тамъ большимъ изобиліемъ фазановъ отличаются берега Терека. Въ окрестностяхъ Кизляра ихъ теперь такъ много, что можно въ полдня убить болъе двухъ десятковъ штукъ. Почти столько же фазановъ живетъ и по притокамъ Терека съ правой стороны, наприм. по Сунжъ, Аксаю и т. д.

"По восточному берегу Чернаго моря фазанъ распространенъ отъ Анапы до Батума, но отъ Сухума изсколько на съверъ не встръчается; въ окрестностяхъ Батума очень рѣдокъ; по Ріону поднимается линь до средняго теченія рѣки. Въ Закавказъѣ фазанъ очень обыкновененъ по Курѣ, приблизительно до 2.500′ н. у. м., т.-е. до Гори, по нижнему теченію юры, Алазана и между Нухоїї и Шемахоїї; по Араксу живетъ только въ нижнемъ его теченіи. Что касается занаднаго берега Каспіїскаго моря, то здѣсь фазанъ обыкновененъ на югъ отъ Кизилъ-Агачскаго залива и на сѣверъ отъ Апшеронскаго полуострова. Около

^{*) &}quot;По словамъ Менетрі», фазаны водились прежде и на Бештау, теперь ихъ тамъ ивтъ вовсе".

Ленкорани фазанть уже значительно истреблент; на Аншеронскомъ полуостровъ и въ прилегающихъ мъстахъ распространенію итицы мънаетъ пустынный характеръ мъстности. Вдоль побережья Касийскаго моря фазанъ доходитъ до устья Волги, гдъ водится въ камынахъ на взморъв, по только въ нъкоторые годы зимою залетаетъ до Астрахани. Прежде водился въ устъъ Урала, по къ концу пятидесятыхъ годовъ преслъдованіе со стороны казаковъ, волковъ и хищныхъ птицъ, особенно же зимнее истребленіе камышей, истребили и фазановъ. Въ 1859 году то паръ фазановъ было привезено изъ Астрахани и пущено около Золотинскаго устья (Съверцовъ), по что съ шими сталось, мнѣ неизвъстно. У юго-восточнаго угла Касийскаго моря, по рр. Сумбару, Чандыру и Атреку, а также около Астерабадскаго залива живетъ фазанъ, отличающійся отъ кавказскаго своими бъльми крыльями (Сh. persicus), что приближаетъ его къ великолъннымъ фазанамъ Арало-Касийской низменности (Сh. principalis и chrysomelas).

"Любимое мъсто жительства фазана представляетъ мелкій лъсъ въ долинъ ръки, низъ котораго густо покрытъ кустарной или травянистой зарослью. Чъмъ гуще переплетаетъ хмель, ежевика, виноградъ и другія вьющіяся и ползучія растенія деревья и кустарники, дізая ихъ мало или едва проходимыми, тъмъ охотите селится здъсь фазанъ. Если мфстами лъсъ перемежается съ полянками, фазанъ охотно пользуется ими отъ времени до времени, по вообще эта птица избъгаетъ открытыхъ пространствъ и, будучи застигнута на открытомъ мъстъ, употребляеть вст старанія, чтобы скрыться въ чащть. Гдт штать подходящаго лъса, фазанъ селится въ неменъе непроходимыхъ чащахъ камыша, и только при отсутствін тіххь и другихь угодій занимаєть даже высокій и сравнительно не густой лъсъ. Разведеніе фазановъ въ полудомашнемъ состоянін, впрочемъ, не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что въ выборф мъста для жительства эта птица руководится исключительно желаніемъ обезопасить себя отъ нападенія и, слъдовательно, тъмъ болъе забирается въ чащу, чъмъ болъе подвергается преследованію. Застигнутый на открытомъ месте фазанъ-петухъ сейчасъ же бросается бѣжать изо всей силы, тогда какъ курочка прежде всего прилегаеть къ землъ и пытается спастись спрятавишсь, благодаря своей пестрой окраскъ; если же эта попытка не увънчивается успъхомъ, тогда и курочка убъгаетъ. Хотя фазанъ вовсе не избъгаетъ садиться на деревья, тъмъ не менъе это настоящая наземная птица, которая, даже скрываясь отъ преслъдованія, болъе надвется на свои ноги, нежели на крылья, и только въ крайнемъ случав взлетаетъ. Поднимаясь, фазанъ взлетаетъ прямо вверхъ, съ шумомъ хлопая своими короткими крыльями, и затъмъ несется прямо впередъ, чтобы, пролетъвъ небольшое разстояніе, юркнуть въ заросль. Вит брачнаго времени фазаны держатся обыкновенно небольшими станичками, которыя утромъ и вечеромъ регулярно отправляются на кормежку. Однако утромъ при сильной рость фазаны проснувшись взлетають на деревы и ждутъ здѣсь, пока трава высохнетъ настолько, что имъ легко будетъ ходить по ней. Вода для фазановъ необходима, и они никогда не уходять далеко отъ нея. Инща фазана весьма разнообразна, такъ какъ это и зерноядная и насъкомоядная птица, но больше всего онъ любитъ облитату и черноягодникъ (Ligustrum vulgare).

"Въ половинъ марта или въ началъ апръля фазаны приступаютъ къ размноженію. Хотя пногда и у дикихъ фазановъ случается встрѣтить пртуха съ двумя курочками, все-таки нормально въ естественныхъ условіяхъ это моногамическая итица, тогда какъ въ полудомашнемъ состоянін стала полигамомъ. Въ періодъ размноженія п'втухъ кричитъ обыкновенно утромъ и вечеромъ, по иногда и среди дня. Голосъ его напоминаетъ въ это время крикъ изтуха, только хриштве и короче; его можно передать слогами кор-оркъ, за которыми обыкновенно слъдуеть хлопанье крыльями. Хотя правильныхъ токовъ у фазановъ не бываетъ, встръчающеся въ брачную пору самцы храбро дерутся между собою. Время кладки наступаетъ различно, смотря по мъстности: на съверномъ Кавказъ по крайней мъръ на мъсяцъ, а то и на полтора поздиве, нежели въ Закавказъв. Можно сомивваться, чтобы пътухъ помогалъ самкъ въ устройствъ гивада, но онъ охраняетъ ее и потомъ часто остается при выводкъ, хотя главныя заботы по воснитанію дітей падають на матку. Гиїздо устранвается очень просто въ непролазной чащъ колючаго кустарника: для этого выбирается небольшое углубленіе подъ нависшими в'ятвями, устилается слегка сухой травой и перьями, и гивздо готово. Число янцъ отъ 10 до 18 и даже до 20. Они бураго или оливково-бураго цвъта, всегда безъ пятенъ, слегка блестящи и им'вють въ длину отъ 1,9 до 1,75 д. и въ поперечникъ отъ 1,45 до 1,35 д. Насиживаніе продолжается 25 или 26 дней, и выведшеся птенцы привыкаютъ съ самаго начала слъдовать за маткой, которая преимущественно держится съ ними въ лъсу. Преслъдуемые собакой, лисой, шакаломъ или кошкой, они взлетаютъ на деревья и прячутся въ вътвяхъ, гдъ сидятъ тихо до тъхъ поръ, пока не убъдятся, что опасность миновала. Растутъ фазанята медленно, и больше одной кладки въ году у фазана не бываетъ. Старики линяютъ въ разное время—сначала пѣтухи, потомъ, когда молодые подрастутъ настолько, что могутъ обойтись своими собственными силами, и курочки".

Какъ выше замъчено, въ Астраханской губ. фазанъ гивздится въ почти педоступныхъ камышевыхъ крѣпяхъ, которыя начинаются верстахъ въ 10 ниже Астрахани и тянутся почти до взморья. При высокой весенней водъ мъста гивздовья фазановъ заливаются, и такъ какъ курочки уже усивваютъ къ этому времени спести яйца, послъднія погибаютъ, и такіе годы бываютъ очень бъдны фазанами. Къ счастію для итицы, это бываетъ ръдко: разъ въ 7—8 лътъ. При такомъ разливъ даже старые фазаны страдаютъ отъ голода и бываютъ вынуждены даже залетать въ сады Астрахани.

Что касается охоты за фазанами, то она производится настоящими охотниками и промышленниками. Первые стръляютъ фазановъ изънодъ собаки, а зимой по слъду, вторые или подходятъ къ шилъ при

помощи особаго полотиянаго нцита, отчего ихъ называютъ "полотиянниками", или ловятъ сильями.

Въ Астраханской губ. и во многихъ мѣстахъ сѣвернаго Кавказа ружейная охота за фазанами не трудна, вслѣдствіе отсутствія густыхъ зарослей; не то тамъ, гдѣ фазанъ держится какъ на черноморскомъ побережьѣ Кавказа и кой-гдѣ на сѣверномъ Кавказѣ, въ густыхъ, буквально непролазныхъ колючкахъ: здѣсь, если его и убъень, то часто не достанень ни самъ, ни при помощи собаки, даже если и видно, гдѣ онъ лежитъ.

Охотиться за фазанами можно во всякое время года, если охотнику не мъщаетъ его совъсть, но лучшее и съ извъстной точки зрънія единственное время для охоты — осень и зима. Пожалуй, еще можно также допустить раннюю весеннюю охоту на самцовъ, но принимая во вниманіе, что ръдкій охотникъ удержится отъ стръльбы, если подвернется самка, лучше не вводить себя въ соблазнъ.

Къ осени фазаны оставляютъ камышевыя крѣпп и кустарныя заросли и начинаютъ кочевать въ Астраханской губерни по чаканамъ и кустарникамъ у самыхъ береговъ, на Кавказѣ—сначала по сжатымъ чалтыкамъ (посѣвы сарачинскаго пшена), поздиѣе какъ здѣсь, такъ и по маренникамъ. Въ этихъ мѣстахъ фазаны кормятся съ ранняго утра часовъ до 10—11, а то и до полудня, затѣмъ отправляются въ лѣсъ, а часа за $1\frac{1}{2}$ до захода солнца спова возвращаются въ поля для кормленія.

Охотиться съ собакой можно и въ одиночку и партіями. Фазанъ вообще хорошо выдерживаетъ стоїку, зимой же лежитъ такъ крѣпко, что собака часто должна броситься на него, чтобы заставить его взлетѣть. При охотѣ партіей, отъ 4 до 10 охотниковъ идутъ въ линію, другъ отъ друга шаговъ на сто, имѣя передъ собою собакъ (на охотѣ за фазанами сеттера предпочитаются всѣмъ остальнымъ породамъ). Какъ только какая-нибудь собака сдѣлаетъ стоїку и фазанъ взлетитъ, ближайшій охотникъ стрѣляетъ въ него. Хотя промахнуться при этомъ очень трудно, однако бываетъ такъ, что фазанъ благополучно пролетаетъ всю цѣпь охотниковъ. Лучшій моментъ для стрѣльбы, когда фазанъ поднимается вверхъ. Стрѣляютъ эту птицу обыкновенно дробью №№ 8, 9 и то. Если фазанъ только раненъ, онъ бѣжитъ такъ быстро, что даже собака съ трудомъ можетъ догнать его.

Зимой, когда собакѣ трудно искать фазана, охотники ищутъ его сами, безъ ея помощи, по свъжему слъду; при этомъ фазанъ, зарывшись въ легкій снътъ, лежитъ иногда такъ крѣпко, что подпускаетъ къ себъ буквально на два шага.

Что касается охоты промышленниковъ, то она состоитъ въ томъ, что фазана отыскиваютъ подъ прикрытіемъ полотна, которое охотникъ несетъ передъ собою вродѣ небольшого щита, высматривая фазана черезъ небольшое сдѣланное въ полотнѣ отверстіе. Фазанъ при видѣ человѣка обыкновенно обращается въ бѣгство, но бѣлое полотно его нисколько не смущаетъ, и при видѣ его онъ продолжаетъ кормиться,

какъ пи въ чемъ ни бывало, не подозрѣвая угрожающей ему опасности. Такимъ образомъ промышленникъ не только подходитъ къ птицѣ на върный выстрѣлъ, но еще ждетъ, пока сойдутся двѣ или болѣе, чтобы пе тратитъ заряда на одиу.

Наконецъ, силки становятся самымъ обычнымъ порядкомъ.

Хотя фазаны легко размножаются, однако спросъ на нихъ въ стопидахъ и по желъзнодорожнымъ станціямъ Кавказской съти желъзпыхъ дорогъ вызвалъ такое ихъ истребленіе, что на Кавказъ во многихъ мъстахъ эта птица оказалась близкою къ конечному истребленію.
Своевременно наложенное запрещеніе на дальнъйшее уничтоженіе фазановъ, конечно, дастъ имъ возможность опять быстро размножиться,
а тъмъ временемъ въ торговлъ на смъну кавказскому фазану явились
туркестанскіе. Когда истребленіе и этихъ пошло впередъ гигантскими
нагами, пришлось наложить запрещеніе на добываніе и ихъ. Но торговля дичью не дремлетъ, и ныпъшней зимой на смъну туркестанскимъ
фазанамъ въ Москвъ, а отсюда, въроятно, и въ Истербургъ появились
амурскіе фазаны.

Усчитать общее количество фазановъ, поступающихъ въ продажу, трудно, но въ Москвъ и въ Петербургъ въ среднемъ въ годъ продается 10.000—12.000 паръ при цънъ до 4—5 р. за пару, тогда какъ на мъстъ цъна за пару і р. 20 к.—і р. 50 к. Нъкоторые московскіе торговцы дичью ръшили даже прямо отправиться въ Благовъщенскъ на Амуръ за фазанами, зарапъе высчитавъ барыни отъ этой поъздки, къ слову сказать, весьма немалые, т. к. проъздъ и провозъ дичи по желъзной дорогъ стоитъ недорого. Манчжурскіе фазаны пока еще очень низки въ цънъ, да, кромъ того, смътливый торговецъ сумъетъ найти и другія дъла по дорогъ.

٧.

РЯБКИ.



86. Копытка. Syrrhaptes paradoxus, Pall.

Табл. 91.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 555. Болъе распростр. названіе: саджа.

Мѣстныя названія: копытка (у Астрахан, охоти.). Татар. — бюлдерюкъ. — Кирг. — типленузъ.

Въ настоящее время копытка или бюлдерюкъ гибэдится во всѣхъ Киргизскихъ степяхъ на западъ до Волги и къ сѣверу до 48—49° с. ш., но ежегодно не въ одномъ и томъ же количествѣ и не въ однихъ и тѣхъ же мѣстахъ. Осенью и зимою, когда эти птицы ведутъ кочевой образъ жизни, онѣ и въ Киргизскихъ степяхъ появляются въ гораздо большемъ количествѣ, нежели лѣтомъ. На сѣверномъ Кавказѣ и въ Закавказъѣ это случайно залетная птица въ пустынныхъ участкахъ береговой зоны Каспійскаго моря.

Копытка сдълалась особенно извъстна своими періодическими нашествіями на Европу. Первое выселеніе сюда относится къ 1859 г. Затѣмъ до 1863 г. ничего не было извѣстно о появленіи бюлдерюка въ Европѣ, но весною этого года сотни, а можетъ быть и тысячи этихъ птицъ появились въ Европъ, гдъ долетъли до Архангельска на съверъ, до Фарерскихъ о-въ и Прландін на западъ и до Италін на югъ. При этомъ многія парочки начинали гитвідиться въ той странт, куда попали случайно и гдѣ нашли подходящія мѣста, особенно въ Даніи и Голландіи, но охотники, промышленники и коллекторы скоро истребили ихъ. Прошло 25 лѣтъ и весною 1888 г. безчисленныя стада бюлдерюковъ снова наводнили Европу. Во многихъ мѣстахъ на этотъ разъ пытались оградить гитэдящіяся парочки бюлдерюковъ, но, сколько я знаю, это удалось лишь въ теченіе слѣдующаго года; позднѣе бюлдерюки были все-таки истреблены. Что касается переселенія бюлдерюковъ черезъ Европ. Россію, то мы знаемъ, что птички прилетѣли къ намъ прямо съ востока черезъ Киргизскія степи и, достигнувъ волжско-уральскихъ степей, разсыпались в феромъ. Этимъ объясняется какъ то, что ихъ почти не было въ Тобольской губ., такъ и то, что только одиночные экземиляры попали, напримъръ, въ Уфимскую губ., несмотря на ея близость отъ тъхъ воротъ, черезъ которыя пролетъли стан бюлдерюковъ изъ Азін въ Европу. И у насъ бюлдерюки начали было гиъздиться мъстами, какъ, наприм., въ Харьковской губ., но, конечно, не удержались здъсь.

Въ разныя части Европ. Россій, напримъръ, Донскія степи и по Волгъ до Казанской губ., отдъльныя особи копытокъ залетаютъ и виъ времени массовыхъ переселеній птицы.

За копыткой охотятся болѣе или менѣе случайно, встрѣтивъ ее при другой степной охотѣ. Птица подпускаетъ къ себѣ довольно легко, если ее обходить, а не идти на нее прямо, хотя и не присѣдаетъ къ землѣ, подобно куропаткамъ и куликамъ.

87. Рябокъ чернобрюхій. Pterocles arenarius, Pall.

Табл. 92.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. l, стр. 560.

Болъе распростр. названія: рябокъ чернобрюхій, бюлдерюкъ (ошибочно).

Мъстныя названія: стенной рябокъ (Киргиз. ст.); цвъншая куропатка (Астрахан.).

Татар. -- джеракъ, былдерыкъ. -- Персид. -- сійл сина.

Въ Европейской Россіи чернобрюхій рябокъ гибэдится въ Киргизскихъ степяхъ на западъ до Волги и къ съверу до 47°—48° с. ш. Изрѣдка залетаетъ въ степи по нижнему Дону и даже далъе на западъ, съ одной стороны, и къ Оренбургу, съ другой. Кромъ того, чернобрюхій рябокъ распространенъ въ Закавказъъ, въ пустынныхъ степяхъ по Куръ и Араксу и на плоскогоріяхъ русской Арменіи, поднимаясь до 5000′ н. у. м.

Вотъ что пишетъ объ этихъ рябкахъ П. С. Назаровъ.

"Рябки летають отдѣльными стайками, но стайки эти иногда очень многочисленны, вся мѣстность по временамъ бываетъ покрыта ими. Питаются они сѣменами полынокъ и солянокъ. Каждое утро и вечеръ аккуратно летаютъ на водопой, въ одно опредѣленное мѣсто, иногда при недостаткѣ воды вблизи рябки летаютъ очень далеко; часто пользуются колодцами, вырытыми киргизами. Пьютъ рябки почти всякую воду, кромѣ очень соленой, и заразъ пьютъ такъ много, что у убитыхъ птицъ выливается изо рта съ чайную чашку воды. Распространеніе ихъ весьма неравномѣрно: годами въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ихъ бываетъ очень много, но зато иногда ихъ вовсе не видно. Все лѣто рябки блуждаютъ стаями по степямъ, и гдѣ найдется одинъ, то навѣрное уже ихъ будетъ много. Главное ихъ мѣстопребываніе составляютъ барханные пески. Вообще песокъ, солянки и полынь для нихъ необходимы. Въ концѣ сентября и въ октябрѣ рябки улетаютъ на югъ. Линяютъ въ половинѣ августа".

Голосъ чернобрюхаго рябка походитъ на звуки "тчуррр.... тчурррр....", которые онъ издаетъ на лету.

88. Рябокъ бѣлобрюхій. Pterocles alchata sewertzowi, Bgdn.

Табл. 93.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 565.

Болѣе распростр. названія: рябокъ былобрюхій, былдерыкъ (ошибочно).


Мъстныя названія: пагталь (Бухарско-татар.).—Перс. — као-каръ.

Бълобрюхії рябокъ распространенъ у насъ тамъ же, гдѣ и чернобрюхії, но въ Европ. Россіи положительно не гиѣздится и даже въ качествѣ залетної птицы не идетъ такъ далеко къ сѣверу, какъ предъпдущії видъ. По имѣющимся свѣдѣніямъ, бѣлобрюхії рябокъ очень рѣдко залетаетъ въ область нижняго теченія Урала и на Хобду, на нижней Волгѣ до сихъ поръ не былъ замѣченъ, но бываетъ въ Екатеринославской губ., куда, быть можетъ, залетаетъ изъ Малой Азіи. Что касается Кавказа, то нельзя считать доказаннымъ, что эта птица водится въ Кумо-Манычскихъ степяхъ; но она водится въ пустыняхъ Закавказскаго края, лежащихъ на западномъ берегу Каспійскаго моря, и встрѣчается зимою, а можетъ быть и гиѣздится въ пустыняхъ по теченію Куры и Аракса.

По образу жизни бѣлобрюхій рябокъ ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ чернобрюхаго, но голосъ его другой: это—отрывистыя "га! га!" или "ганга!"

По словамъ Н. А. Заруднаго, гивадится или отдъльными парочками или обществами и въ последнемъ случав помъщаетъ гивада на разстояни 15—30 шаговъ. Каждое гивадо, расположенное на самомъ солнечномъ припске, представляетъ небольшую круглую площадку, расчищенную отъ валявшихся на ней сухихъ былинокъ, которыя иногда образуютъ вокругъ илощадки родъ валика. Число ящъ 2—3, редко 4. Основной фонъ ихъ бело-буроватый, съ многочисленными округлыми пестринками въ виде пятнышекъ и точекъ темно-бураго, буроватосераго и даже пепельно-сераго цвета. Длина ящъ несколько менее 2 д., поперечникъ около 1,25 д. Весьма возможно, что рябки выводятся несколько разъ въ лето; по крайней мере въ начале йоня случается доставать самочекъ съ вполне развитыми яйцами и въ то же время видеть уже летающихъ итенцовъ.

VI. ГОЛУБИ.



89. Горлица. Turtur auritus, Gray.

Табл. 94.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 569.

Болье распростр. названія: горлица, горлинка (болье или менъе повсемъсти.).

Мъстныя названія: степной юлубь (у лип, казак, Оренбург, кр.); туркавка (Астрахан. губ.); юрленокъ, брличка, орлина (Малоросс.).

Польск.—turkwaka.—Латыш.—uhbele.—Фин.—turturikyyhkynen.
Мордов.—колтой-примечь.—Калмыцк.—бухурший.—Груз.—перити.— Армян.—титрикъ.

Какъ я уже писалъ ранъе, распространеніе у насъ столь обыкновенной птицы какъ горлица далеко не лишено интереса. Страннымъ образомъ она, повидимому, не гизадится въ Эстляндін, губ. Петербургской, Новгородской, Псковской и даже юживе отсюда, въ обішірной лівсистой области, направляющейся къ истокамъ Дивпра. Но въ Курляндін, Лифляндін, губ. Тверской и южной части губ. Вологодской горлица гитздится, хотя ръдко. Такимъ образомъ, какъ еще опредѣлилъ Межаковъ, едва ли гордица въ качествѣ гнѣздящейся птицы переходитъ за 60° с. ш., хотя, какъ залетная, найдена въ губ. Нюландской и въ Лапландін (область Торнео и Варангеръ-фіорда). Отъ 60 с. ш. въ юго-западной части Вологодской губ. сѣверная граница распространенія горлицы постепенно спускается къ Уралу, гдф едва ли горлицу можно найти съвернъе 58° с. ш., такъ какъ она уже подъ Екатеринбургомъ крайне рѣдка. Къ югу отъ проведенной сѣверной границы горлица распространена во всей странѣ и гнѣздится даже въ безлъсныхъ степяхъ Оренбургскаго края, но вездъ лътняя птица. Даже на Кавказъ, гдъ горлица на съверномъ склонъ поднимается до 3.000′, а на южномъ гораздо выше, до 6.000-7.000′, это перелетная птица, поздно появляющаяся весною и рано улетающая осенью.

Горлица прилетаетъ къ намъ очень поздно; даже и въ окрестностяхъ Ставрополя она появляется нормально лишь между 20 и 27

апрѣля, и только изрѣдка съ 15 апрѣля. Точно такъ же и въ Оренбургскомъ краѣ лишь отдѣльныя особи наблюдаются въ концѣ апрѣля, собственно же пролетъ происходитъ въ первыхъ числахъ мая. Но въ западной Россіи, именно въ Новороссійскомъ краѣ и по Диѣпру, горинца прилетаетъ нѣсколькими днями раньше, выгадывая ихъ вѣроятно на болѣе короткомъ разстояніи своего пролетнаго пути съ зимовокъ. Благодаря этому, горлица усивваетъ прилетѣть въ концѣ апрѣля уже и въ среднюю Россію, и только у сѣвернаго предѣла своей области гиѣздовья появляется около 1-го мая. Самый поздній прилетъ наблюдается на Уралѣ, гдѣ, напримѣръ, въ Уфимской губ., горлица появляется только въ началѣ мая.

Весною горлицы прилетають къ намъ стайками до 20 штукъ въ каждой, не болже, и, подобно другимъ голубямъ, летятъ неправильной кучкой, обыкновенно не особенно высоко. Осенью онъ начинаютъ исчезать уже очень рано. Такъ, изъ съверной половины ихъ области гиъздовья уже во второй половинъ августа, изъ южной Россіи—въ ноловинъ сентября. По наблюденіямъ Н. Н. Сомова, отлетаютъ, повидимому, вдругъ громадной стаей, по всему въроятію на заръ; но это относится, конечно, только къ тъмъ мъстностямъ, гдъ, какъ въ южной Россіи, горлицы многочисленны; изъ средней Россіи онъ отлетаютъ стайками, какъ и прилетаютъ сюда весною.

90. Голубь дикій, сизый. Columba livia, Briss.

Табл. 95.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 577.

Болѣе распростр. названія: голубь, сизый голубь.

Мѣстныя названія: сизарь (Қазан. губ.).

Польск. — goleb. — Лат. — meschahalloschi. — $\exists cr. - mets-tuike$. — Φ_{IIH} . —

kesykyyhkynen.

Татар.— кулриенъ. --Башкир.— кусресиъ.—Спо. тат.— стайдакъ.— Морд.— примечъ.— Пермяц.— діндикъ.—Вот.— дудикъ.—Остяц.— кёотаръ.— Черемис.— когеринъ. — Чуваш. — кватарсинъ. — Калм. — кінгінлджиргана. — Тунг. — тінша. — Армян. — агавникъ. атавни. — Бухар. — кабутиръ. — Кавк. тат.— готарчинъ. — Груз. — треди. — Персид. — къощтеръ.

Очень трудно указать въ предълахъ Европ. Россіи мѣста гиѣздовья настоящаго дикаго голубя, такъ какъ на это до сихъ поръ обращается очень мало вниманія, но по країней мѣрѣ можно перечислить слѣдующія: горы Крыма и Кавказа; скалистые берега Дона, Донца, Волги, Бѣлой и даже болѣе незначительныхъ рѣкъ, какъ-то Свіяги, Уфы и Ая; южные отроги Урала; Мугоджары; Индерскія горы. Кромѣ того, голуби гнѣздятся по берегамъ озера Аслыкуль, въ Губерлинскихъ горахъ у праваго берега р. Урала и въ обрывахъ береговъ у водъ Киргизскихъ степей.

Въроятно это осъдлая птица даже восточной Россіи; но въ нъкоторые годы осенью мъстами наблюдаются перелеты громадныхъ стай голубей, повидимому не имъющіе значенія періодическихъ странствованій.

91. Клинтухъ. Columba oenas, Briss.

Табл. 96.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 582.

Болье распростр. названія: дикій голубь, клинтухъ.

Мѣстныя названія: клинтухъ, дикій голубь, малый льсной голубь, малый вялирь (Оренбург.); климицъ (Малор.).

Польск. — siniak. — Эст. — mets-tuike. — Лат. — mescha ballodis. — Фин. — metsäkyyhkynen. — Груз. — кедани.

Клинтухъ распространенъ у насъ очень широко. Въ Финляндии

онъ гитвадится къ стверу до 61°40′ с. ш., но распространенъ здъсь не одинаково въ разныхъ частяхъ страны. Такъ, онъ обыкновененъ мъстами въ Абосской губ., ръдокъ въ Нюландской, очень ръдокъ въ Тавастгусской, только залетаетъ въ окрестности сфвернаго конца Ладожскаго оз. Кесслеръ нашелъ его у Онежскаго оз., но для Вологодской губ. этотъ голубь не упоминается Межаковымъ, хотя въроятно водится въ ея юго-западной части. Далже на востокъ онъ еще гижздится въ Казанской губ. и на восточномъ склонѣ Урала доходитъ въ небольшомъ числѣ къ сѣверу до 560—570 и, можетъ-быть, въ видѣ псключенія залетаетъ до 58°. Въ Западной Сибири клинтухъ уже не гифздится, хотя вфроятно залетаеть сюда или съ Урала, или изъ Туркестана. Отъ проведенной съверной границы клинтухъ распространенъ въ качествъ гнъздящейся птицы во всей Россіи, кромъ юговосточнаго угла страны. Здёсь клинтухъ гиёздится по среднему теченію р. Урала, отъ Орска до Уральска, и на нижнемъ теченіи Илека. но не юживе. Въ Астраханской губ. клинтухъ бываетъ только на пролетъ, какъ и въ большей части земли Уральскаго казачьяго войска, но подъ Гурьевомъ небольшая часть клинтуховъ остается на зиму.

Что касается времени появленія у пасъ клинтуховъ, то уже на

На Кавказт и въ Крыму клинтухъ живетъ осъдю; въ Закавказът къ мъстнымъ зимою присоединяется большое количество прилетающихъ

съ съвера.

основаній сказаннаго о распространеній этой птицы можно ожидать, что ея прилетъ начинается весною очень рано, равно какъ, съ другой стороны, отлеть осенью происходить поздно. И дъйствительно, это вполить подтверждается наблюденіями. Что касается западной половины Россін, то мы видимъ, что здъсь клинтухъ съ конца февраля и до половины марта успѣваетъ уже занять свои гнѣздовыя мъста по среднему Дивпру, и во второй половинъ марта появляется въ Прибалтійскомъ крав. Въ среднюю Россію эта птица прилетаетъ также очень рано, именно въ концъ марта. Относительно восточной Россіи наблюденія совершенно аналогичны. Такъ, подъ Гурьевомъ въ очень раннюю весну прилетъ клинтуховъ начинается уже въ концѣ февраля, но чаще только около половины марта; соотвътственно этому самое раннее появленіе клинтуха подъ Оренбургомъ происходить въ первыхъ числахъ марта, нормально же въ последнихъ числахъ этого месяца, при чемъ въ наибольшемъ количествъ клинтухъ пролетаетъ въ первыхъ числахъ апръля. Въ Уфимской губ, пролетъ продолжается съ двадцатыхъ чиселъ марта до конца первой трети апръля; въ Казанской первые клинтухи прилетаютъ въ концъ марта и напбольшее ихъ количество въ первой половинъ апръля.

Отлетъ клинтуховъ изъ сѣверной полосы ихъ области гнѣздовья происходитъ въ теченіе сентября и первой трети октября; въ средней полосѣ клинтухи пролетаютъ въ теченіе второй половины сентября и всего октября, наконецъ, на югѣ остаются до половины ноября.

92. Вяхирь. Columba palumbus, L.

Табл. 97.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 587. Болъе распростр. названія: вяхирь, витютень.

Мѣстныя названія: большой вякирь, большой льеной голубь (Оренбург.); припутень, препотень (Малоросс.); трепетень (тамъ же, по Чернаю).

Польск.—grzywacz.— Эстон.— meigas; — въ Лифл.—hütt.— Лат.— poh-gais mescha ballodis.—Фин.—sepelkyyhhynen.—Тат. кавк.—чель-погарчинь.— Арм.—дрропъ.

Распространеніе вяхиря у насъ весьма общирно. Какъ гитадящаяся птица, онъ поднимается въ Финляндіи къ стверу до 64° въ прибрежной полость около Ботническаго залива и до 64°25′ далтье на востокъ; довольно обыкновененъ лътомъ подъ Архангельскомъ, но отсюда къ востоку стверная граница распространенія этой птицы постепенно понижается, и на Уралть вяхирь доходитъ приблизительно до 60°—61° с. ш., хотя, по Сабантьеву, постепенно распространяется на стверъ. Къ югу отъ этой стверной границы вяхирь гитадится по всей Европ. Россіи, а также въ горахъ Крыма и Кавказа, поднимаясь въ послъдней области почти до верхней границы высокоствольныхъ лиственныхъ деревьевъ (дуба, бука, клена и т. д.), но въ юго-восточной Россіи эта птица не гитадится южитье средняго теченія р. Урала, исключая низовьевъ Илека и долины Урала, итъсколько ниже Уральска, хотя по Волгть идетъ до взморья. Въ Закавказъть зимуетъ во множествть въ низменностяхъ.

Что касается южной Россіи, то здѣсь вяхирь прилетаетъ приблизительно въ одно время съ клинтухомъ, или лишь немного позднѣе его, именно въ первой трети марта; но въ средней и сѣверной Россіи прилетъ вяхиря происходитъ недѣли на три и даже на четыре позднѣе клинтуха. Осений отлетъ начинается въ средней Россіи въ началѣ сентября и оканчивается въ октябрѣ, на югѣ длится до ноября. Въ разгаръ пролета вяхири соединяются въ стаи до ста, полутораста

и даже трехсотъ экземиляровъ, по летять сравнительно медленно, дъдая продолжительныя остановки въ дубовыхъ дъсахъ или въ участкахъ лъса, гдъ есть дубы. Г. Дииникъ совершенно върно объясияетъ это предпочтеніе, отдаваемое птицей дубу, какъ тфмъ, что жолуди даютъ вяхирю обильный кормъ, такъ и тъмъ, что дубъ дольше сохраняеть листву и потому даеть надежное убльящие скрывающимся въ ней голубямъ. Медленный пролеть на большей части страны приводить на крайнемъ южномъ предълъ къ сравнительно короткому, но зато чрезвычайно многочисленному пролету. Такъ, Нордманъ говоритъ, что отъ Анапы до Трапезунда вдоль берега Чернаго моря вяхири осенью пролетають въ теченіе 10—15 дней въ громадномъ числъ. На съверномъ Кавказъ пролетъ вяхирей длится иногда съ мъсяцъ, иногда недъли три, но масса птицъ продстаетъ въ течение недъли или десяти дней. Н. Я. Динникъ говоритъ, что въ 1875 году въ окрестностяхъ Ставрополя до 25 септября было очень мало вяхирей, а 26 сразу явилось такое страшное количество, что онъ въ одинъ день видълъ не менфе десяти тысячъ штукъ, а можетъ быть и гораздо болфе. До 3-го октября л'єсь быль просто запружень ими, но 5-го въ л'єсу были замѣчены только двъ небольшія стайки, да штукъ 7 въ одиночку.

Какъ извѣстио, охота за голубями не признается настоящими охотниками. Между тѣмъ охота эта вовсе не изъ легкихъ, за исключеніемъ, конечно, охоты за горлицами, которыя, гнѣздясь часто въ непосредственной близости человѣка, легко подпускаютъ на выстрѣлъ. И клинтухъ, и особенно вяхирь обладаютъ очень быстрымъ и сильнымъ полетомъ, и убить дикаго голубя на лету, особенно весною, удается далеко не каждому стрѣлку. Кромѣ того, мясо дикихъ голубей сочно и вкусно, за исключеніемъ, конечно, времени выкармливанія дѣтей. Но какъ бы то ни было, голубей не цѣнятъ.

Весною дикихъ голубей можно стрѣлять или случайно, или когда они займутъ свои гнѣздовыя иѣста, во время посъщения ими прошлогоднихъ яровыхъ полей, куда они правильно вылетаютъ кормиться по утрамъ и вечерамъ. Однако, въ это время они очень строги и пѣшаго не подпускаютъ къ себѣ въ открытомъ полѣ ближе какъ на двѣсти шаговъ, почему охота за ними возможна только съ подъѣзда. Позднѣе, когда начнется посѣвъ ярового, дикіе голуби слетаютъ на свѣжую пашню и, привыкая къ людямъ, позволяютъ подходить къ себѣ и охотнику, идущему за сохой или около бороны. Въ лѣсу можно подходить къ дикимъ голубямъ на ихъ воркованье, но стрѣльбѣ здѣсь мѣшаетъ высота деревьевъ и густая хвоя.

Совсѣмъ другое дѣло охота въ концѣ лѣта, когда дикіе голуби уже цѣлыми выводками начнутъ посѣщать жнивья, вылетая сюда изъ лѣса утромъ и вечеромъ. Утромъ они слетаютъ на жнивья съ восходомъ солнца и остаются здѣсь часовъ до 8—10, вечеромъ часовъ въ 5 и остаются до 7—8. Сначала голуби держатся небольшими стайками, выводка по два, потомъ стаи становятся все многочисленнѣе и многочисленнѣе, доходя до нѣсколько сотъ голубей въ каждой. Такъ

какъ въ концѣ лѣта голуби постоянно видятъ въ полѣ людей, послѣдніе уже не пугаютъ ихъ, и охотникъ можетъ безъ особаго труда подойти къ стаѣ или съ косцами и сѣяльщиками, или же подкрасться изъ-за копевъ. Позднѣе, когда хлѣбъ свезутъ съ поля, къ голубямъ опять приходится подъѣзжать, такъ какъ отдѣльно идущій человѣкъ не внушаетъ имъ довѣрія. При этомъ за общее правило надо принять, что утромъ голуби, проголодавшіеся за ночь и еще не насытившіеся, гораздо смирнѣе, нежели въ вечерніе часы.

Для стрѣльбы голубей надо употреблять дробь не мельче № 6, особенно для вяхирей, очень сильныхъ и крѣпко сложенныхъ.

VII. ПЛАСТИНЧАТОКЛЮВЫЯ.



93. Лутокъ. Mergus albellus, L.

Табл. 98.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 595.

Болѣе распростр. названія: лутокъ, нырокъ, поганка, утка рыбачка.

Мъстныя названія: острота, острюла (на Дифирф).

Пол. — szlacharek. — Лат. — dukkeris, dunzka. — Фин. — herna. — Лапл. —

ушигло, ушило (Швед.-Фин. Лапл.), ушвело, ушило, ошило.

Тат. — магаче, кирінтеръ-маръ-урдакъ. — Зыр. — семицръ. — Вог. — симсяръ. — Ост. на Оби - симсеръ, у Сургута-кычаки, у Нарыма-коницан. — Самовд. - ламеничать. - Тупг. - момри.

Область распространенія лутка, какъ гитздящейся птицы, поднимается къ съверу даже выше полярнаго круга, но только въ Европ. Россін, именно въ области Волги, спускается къ югу до 47^{0} с. ш.

Въ Европ. Россіи дутокъ гнъздится въ Лапландін, въ Финляндін, къ югу до 65° с. ш. и далъе на западъ. Къ сожалънію, особыхъ подробностей о распространении дутка въ Архангельской, Вологодской и Вятской губ. мы не знаемъ. Но онъ, несомнѣнно, гнѣздится въ области Онежскаго оз., по Съверной Двинъ до Архангельска, въ лъсной области нижней Печоры и въ лъсной части Пермской губ. Далъе къ югу лутокъ гнѣздится въ Уфимской губ. и по всей средней и нижней Волгъ, отъ Казанской губ. до Астраханской. Главной приманкой для лутка по Волгъ служатъ дуплистыя ветлы, гдъ гнъздится эта красивая птина. Что касается теченія Волги вверхъ отъ Казанской губ., то здѣсь распространеніе лутка недостаточно прослѣжено, но можно думать, что онъ гнъздится не только въ Вятской и Вологодской губ., но и во многихъ поволжскихъ. Въроятно, гнъздится въ губ. Тверской, Новгородской и Псковской и, несомнънно, гнъздится, но не ежегодно и въ очень небольшомъ числѣ, по Окѣ и въ губ. Воронежской. Въ Петербургской, Прибалтійскомъ краф, Польшф, по Дифпру, Дону п ихъ притокамъ, а также по притокамъ средней Волги, по рр. Уралу

и Эмот дутокъ бываетъ на продетъ, но въ Польшт и въ южной Россіи, отъ Харьковской губ. на съверт до Чернаго моря на ютъ, бываетъ и на продетъ и зимою. Зимуетъ и на Касийскомъ моръ, отъ его съвернаго побережья до южнаго, и въ Закавказъъ, но гитъздованье дутка на Кавказъ мало въроятно.

Пока у насъ имъется очень мало данныхъ о времени прилета и отлета дутка въ разныхъ частяхъ страны. Въ Харьковской губ. дутки въ одиночку показываются съ конца первой и съ начала второй трети марта; валовой пролеть бываеть съ середины марта и до конца второй трети этого мъсяца. Въ Уфимской губ. лутки появляются въ концъ нервой трети апръля, въ Московской губ. въ концъ марта или въ началь апрыля, въ Прибалтійскомъ краз въ началь второй трети апръля. Такимъ образомъ для большей части страны лутокъ является одной изъ раниихъ прилетныхъ птицъ, что объясняется отчасти близостью его зимовокъ, отчасти родомъ пищи, для добыванія которой онъ нуждается только въ свободной ото льда водъ. Относительно запаздываетъ прилетомъ лутокъ только въ съверную Финляндію и Лапландію. Въ Оренбургскомъ крат лутки показываются уже въ половинт августа, очевидно кочующія стайки изъ ближайшихъ мѣстъ гнѣздовья, пролетъ же собственно происходитъ въ сентябрѣ и октябрѣ. Въ устьяхъ рр. Урала и Эмбы лутки остаются до последнихъ чиселъ октября. Въ средней Россіи лутокъ пролетаетъ въ сентябръ, въ области Балтійскаго моря—въ половинъ октября. Въ Харьковской губ. съ середины, чаще же съ коица сентября начинаютъ показываться молодыя птицы, въ наибольшемъ числѣ онъ попадаются около половины октября, а къ концу этого мъсяца замъчаются старые самцы, ръдко когда появляющіеся раньше. Отлетають отсюда лутки въ самомъ концт октября пли въ началт ноября, но въ благопріятныя зимы здѣсь попадаются старые самцы, прилетающіе, вѣроятно, изъ болѣе съверныхъ мъстъ уже среди самой зимы. Въ Новороссійскій край лутовъ прилетаетъ въ половин в ноября и сначала держится большими стаями по озерамъ, а когда наступаютъ морозы, разбивается на меньнія стан и держится по незамерзающимъ водамъ. Въ это время лутковъ можно встрътить какъ на соляныхъ озерахъ, такъ н на моръ, по они все-таки мен'те дюбять море, нежели мпогія утки и другія крохали.

94. Крохаль длинноносый.

Mergus serrator, L.

Табл. 99.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 601.

Болѣе распростр. названія: морской крохаль, средній крохаль.

Мъстныя названія: большая острота (на Днъпръ).

Польск. — szlachar. — Эст. — muru-kosklas. — Лат. — melgahle, gaura. — Фин. — koskelo, pikku koskelo, pilni koskelo, tukka koskelo, karikoskelo, maa-koskelo. — Лапл. — шопри. кялзе. вуотка, юалзё. вуофта гоальзё, вуокта коальеи.

Длинионосый крохаль—кругополярная птица, поднимающаяся къ съверу до 67°-70° с. ш. и спускающаяся на гитадовьт къ югу приблизительно до 500. Въ нашей странѣ онъ обыкновененъ въ качествѣ гивздящейся птицы во всей Лапландін и Финляндін, по большимъ п малымъ озерамъ Двинской области, по берегамъ и островамъ Бѣлаго моря, найденъ на Новой Земль, Вайгачь, по озерамъ нижне-печорскихъ тундръ, въ Пермской и Уфимской губ. Въ области средняго Поволжья длинноносый крохаль также гизадится, но въ Московской и Тульской губ. бываетъ только на пролетъ. Въ области верхняго теченія Волги эта птица, несомнівню, гнівздится, на Эстляндском побережь в прилегающих в островах даже обыкновенна, но по Финскому побережью бываетъ только на пролетъ, хотя въ это время обыкновененъ. О Польшъ Тачановскій говоритъ, что длинноносый крохаль бываетъ здѣсь не только осенью и весною, но и зимою, хотя встръчается въ меньшемъ числъ, нежели слъдующій видъ. Весною встрѣчается очень поздно, до мая, когда другихъ крохалей здѣсь уже не бываетъ.

Такимъ образомъ, южная граница области гиѣздовья длинноносаго крохаля въ Европ. Россіи не можетъ быть опредѣлена пока даже приблизительно, и я съ своей стороны не нахожу невозможнымъ, что эта птица гиѣздится, наприм., на уединенныхъ озерахъ Рязанской и Московской губ. Что касается губ. Оренбургской, Астраханской, области Дона и Дивпра, то здвсь крохаль бываеть только на пролетв, но на Каспійскомъ и Черномъ морт, въ губ. Астраханской, Херсонской и на Кавказѣ—зимуетъ. Относительно Кавказа Радде говоритъ, что длинноносый крохаль даже гивздится здъсь на высотѣ 3—4.000 по горнымъ ручьямъ и на Гокчайскомъ оз., но, къ сожалънію, не сообщаетъ никакихъ наблюденій надъ образомъ жизни птицы въ этой области.

95. Крохаль большой. Mergus merganser, L.

Табл. 100.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 604.

Болѣе распростр. названія: крохаль, большой крохаль.

Мъстныя названія: коркуль, большия детроти (на Дивпрв).

Польск.—nuroyes.—Эст.—ea kosklas.—Фин.—iso koskelo, uukoskelo, ehmaköskelo.—Ланл.—шопри, 19сси-10илзё, кусса-коалзи.

Тат.—баликчи, сусъ-лисъ.—Башк.—ко́ше.—Вот.—бизакъ.—Зыр.—мочра.—Вог.—иялтопъ.—Ост. на Оби-коссъ куссъ, на Кети—зай, на Енис. гоолъ.—Тунг.—очинъ, очинлъ.—Бурят.—алакчинъ.—Самоъд.—пьебу.

Географическое распространеніе большого крохаля даже въ подробностяхъ въ значительной мъръ сходно съ географическимъ распространеніемъ длинноносаго, но большой крохаль гитадится также въ горахъ Туркестана и въ Гималаъ, на высотъ 10.000′ н. у. м.

Въ Европ. Россіи большой крохаль болъе или менъе обыкновененъ въ Лапландін и Финляндін, гораздо ръже длинноносаго въ Двинской области, обыкновененъ въ Пермской и Уфимской губ. и гивздится въ съверной части Оренбургской, не спускаясь къ югу далъе средняго теченія р. Урала. Въ области средняго Поволжья это—ги вздящаяся птица, но въ Московской, Тульской и прилежащихъ губ. пока наблюдался только на пролеть. Нътъ никакого сомнънія, что большой крохаль гитвідится въ лівсной области верхняго теченія Волги, хотя свъдънія объ этомъ краф весьма отрывочны. Въ Прибалтійскомъ краф описываемый видъ въ качествф гнфздящейся птицы распространенъ очень широко. Что касается Польши, то большой крохаль обыкновененъ здѣсь на пролетѣ и зимою. Прежде гнѣздился, наприм., въ Сувалкской губ., чего теперь не наблюдается. По Дивпру и его притокамъ большой крохаль бываетъ на пролетъ и зимою изръдка по среднему теченію и опредѣленно, но въ небольшомъ количествѣ, въ днъпровской плавнъ, на пролетъ же и зимою во всей черноземной области съ Крымомъ и кавказскимъ прибрежьемъ. На пролетъ же

наблюдается въ области Дона, гдф случайно встрфчается и зимою. Пролетная и зимующая птица Астраханской губ. и береговой полосы Каспійскаго моря. Внутри Закавказья изрѣдка бываетъ зимою, но ги вздящимся на Кавказ в пока не найденъ, что весьма странно. Крохали начинаютъ возвращаться на свою родину очень рано. Въ Харьковской губ. пролетъ этихъ птицъ наблюдается въ первой трети марта. Въ средней Россіи онъ появляются, какъ только начнетъ подниматься вода въ рѣкахъ и на льду образуются большія трещины, что рѣдко бываетъ позже конца марта. Съ прилета часто попадаются на глаза, т. к. постоянно перелетаютъ съ одной полыны на другую, плаваютъ на открытыхъ мъстахъ и присаживаются отдыхать на ледъ; когда тронется ледъ на рѣкахъ, крохали часто плаваютъ между льдинъ или же садятся на льдины и плывутъ съ ними. Въ половинѣ или двадцатыхъ числахъ апрѣля въ южной полосѣ гнѣздовой области крохалей пролетъ оканчивается, и крохали перестаютъ часто попадаться на глаза, т. к. пролетные къ этому времени пролетъли далъе, а мъстовые заняли мѣста своего гнѣздовья. Въ сентябрѣ крохали начинаютъ мало-по-малу оставлять мъста своего гнъздовья, выводками спускаясь по рѣкамъ, при чемъ въ путь пускаются даже еще пуховые птенцы. Пролетъ тянется постепенно и очень медленно, т. к. крохали не боятся холода. Въ южной Россіи, именно въ губ. Харьковской, одиночные крохали изръдка начинаютъ встръчаться съ конца второй трети сентября, чаще съ начала октября, въ наибольшемъ количествъ-въ серединѣ этого мѣсяца, но все молодые; старые прилетаютъ въ концѣ октября. Остаются здъсь до конца ноября и вообще до замерзанія волъ.

96. Савка.

Erismatura leucocephala, Scop.

Табл. 101.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 610. Болѣе распростр. названіе: савка.

Мѣстныя названія: савка синеносая (въ Спбирп); отлоголовая утка (на Сарпѣ).

Савка широко распространена въ юго-западной Сибири, Туркестанъ и Закаспійскомъ краж, но въ Европ. Россіи распространеніе ея весьма ограничено. На восточномъ склонъ Урада она поднимается къ съверу, быть можетъ, до 56° с. ш., такъ какъ Л. П. Сабанъевъ отмѣчаетъ ее гнъздящеюся на степныхъ озерахъ Пермской губ.; но въ Оренбургскомъ краф савка доходить приблизительно лишь до 51% с. ш., а по Волгъ только до 50° (до Камышина). Къ югу отъ этой границы савка м'ястами водится въ довольно большомъ количествъ, какъ, напр., по озерамъ Киргизскихъ степей и на нѣкоторыхъ южныхъ сарпинскихъ озерахъ; къ съверу же залетаетъ только случайно. Н. А. Съверцовъ упоминаетъ объ одной парочкъ, пойманной въ апрълъ 1845 г. въ Воронежской губ. Кромф того, савка встрфчается на сфверномъ побережь Чернаго моря, но здъсь ръдка и въ Крыму бываетъ только на пролетъ. Въ небольшомъ количествъ описываемая птица встр'вчается по соленымъ озерамъ степей съвернаго Кавказа, но въ Закавказъ бываетъ только зимою и почти исключительно въ береговой зонѣ Каспія.

Весною савка появляется на сѣверномъ побережьѣ Чернаго и Каспійскаго моря уже въ мартѣ, но въ Киргизскія степи прилетаетъ только въ апрѣлѣ, а запоздавшія даже въ началѣ мая.

97. Гага.

Somateria mollissima, L.

Табл. 102.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 614. **Болъе распростр. названіе:** гага.

Мѣстныя названія: самецъ у поморовъ называется *швкунъ*, *гаскунъ*, самка—*гавка*, *гахка*. Въ Сибири—*нормо́та*.

Польск. — miękkopiór. — Эст. ahkas. — Фин. — haahka, hahka, auhti. — Лапл. — навда, науда, ликка.

Обыкновенная гага можетъ считаться атлантическимъ видомъ.

У насъ она гитадится по Карскому побережью, на Новой Земль, на иткоторыхъ островахъ Бълаго моря и по всему побережью Кольскаго полуо—ва. Кромт того, гага нертъдка лътомъ по ботническому и финскому побережью Финляндіи, хотя не встртчается ни въ глубинть Финскаго залива, ни въ С.-Петербургской губ. Въ Прибалтійскомъ крат гага бываетъ преимущественно съ начала до середины мая, но въ небольшомъ количествт даже гитадится здъсь, наприм., на о. Рогэ. Въ видъ исключенія залетаетъ въ Польшу.

Что касается образа жизни гаги, то я приведу съ небольшими дополненіями сдъланный мною раитье біологическій очеркъ этой птицы.

Гага съ полнымъ правомъ можетъ быть названа морской птицей, т. к. никогда не покидаетъ моря и даже на пролетъ слъдуетъ береговой линіей, съ величайшей неохотой перелетая даже черезъ узкія нолосы суши. Своимъ богатымъ опереніемъ она превосходно защищена отъ холода и потому, при замерзаніи моря, улетаетъ не дальше того, сколько нужно, чтобы найти открытую воду, откуда возвращается на свое постоянное мъсто жительства при нервой возможности.

Такимъ образомъ, строго говоря, гага должна назваться осъдлой итицей, потому что круглый годъ можетъ быть найдена на меньшемъ или большемъ разстоянии отъ тъхъ острововъ, гдъ гиъздится, и только очень небольшое число гагъ предпринимаютъ болъе далекія странствованія. Гага выбираетъ для гиъздовья предпочтительно плоскіе острова

и какъ л'ятомъ, такъ и зимою, особенно же зимою, держится стайками; во время смѣны маховыхъ и рузевыхъ гага уходитъ какъ можно дальше въ открытое море, чувствуя себя здъсь въ полной безопасности. Подобно своимъ собратьямъ, гага илохо ходитъ, но отлично илаваетъ, пыряетъ и летаетъ. Ея кормъ составляютъ мелкія ракушки, рачки и другія безпозвоночныя моря. По своему образу жизни, это дневная птица, которая отправляется на добывание корма при первомъ проблескъ зари и только на ночь возвращается къ землъ. Какъ самцы, такъ и самки зимою и самцы лътомъ очень осторожны, но самки, спдящія на яїщахъ, считаютъ себя, и притомъ совершенно справедливо, хорошо защищенными уже самой своей окраской, почти неотличимой отъ цвъта водорослей, и обыкновенио или вылетаютъ почти что изъподъ погъ, или даже позволяють взять себя руками, до того кръпко сидятъ. За исключениемъ гребенушки, обыкновенная гага неохотно соединяется съ другими итицами. Во время отлива гаги любятъ собираться на обнажившихся мфстахъ, гдф въ изобиліи находятъ свой кормъ. Такъ, по словамъ А. М. Никольскаго, гаги во множествъ встръчаются у Трехъ-Острововъ, гдф высота прилива достигаетъ до огромныхъ размъровъ (трехъ саженъ), и гдъ во время отлива обнажаются цълые острова и большія косы, въ изобиліи доставляющія гагамъ ихъ любимую пищу — мелкихъ ракушекъ. Изръдка по наблюденіямъ того же зоолога, гаги фдятъ и водоросли. Будучи легко замътны на морф при тихой погодѣ, гаги совершенно исчезаютъ изъ глазъ при волнении. Крикъ этой птицы—громкое и грубое кр, кр, кр; но въ брачный неріодъ ухаживающій за самкой гавкунъ, то опуская, то поднимая голову, издаетъ громкое, но протяжное а-у.

Въ мартъ мъсяцъ, слъдовательно за два мъсяца до начала гнъздованья, гаги разбиваются на пары. Мъстомъ для гибзда охотиве всего выбирается плоскій островокъ, но иногда гаги занимаютъ скалистый островъ и гитадятся на высотт 200 футовъ надъ моремъ. На низкомъ, плоскомъ островъ гнъзда устраиваются на землъ между кустиками, которые плохо защищають птицу даже отъ нападенія поморника, истребляющаго въ большомъ количествъ гагачы яйца. Гифзда устранваются изъ сухой травы, мха, водорослей и т. п., когда же кладка оканчивается, самка выстилаетъ гитадо пухомъ; въ иткоторыхъ случаяхъ гитадо представляетъ просто небольшое углубление въ землъ, слабо устланное травой и пухомъ. По наблюденіямъ В. А. Хлѣбникова гага, если пухъ вынутъ у нея изъ гитвада, замъняетъ его растительнымъ матеріаломъ. Тамъ, гдъ гагъ не особенно много, онъ устраиваютъ свои гитада на довольно большомъ разстоянии другъ отъ друга; тамъ же, гдѣ ихъ много, гнѣзда ихъ бываютъ расположены совствить другъ возлть друга; иногда бываетъ даже, что двть самки несутся въ одно гитало и дружески высиживаютъ рядомъ на одномъ лоточкъ. На Новой Землъ ухаживанье самцовъ продолжается до конца мая, слъдовательно, япца кладутъ не ранъе начала юня. На Кольскомъ полуостровъ яйца кладутся гагами тоже въ юнъ; въ Балтійскомъ

морф почти полную кладку паходять уже въ маф. Полная кладка содержить отъ 5 до 8 янцъ, но чаще, кажется, кладка ограничивается шестью. Цвътъ ихъ варыруетъ отъ ибжно-сфро-палеваго до сфроватозеленаго, длина отъ 3,3 до 2,8 д.; поперечникъ отъ 2,05 до 1,9 д. Пухъ, на которомъ лежатъ яйца, измъняется отъ съровато-бураго до буровато-съраго, съ болъе блъдной серединой. Самка съ большимъ усердіємъ высиживаеть около м'єсяца, самецъ же держится въ это время обыкновенно на иткоторомъ разстоянии отъ гитада, присоединившись къ своимъ товарищамъ, которые держатся небольшими стайками. Когда же самка сходить съ гивада, чтобы повсть, самець присоединяется къ ней, но отнюдь не раздъляеть съ нею трудовъ по высиживанию. Чъмъ ближе время вывода птенцовъ, тъмъ меньше привязанности обнаруживаетъ самецъ къ самкѣ и, наконецъ, когда итенцы выклюнулись, гавкуны отправляются въ открытое морф, гдф и смфняютъ свое мелкое перо, надъвая временно, пока перелиняютъ маховыя и рулевыя, болъе скромную, но менѣе замѣтную одежду самки.

Въ началъ августа у береговъ Кольскаго полуо-ва добываются птенцы не болъе чирка. Мать сводить птенцовъ къ водъ при первой же возможности по ихъ выклюнутіи. Существуетъ предположеніе, что изъ гитадъ, расположенныхъ высоко надъ моремъ, гавки переносятъ дътей на воду въ клювъ, но это не подтверждено достовърными наблюдателями. Мать очень заботится о дітяхъ и береть ихъ къ себі на спину, когда онт устанутъ. Если мать погибаетъ, выводокъ присоединяется къ другой маткъ. Иногда же до шести семей дружески соединяются въ общую стайку, гдф нфсколько десятковъ итенцовъ охраняются своими матками. Самые опасные враги гагъ-номорники. что же касается человъка, для котораго гагачій пухъ служитъ важнымъ предметомъ промысла, то онъ скорфе является покровителемъ этихъ птицъ, т. к. при разумпомъ пользованіи пухомъ и яйцами, заставляетъ гагъ линь нестись вторично и выводить детей поздиве. Можно смѣло утверждать, что нигдъ гаги не гнѣздятся такими большими колоніями, какъ тамъ, гдв человъкъ разумно промышляетъ ими, что, впрочемъ, къ сожалвнию не приложимо къ нашей странв.

Когда птенцы подрастуть, а старики, какъ самки, такъ и самцы, кончатъ осеннюю линьку, гаги соединяются въ стада, которыя и держатся всю зиму; впрочемъ, отдъльныя пары можно видъть и въ это время.

У насъ гагачій пухъ добывають на Мурманв, на побережьи и островахъ Бълаго моря, на Колгуевъ и на Новой Земль. Вездъ промыселъ этотъ находится въ значительномъ упадкъ, и вездъ промышленники объясняютъ уменьненіе гагъ хищинчествомъ порвежцевъ, будто бы хозяйничающихъ даже на Новой Земль. Весьма возможно, что если норвежцы случайно посътятъ гагачью колонію на русской территоріи, они не пощадятъ ее, но прежде всего хищинчаютъ наши же собственные промышленники, которымъ птичій промыселъ норвежцевъ надо взять за образецъ. Норвежецъ отлично знаетъ гагъ того участка берега или той итичьей горы, которая находится въ его

владінін, и относится къ нимъ, какъ къ своимъ домашнимъ итицамъ. Онъ возьметъ у нихъ и яйца, но только первой кладки, что лишь заставитъ гагу нестить вторично; возьметь и пухъ, послъ чего самка надергаетъ новаго изъ хлупи самца, а затъмъ не только оставитъ птицу въ поков, но будеть охранять ее отъ прочихъ враговъ. При нъкоторыхъ условіяхъ, когда можно опасаться, что самка не замънштъ взятаго пуха новымъ, а тѣмъ болъе растительными веществами, порвеженъ выберетъ пухъ лишь послъ того какъ итенцы вывелись и онъ самъ же снесъ ихъ въ корзинъ на море, чтобы слабые птенчики при этомъ первомъ путенестви не разбились и не попали въ когти къ кречету. Нашъ промышленникъ ничъмъ подобнымъ себя не утруждаетъ: онъ собпраетъ вст яйца, безъ различія, не заботясь о томъ, насколько они насижены, и захватываетъ пухъ. Часто, потерявъ очень сильно насиженныя яйца и пухъ, гага не несетея вторично; если же и устроитъ гизадо, то пухъ замжияется просто растительнымъ матеріаломъ. Но промышленникъ на этотъ разъ довольствуется яйцами второй кладки, не заботять о томъ, что самъ же у себя отнимаетъ добычу будущаго года, а потомъ жалуется на хищниковъ норвежцевъ.

Обыкновенно 12 гитздъ даютъ около 1 ф. неочищеннаго гагачьяго пуха, который въ очищенномъ видѣ стоитъ отъ 12 до 22 руб. за фунтъ. Сколько его добывается ежегодно въ настоящее время и сколько продается, мы совершенно не можемъ судить за недостаткомъ относящихся сюда данныхъ. Но сто лѣтъ тому назадъ ежегодно вывозилось за границу гагачьяго пуха болѣе чѣмъ на 600,000 руб. По представленію г. архангельскаго губернатора теперь сборъ янцъ и разореніе гитздъ гаги по берегамъ Бѣлаго моря запрещены, но дѣло въ томъ, чтобы запрещеніе это не осталось на бумагѣ.

98. Гага гребенушка. Somateria spectabilis, L.

Табл, 103.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 619. **Болъе распростр. названія:** гага гребенушка.

Мѣстныя названія: гребенушка, нормота (въ Спбпри).

Финск. — pulska haahka. — Лапл. — бурег-ньюнгавда, сультг-ньюнгавда. — Самоѣд. — вора́кг, вара́кг.

Гага гребенушка гитадится у насъ на Новой Землѣ, Вайгачѣ, Колгуевѣ и на Канинскомъ полуо—вѣ, откуда зимою залетаетъ на восточный и сѣверный берегъ Кольскаго полуо—ва; изрѣдка бываетъ на абосскомъ побережьѣ и болѣе правильно на пролетѣ посѣщаетъ Аландскіе о-ва и июландское побережье. Отдѣльные экземпляры были находимы въ разныхъ частяхъ страны. Такъ, старый самецъ былъ добытъ въ Прибалтійскомъ краѣ; одинъ экземпляръ добытъ въ концѣ сентября 1848 г. въ Воронежской г.; и почти навѣрное можно утверждать, что въ 1851 г. именно эта гага была убита полковникомъ П.Б. Хорошхинымъ въ Уральской области, повыше крѣпости Кулагиной.

99. Гага сибирская. Somateria stelleri, Pall.

Табл. 104.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. 1, стр. 621. **Болъе распростр. названіе:** сибирская гага.

Мѣстныя названія: лапл. савье-гавда.

Едва ли можно сомнъваться, что сибирская гага не только зимуетъ на Кольскомъ побережьѣ, но и гнѣздится здѣсь. Собственно въ Русской Лапландін Миддендорфъ и Богдановъ наблюдали эту утку около острова Сосновца, и оба склоняются въ пользу того, что она гифздится въ указанной мфстности. По Зандебергу она гифздится на западъ отъ Рыбачьяго полуо – ва, а Нордви получилъ яйца съ Айновскихъ о – въ и изъ Печенги. Грапе наблюдалъ ее внутри страны, въ Энонтекисъ. Кромѣ того, всѣ наблюдатели единогласно утверждаютъ, что эта гага прилетаетъ въ концѣ августа и въ началѣ сентября къ Варангеръфіорду, гд в и остается всю зиму. Что касается других в частей страны, то изрѣдка зимою сибирская гага бываетъ на Аландскихъ о-вахъ и нюландскомъ побережьт и залетаетъ отъ времени до времени въ окрестности С.-Петербурга. Въ показаніи Л. П. Сабанъева, будто этотъ видъ встръчается изръдка весною на Каслинскихъ озерахъ, нътъ ничего невозможнаго, только не слъдуетъ забывать, что это показаніе совершенно голословно. Для Новой Земли эта птица не упоминается.

100. Синьга. Fuligula nigra, Briss.

Табл. 105.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 625.

Болѣе распростр. названія: синьга, малый турпанъ.

Мѣстныя названія: синыа (на Обн); морская чернень (въ Сибири); чернуха (у поморовъ); малый туртанъ, чернушка (Пермек.); чернавка (оз. Лиманъ, Зм. у.).

Польск.— kaszka czarna. — Эст. — mere tedder. — Фин. — merilintu, meriläinen, mustalintu. — Лапп. — пьюоркуа.

V насъ синьга широко распространена въ с ${\rm thepo-sana}$ дной части страны. Здъсь она гиъздится во всей Лапландіи, кромъ морского берега, и въ Финляндіи къ югу до 61° 40′, но какъ въ области Варангеръ-фіорда, такъ въ юго-западной и южной Финляндіи бываетъ только на пролетъ. Далъе на востокъ синьга въроятно гиъздится на Ладожскомъ и Онежскомъ озерахъ и въ небольшомъ числѣ подъ Архангельскомъ, гдъ обыкновенна на пролетъ къ Қанинской тундръ, въ южную часть Новой Земли и на Вайгачъ. Затъмъ гитадится въ тундрахъ по нижней Печоръ, но какъ далеко идетъ здъсь къ югу, мы не знаемъ. Во всякомъ случать въ Пермской губ. лътомъ бываютъ только самцы этого вида, но въ западной Спбири синьга м. б. гифздится даже въ окрестностяхъ Тюмени подъ $57^{1/20}$ с. ш., и прослъжена Уральской экспедиціей отъ Сосьвы до 68° с. н. На пролеть синьга наблюдается на побережьть Балтійскаго моря, по Камть и Волгъ, и въ области ръки Урала. Въ небольшомъ числъ встръчается во время пролета въ центральной Россіи, но не каждый годъ, и вообще можетъ считаться здъсь скоръе залетно-продетною птицей. Очень ръдко залетаетъ въ Польшу. Зимуетъ на Каспійскомъ и, въроятно, въ очень пебольшомъ числъ на Черномъ моръ.

101. Турпанъ. Fuliqula fusca, L.

Табл. 106.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. 1, стр. 628. Болъе распростр. названіе: турпанъ.

Мѣстныя названія: евирокъ, шюльпанъ (Петербург.); морская шешера (у поморовъ); турпинъ, чернунка, чернула (Пермек.); черный турпинъ, неводчикъ (въ Спбпрп); головия, чернавка (въ Харьков. губ.).

Польск.—uhla.—Эст.—werdi, waisi, waires.—Фин.—kolso, kórri, vartti, valkeasiipi, meriteeri, merikoppelo, kulmunen, pilkkasiipi.—Лоп.—кдальмись.—

Лапл. - скоарра, скооро, скяра.

Башк. — ырокъ. — Тунг. – попокели. — Эст. — тулбукъ.

Распространеніе турпана въ нашей странт гораздо шпре, нежели распространеніе синьги. Онъ гнъздится во всей Лапландіи, даже по глубоко вдающимся заливамъ, и избъгаетъ лишь собственно морского берега; распространенъ во всей Финляндіи, гд в м'ястами очень обыкновененъ, на Ладожскомъ и Онежскомъ оз. и въ небольшомъ числъ подъ Архангельскомъ. Въ Петербургской губ. въ области Финскаго залива турпанъ, повидимому, не ги вздится, но лътомъ встръчался въ Новгородской губ. и довольно обыкновененъ на съверномъ и западномъ побережь В Эстляндін. По свид'ьтельству Тизенгаузена, турпанъ гн'ьздился прежде въ Пинскихъ болотахъ, но мы не знаемъ, гитвадится ди онъ здѣсь теперь, хотя за послѣднее говоритъ то обстоятельство, что въ Польшъ турпанъ бываетъ не только на пролетъ и зимою, но даже залетаетъ туда лътомъ. Мы ничего не знаемъ о распространении турпана въ Вологодской губ., но онъ найденъ на Вайгачѣ и на Новой Землъ, гнъздится въ нижне-печорскихъ тундрахъ и очень далеко распространенъ къ югу въ Зауральскомъ краф. Относительно Пермской губ. Л. П. Сабанъевъ говоритъ, что въ Богословской и Павдинской дачахъ турпанъ довольно многочисленъ на всъхъ озерахъ, особенно на Княспинскомъ. Далъе къ югу, начиная съ 560, турпаны водятся въ огромномъ количествъ, хотя далеко не повсемъстно; повидимому, они избирають своимь главнымь мѣстопребываніемь наиболѣе рыбныя озера и притомъ степныя; на уральскихъ озерахъ они сравнительно ръдки и почти не гиъздятся, но въ степной полосъ идуть далеко къ югу и еще очень многочисленны на озерахъ Челябинскаго и Тропцкаго уу. (54° с. ш.). Въроятно отдъльныя пары турпановъ гнъздятся по всей Камъ, по крайней мъръ одна была найдена въ Чистопольскомъ у. Въ высшей степени замъчательно гизздование турпана на оз. Гокчъ въ Закавказъъ, откуда въ музеъ Московскаго университета имъется не совсъмъ взрослый экземпляръ, добытый въ йонъ 1885 г. На пролеть турпанъ болье или менье обыкновененъ по Камь, Волгь и Уралу; въ небольшомъ числъ пролетаетъ Окой, Диъпромъ и Дономъ, и при этомъ отдъльныя особи, конечно, встръчаются и въ сторонъ отъ главныхъ пролетныхъ путей. Отдъльныя особи, преимущественно старые самцы, встръчаются зимой не только въ Польшъ, но и въ южной Россіи, наприм., въ Харьковской губ. Въ небольшомъ чисть турпанъ зимуетъ на Черномъ моръ и на оз. Гокча; главныя же мъста зимовокъ турпана лежатъ на Касийскомъ моръ и въ Туркестанъ.

Турпанъ прилетаетъ на свою родину очень поздно. Только въ первой половинъ мая онъ пролетаетъ у береговъ Прибалтійскихъ губерній; въ маѣ же наблюдается на пролетѣ подъ Петербургомъ и въ разные годы въ разныя числа мая появляется въ Лапландіи. Относительно восточной Россіи свѣдѣнія разнорѣчивы. Такъ, г. Зарудный говоритъ, что подъ Оренбургомъ онъ наблюдалъ турпановъ въ началѣ мая, но Сабанѣевъ и Зибомъ говорятъ, что турпаны прилетаютъ и гнѣздятся очень поздно, и потому можно думать, что Зарудный наблюдалъ или начало пролета, или случайно болѣе ранній пролетъ. Осенью турпанъ покидаетъ Лапландію въ половинѣ октября; въ октябрѣ же наблюдается пролетъ турпановъ подъ Петербургомъ. Но изъ сѣверо-восточной Россіи турпаны отлетаютъ раньше, судя по тому, что подъ Оренбургомъ появляются уже въ концѣ сентября. Впрочемъ, они не спѣшатъ на осеннемъ пролетѣ и даже на Камѣ ихъ можно видѣть до середины ноября.

102. Морянка. Fuliqula glacialis, L.

Табл. 107.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 633.

Болъе распростр. названія: морянка, аллейка.

Мѣстныя названія: морянка, (Петерб. по Палласу), саукъ (тамъ же); аллейка (у поморовъ); кавыка, лунскъ (Екатеринб.); савка (Павд.); лайка (Астрахан.).

Пол. — lodówka. — Лат. — капра, kilde. — Эст. — auli. — Фин. — alli— Лапл. — ханга.

Якут. — бильший. — Ост. — аулилов. — Самовд. — ашу.

Распространеніе у насъ морянки гораздо обширифе, нежели можно было бы думать. Это обыкновенная птица Лапландіц къ югу до 67° с. ш., гдф морянка гифэдится на альпійскихъ озерахъ въ области ивняковъ и мелкорослой березы, поднимаясь почти до самой границы въчныхъ снъговъ, и весьма ръдка на озерахъ, расположенныхъ въ низменныхъ мѣстахъ страны и то только въ ея самыхъ сѣверныхъ частяхъ, наприм., въ Энарской Лапландіп. Далъе на востокъ морянка гнѣздится въ сѣверной части Онежскаго озера, во всѣхъ тундрахъ съверной Россіи, начиная отъ Бълаго моря, и на Новой Землъ. Въ небольшомъ числѣ эта утка гнѣздится въ Пермскомъ Уралѣ, на озерахъ восточнаго склона, но не на степныхъ, хотя здѣсь многочисленна на пролетъ. Лътомъ отдъльныя особи морянки, повидимому исключительно линяющие самцы, встръчаются въ Оренбургскомъ крат, но не ги вздятся. Кром в того, морянка спорадически ги вздится въ Эстляндін, но въ небольшомъ числъ. Показаніе Л. П. Сабанъева, будто морянка гитьздится въ Даниловскомъ у., Ярославской губ., по каменистымъ и высокимъ берегамъ рѣчекъ (!), какъ основанное на свидътельствъ неспеціалистовъ, едва ли заслуживаетъ особеннаго вниманія. На пролеть морянка весьма обыкновенна на Балтійскомъ морѣ съ его заливами и во всей Финляндіи. Въ небольшомъ числѣ пролетаетъ по рѣчнымъ системамъ внутри страны и несомнѣнно бываеть на Черномъ морт, хотя часть этихъ птицъ остается зимовать въ Привислянскомъ крать и юго-западной Россіи. Болте обиленъ пролетъ но Камть, Волгь и черезъ Киргизскія степи; прилеттьть въ Киргизскія степи, морянки остаются здъсь до замерзанія водъ. Въ небольномъ числів эти птицы зимуютъ въ устьяхъ Волги, по тты мъстамъ, гдъ образуются польный и трепцины во льду, остальныя же отправляются на Каспійское море и въ суровыя зимы долетаютъ до его югозападной части.

Во второй половин в апръля несмътныя стада моряновъ приближаются къ берегамъ Прибалтійскаго края и зд'ясь днемъ держатся въ открытомъ морф, а на ночь перебпраются въ мелководныя бухты на кормежку. Пролетъ длится около м'всяца, и въ это время, повидимому, морянки начинаютъ разбиваться на нары. Въ Дапландію морянки прилетають въ разныя числа мая и въроятно только въ концъ этого жьсяца прилетаетъ эта утка въ нечорскія тундры. Откуда онъ прилетаютъ въ последнюю область-решить трудно, но 16-го мая 1900 г. я видълъ ивсколько штукъ этихъ птицъ съ нарохода въ морф противъ Георгіевскаго монастыря и не считаю невозможнымъ, что именно эти позднія особи прилетають въ ма'є и къ Бълому морю, и на Печору. Тѣ морянки, которыя зимовали въ южной Россіи, пускаются въ путь уже въ концъ марта и пролетаютъ въ средней полосъ въ половинъ апръля, въроятно присоединяясь на Бъломъ моръ къ пролетнымъ черезъ Финляндію, тѣ же, которыя летятъ съ Каспійскаго моря, по всей въроятности, отчасти гивадятся въ Пермскомъ Уралъ, отчасти въ западной Сибири.

103. Каменушка. Fuligula histrionica, L.

Табл. 108.

Мензбиръ, Птицы Россіп, т. І, стр. 638. Болѣе распростр. названіе: каменушка.

Мѣстныя названія: каменушка, каменная утка (въ Снбири). Камчад.—никынгь, никынгакъ.

Эта чрезвычайно красивая и въ то же время пестрая утка, за что западно-европейскіе зоологи зовуть ее арлекиномъ, наблюдалась у насъ лѣтомъ только на Бѣломъ морѣ, гдѣ быть можетъ гнѣздится. Въ качествѣ залетной птицы изъ восточной Сибири бываетъ въ Прі-уральскомъ краѣ. Прилагаемый рисунокъ поможетъ тѣмъ изъ охотниковъ, которымъ посчастливится добыть каменушку, опредѣлить ее и пополнить наши свѣдѣнія о появленіи у насъ этой птицы.

104. Гоголь. Fuligula clangula, L.

Табл. 109.

Мензбиръ, Птицы Россін, т. І, стр. 641. Болъе распростр. названіе: гоголь.

Мѣстныя названія: 1010ль, 1010лекъ (Петербург.); звонокъ (у помор.); кря-кушки (Малорос.); пестрый нырокъ (Чистопол.).

Польск. — kaszka głosna. — Фин. — selkätelkkä, sotka, tilkka. — Лапл. —

tschoadki, tschoadge, tschoadgi, tjarke.

Зырян.—еульчеръ.—Вогул.—еалъ, сай, сой.—Ост.—лобтай. у Сургута торомъ-санкени.—Тунг.—пурибку.—Ламут.—кончала.

Распространеніе у насъ гоголя очень широко. Такъ какъ эта птица гифздится предпочтительно въ дуплахъ, ее поэтому нельзя ожидать встрѣтить гнѣздящейся въ безлѣсной тундрѣ и въ безлѣсныхъ степяхъ, но въ степной полост по теченію ръкъ и по озерамъ, обрамленнымъ большими деревьями, гоголь идетъ очень далеко къ югу. Это—самая обыкновенная утка лѣсной части Кольскаго полуострова, гдъ встръчается даже и за предълами лъсной области; гнъздится во всей Финляндін, въ Петербургской, Новгородской и Тверской губ. и, въроятно, гнъздится въ Прибалтійскомъ краж. Какъ далеко къ югу гнъздится гоголь въ лъсной области по верховьямъ Днъпра, неизвъстно, но лично я не сомнъваюсь, что онъ спускается до Полъсья. Равнымъ образомъ едва ли можно сомнъваться, что гоголь гитездится въ ограниченномъ числъ и въ лъсистыхъ участкахъ центральной Россін. Но въ большомъ числѣ онъ распространенъ только къ сѣверу отъ Волги, отъ Олонецкой губ. до Бѣлаго моря, печорскихъ тундръ и границъ Тобольской губ. Въ области Уральскаго хребта гоголь гитадится къ югу до нижняго теченія Плека и случайно даже по съвернымъ окраинамъ Киргизскихъ степей; по Волгъ гоголь спускается до Астрахани. По всей средней и южной Россіи гоголь обыкновененъ на пролеть, и, кромъ того, отдъльныя особи, парочки или небольшія стайки держатся всю зиму на незамерзающихъ водахъ восточной, юговосточной, южной и западной Россіи. На съверномъ побережьт какъ Чернаго, такъ и Каспійскаго моря гоголь держится до декабря, въ декабрф же отлетаетъ еще южифе, избфгая, какъ кажется, преимущественно сифжныхъ бурь. При этомъ слфдуетъ замфтить, что первыми удетаютъ самки и молодыя птицы, а потомъ уже и самцы.

105. Гоголь исландскій. Fuliqula islandica, Gm.

Табл. 110.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 645.

Исландскій гоголь, несомивнно, бываеть въ области Варангеръфіорда. Кромф того, я склопенъ отнести къ этому виду экземпляръ, добытый г. Зворыкинымъ 3/хі 1895 г. въ Вышневолоцкомъ у. Тверской губ., хотя это—молодая птица и при сходствф обоихъ видовъ въ молодомъ опереніи ошибка при опредфленіи вполнф возможна. Прилагаемый рисунокъ дастъ возможность безъ труда опредфлить самца исландскаго гоголя, рфзко отличающагося развитіемъ бфлаго цвфта передъ глазами, и мы обращаемъ особенное впиманіе на этихъ птицъ тфхъ охотниковъ, которые охотятся около Ботническаго и Финскаго заливовъ.

106. Нырокъ бѣлоглазый. Fuligula nyroca, Güld.

Табл. 111.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 646.

Болѣе распростр. названія: біьлоглазый нырокъ, біьлоглазка.

Мѣстныя названія: *иериушка, бълоглазка* (Астраханск.); *иернушка* (на Диѣстрѣ); *иерникъ* (на Диѣпрѣ); *краеный нырокъ* (Оренбург.); *иернышъ* (Воронеж.); *иирокъ, пога́ика* (Малоросс.); *нырокъ, опа́рки* (южн. Росс.). Польск.—podgorzałka.

Распространеніе бълоглазаго нырка очень обширно. Въ западной Россіи онъ распространенъ къ сѣверу до прибалтійскихъ губерній, гдф, впрочемъ, уже не гифздится, хотя въ Польшф очень обыкновененъ. Въ центральной Россіи еще бываетъ въ Московской губ., но только въ качествъ залетной птицы, а далъе на востокъ гнъздится въ Казанской губ. и встрѣчается въ южной части Пермской, гдѣ, однако, гитадится лишь въ видт исключенія. Къ югу отъ этихъ мъстъ бълоглазый нырокъ встръчается во всей Россіи, равно какъ и на Кавказф п въ Закавказъф, и во многихъ частяхъ страны остается даже на зиму, какъ, наприм., въ Польшѣ, въ южной Россіи, въ Крыму и Закавказьф. Бфлоглазый нырокъ прилетаетъ въ южную Россію (тф особи, которыя улетали на зиму въ сѣверную Африку) въ половинъ марта, и въ концф этого мфенца или въ началф апрфля появляется уже подълипротою Кіева. Осенній пролеть въ южной Россіи наблюдается въ половинт октября, большинство отлетаетъ отсюда съ половины октября до половины поября.

107. Нырокъ красноносый. Fuligula rufina, Pall.

Табл. 112.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 649. Болъе распростр. названіе: красноносый нырокъ.

Мъстныя названія: шмаковая утка (на Дону): минявка (Астрах.). Польск.—kaszka helmiasta.—Киргиз.—кара-інрёкт-кизылт-башт.

Распространеніе красноносаго нырка и вообще довольно ограниченно, и въ частности въ нашей странъ. У насъ онъ распространенъ въ юго-восточномъ углу, гдъ поднимается къ съверу до Уфимской губ. и Сызрани, въ небольшомъ числъ встръчается въ области нижняго теченія Дона, и гитадится въ Новороссійскомъ крать, откуда залетаетъ въ губ. Воронежскую, Харьковскую и Подольскую. Изръдка залетаетъ въ Польшу и Прибалтійскій край. Въ Крыму бываетъ на пролетъ и зимою. На Кавказъ и въ Закавказъть отчасти живетъ осъдло, отчасти прилетаетъ сюда зимою.

Въ Оренбургскій край весною красноносый нырокъ прилетаетъ во второй половинъ апръля, въ Уфимскую губ.—въ концъ этого мъсяца. Осенній отлетъ происходитъ въ октябръ и ноябръ.

108. Чернеть хохлатая. Fuligula cristata, Leach.

Табл. 113.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 652.

Болъе распростр. названія: чернеть, хохлатая чернеть.

Мъстныя названія: чернешь, черневая, чернуха; хохлашая чернешь, хохлашъ (Петерб.); хохлашъ (Днъпръ); чернышъ, дупловка (Борович. у.); хохлашъ (пермск.); чернь, чернеть (Оренбург.); хохлашый нырокъ, чернешь (Казанск.); чернеть касакъ (въ Сибири); чернушка, манатка (?) (Харьков.).

Польск.—ezernica. Эст. ea part.—Фин.—jouhisotku, pilni sortti, vartti, narsku.—.Папл.— униель-виктикъ, уцибъ-фитагъ, витакъ, утеа-фъелтикашъ.—Башк. — каш-хилакъ. — Зыр.—тюкала.—Вогул.— торъ-вассе.—Остяцк.—тупъвассе; у Сургута—иикъ-вассехъ.—Тунг.—ёмбата, момчятъ.

Распространеніе у насъ хохлатой чернети весьма обширно. Съверная граница ея совпадаетъ болѣе или менъе съ сѣвернымъ предвломъ распространенія двеной растительности, такъ что поднимаясь мъстами до 70° с. ш., какъ, наприм., у русско-норвежской границы, вообще эта птица становится рѣдкой съ переходомъ за полярный кругъ. Что же касается южнаго предъла распространенія хохлатой чернети въ качествъ гнъздящейся птицы, то опредълить его не такъ просто. Въ Оренбургскомъ крат она наблюдается по многимъ больнимъ лиманамъ и озерамъ всей долины Илека и Хобды и по многимъ степнымъ ръчкамъ. На Сулюкъ-кулъ она очень обыкновенна, точно такъ же, какъ и на соленоводной Туманче. По Волгъ гиъздится до Сарепты и даже на Сарпъ. Слъдовательно, въ юго-восточной Россін черпеть гитадится къ югу до 48° с. ш. Но далтье на западъ южная граница распространенія описываемой птицы постепенно поднимается къ съверу. Такъ, чернеть спорадически еще гиъздится въ Воронежскої, Харьковскої и Кіевскої губ., по въ Польш'я бываетъ уже только на пролеть, хотя въ Прибалтійскомъ крав онять гивздится. Въ южной Россіи это — пролетная птица, въ Крыму пролетная и зимующая. На Кавказф чернеть во множествф встрфчается зимою на Каспійскомъ

побережьть, откуда залетаеть въ глубь страны. Кромть того, чернеть не только зимуетъ, но и гитвздится на армянскихъ озерахъ, наприм., на Гокчайскомъ.

Хотя для нашей страны, за исключеніемъ ея южныхъ окраниъ, чернеть является перелетною итицею, тъмъ не менѣе отдѣльныя особи этихъ нырковъ встрѣчаются зимою на незамерзающихъ полыньяхъ рѣкъ Пріуральскаго края, въ Польшѣ же чернеть остается съ осени до наступленія большихъ морозовъ, а весною появляется очень рано. Въ южной Россіи весенній пролеть чернети начинается уже въ началѣ марта; въ ередней полосѣ чернеть появляется въ концѣ марта или началѣ апрѣля и летитъ до начала мая. На пролетѣ держится иногда огромными стаями, которыя летятъ ночью, днемъ останавливаясь на отдыхъ по озерамъ и старицамъ рѣчныхъ долинъ.

109. Чернеть морская. Fuligula marila, L.

Табл. 114.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 657.

Болъе распростр. названія: морская чернеть, морянка.

Мѣстныя названія: соровая утка (на Оби); морянка, морская чернеть (Петербург. губ.); плесовка (Борович. у.).

Польск. — ogorzałka. — Эст. — safka. — Фин. — tunturisotka, isosortti. — Ланп. — стуора виктакъ. стуора фитагъ. фъелтакъ. — Ост. — лапи-ченчь. — Самоъд. — та́нео́у.

Морская чернеть гитадится у насъ въ Лапландіи и Финляндіи отъ 70° с. ш. къ югу до 61°25′ и спорадически на иткоторыхъ большихъ озерахъ Новгородской губ. Такъ какъ лѣтомъ эта птица была встрѣчена въ Петергофскомъ у., то не лишено въроятія гитадованье ея и въ Петербургской губ. Однако, далѣе на востокъ она, повидимому, гитадится только въ тундрахъ, Канинской и нижне-печорскихъ, и можетъ быть по Уральскому хребту къ югу до Верхотурскаго у. На пролетѣ морская чернеть найдена по всѣмъ прибрежнымъ и рѣчнымъ пролетнымъ путямъ, но въ наибольшемъ количествѣ на балтійскомъ и на тѣхъ, которые ведутъ къ Черному морю. Въ Польштъ морская чернеть въ небольшомъ количествѣ даже зимуетъ. Но главная область зимовокъ этой итицы у насъ принадлежитъ Черному морю. Отчасти зимуетъ и на Каспійскомъ морѣ, преимущественно въ его сѣверной части, и даже на Гокчайскомъ озерѣ.

110. Нырокъ красноголовый. Fuligula ferina, L.

Табл. 115.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 660.

Бол'ве распростр. названіе: красноголовый нырокъ.

Мѣстныя названія: *иолубая чернеть* (по Палласу, гдѣ?); самецъ въ брачномъ нарядѣ *солдатъ*, самецъ въ лѣтнемъ нарядѣ и самка *чернышъ. нырокъ* (Воронежск.); *чернеть красноголовая* (Петербург.); *нырокъ красноголовай* (Оренбург.); *мырокъ* (Уральск. каз.); *красноголовикъ*, *сизонъ* (Екатеринб.); *нырокъ красноголовый*, *большой иырокъ* (Казанск.); *бакланья утка* (Астраханск.); *рыжеголовка. рыжеголовая чернеть* (Сарпа).

Польск. — głowienka. — Фин. — punasotka. — Остяц. — помъ-лопте; у Нарыма — ытекунгъ; у Сург. — каулангъ. — Тунг. — дуруту. — Якут. — тошпасъ.

Красноголовый нырокъ распространенъ во всей южной и средней Россіи, но съверная граница его еще далеко не выяснена. Въ юго-западной Финляндіп онъ паръдка гивадится до 63°, но уже въ Петербургской губ. не поднимается далъе 60°, такъ какъ не найденъ съвернъе южной оконечности Ладожскаго озера. Еще далъе на востокъ съверная граница красноголоваго нырка должна нъсколько опуститься къ югу, но, судя по его пролету въ средней Россіи, онъ долженъ еще гитадиться въ Вологодской губ. Въ Казанской губ. эта птица встръчается и даже неръдко по нижнему теченію Вятки. Въ Пермской едва ли гитадится въ Верхотурскомъ у, и во всякомъ случать не ствернтве Тагила, хотя на весеннемъ пролетть залетаетъ до Богословска. Въ видъ исключенія красноголовый нырокъ залетаетъ въ Лапландію (область Торнео) и даже до Варангеръ-фіорда. Въ Прибалтійскомъ краф гифздится спорадически. По сфверному побережью Чернаго моря живетъ осъдло, псключая Крыма, гдъ бываетъ на пролетъ и зимою. Что же касается Каспійскаго моря, то здѣсь красноголовый нырокъ только зимуетъ и бываетъ на пролетѣ. Въ Закавказьъ, внутри страны, найденъ пока только на пролетъ.

Красноголовый нырокъ прилетаетъ на педълю позднъе чернети.

111. Широконоска. Anas clypeata, Briss.

Табл. 116.

Мензбиръ, Птицы Россін, т. І, стр. 665

Болѣе распростр. названія: широконоска, лопоноска.

Мъстныя названія: широконоска, плосконоска, илутонось (Оренбург.); лупоносая (Малорос.); лопаноска (Петерб.); лопоноска (Тульск.); шупоноска (Харьк.); соксунь (гдъ?), саксань (Ярослав.).

Польск.— ptaskonos.— Фин.— lapasorsa. — Эст. — luitso nok. — Вогул.— моктомъ.—Ост. (берез.) — логали; (сургут.) — лукколь; у Нарыма — соека.— Самоъд. — саау-тула. — Монг.-бурят. — илбунъ. — Тунг. — шонколъ. — Ламут. — лонъ. — Кор. — уалишули. — Камч. — ченчину и чанченъ.

Въ Финляндін шпроконоска распространена къ сѣверу до сѣверной части Ботническаго залива въ шпрокой береговой зонѣ послѣдняго, изрѣдка встрѣчается въ губ. Коупіосской и С.-Михельской, чаще у Ладожскаго и Онежскаго озеръ. Затѣмъ найдена въ устъѣ р. Сумы, обыкновенна подъ Архангельскомъ и встрѣчается въ области нижней Нечоры, хотя здѣсь рѣдка. Къ югу отсюда шпроконоска распространена въ качествѣ гнѣздящейся птицы во всей странѣ. Равнымъ образомъ гнѣздится на Кавказѣ, гдѣ, кромѣ того, обыкновенна зимою.

Ипроконоска прилетаетъ нъсколько поздите кряквы, а отлетаетъ гораздо раньше.

112. Чирокъ-трескунокъ Anas circia, L.

Табл. 117.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 668.

Болѣе распростр. названія: большой чирокъ, чирокъ - трескунокъ.

Мъстныя названія: ипрокъ, сизикъ (подъ Екатеринб.); большой ипрокъ, ипрокъ соровый (Казапск.); трескупокъ, ипрокъ-трескупокъ (Сарпа); некловъ, ипропокъ (Харьков.); ипрокъ-трескупъ (Симб. губ.); ипрушки (Новгород.); ипрокъ, ипринки, трескупъ. морской ипрокъ пирокъ коростелекъ (Петерб.); ипрокъ храпунокъ (Херсонск.); тиркупокъ (на Ильменф).

Польск.—eyranka.—Лат.—prischke.—Фин.—heinätavi.—Кирг.—ипрокай ійрёкъ.—Вог.—пурви.—Ост. пюрри; у Сургута—пылы, пырии; у Нарыма—пакке.—На Сосывь—пырви.—Самовд.—пьосокъ.—Тунг.—бурбуки.

Чирокъ-трескунокъ, за исключеніемъ области Торнео, не найденъ въ Лапландіи. Не найденъ также около Бѣлаго моря, на нижней Печорѣ, въ губ. Архангельской и Вологодской, и вѣроятно далеко не повсемѣстенъ въ Вятской. Что же касается остальной страны, то трескунокъ распространенъ въ качествѣ гнѣздящейся птицы всюду, равно какъ и на Кавказѣ. На окраинахъ чернозема и въ черноземной полосѣ этотъ видъ гораздо обыкновеннѣе, нежели дальше къ сѣверу. Въ южной полосѣ Россіи обиленъ также на пролетѣ, но зимовать не остается ни въ южной Россіи, ни на Кавказѣ, хотя зимуетъ на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ.

Въ южной Россіи пролетъ этого чирка происходитъ во второй половинѣ марта, въ средней—въ концѣ марта или началѣ апрѣля. Отлетъ на сѣверѣ начинается уже съ начала августа и продолжается до октября.

113. Чирокъ-свистунокъ. Anas crecca, L.

Табл. 118.

Мензбиръ, Птины Россіи, т. І. стр. 671.

Болѣе распростр. названія: чирокъ, чиренокъ, чирокъ - свистунокъ.

Мѣстныя названія: чирокъ хринунокъ, чирокъ, милия порховка (у помор.); чирокъ грязникъ, чиренокъ (Петербург.); чирокъ половой (Казанск.); чирокъ малый, грязнушки (у Оренб. каз.); хринучка (Симбир.); правничокъ (Харьков.); чирокъ, евистунъ, евистунокъ (Сарпа); чирушка (подъ Екатеринб., Оренбург., Новгор.); чирокъ евистунокъ (Херсонск.).

Польск. — cyraneczka. — Эст. — piri part, muda part. — Лат. — krihulis lohschne. — Фин. — tavallinen tavi, tavi. — Лап. — чивить, чикса, риктіи. — Қавк. тат. — сиргейурдакъ. перэнъ. — Груз. — кокона ниви. — Башк. — тырагай. — Кирг. — кечкентай, чирокай-ійрекъ. — Вог. — топеръ-топервой. — Ост. — типиритири, пырешие, ханджи, шыдатъ. — Тунг. — чиркукы. — Ламут. — куричъ. — Коряц. — учалганылъ. — Камч. — нешукунъ, прыхчъ. — Укинц. (вост. камч.) — пыдшукчъ. — Кур. — туріуэ.

За исключеніемъ Новороссійскаго края и Крыма, чирокъ-свистунокъ гитадится во всей Европ. Россіи и на Кавказт, но онъ сравнительно ртадокъ на югт, гдт преобладающею формой является предыдущій видъ, и очень обыкновененъ на стверт, гдт мъстами совершенно замтняетъ чирка-трескунка, мъстами же встртиается вмъстт съ нимъ, но въ гораздо большемъ количествт. Зимуетъ въ области Чернаго и Каспійскаго морей.

Чирокъ-свистунокъ очень рано возвращается на свою родину и поздно улетаетъ отсюда.

114. Чирокъ узконосый. Anas angustirostris, Ménéth.

Табл. 119.

Мензбиръ, Итицы Россіп, т. І, стр. 674.

Болѣе распростр. названія: чирокъ узконосый, льтняя утка.

Мѣстныя названія: лютиня утка (у жит. Ленкор.) – Татар.— ак-öрдекъ (Ленкор.); таш-урдакъ (Туркест.).

Свъдънія о распространенін у насъ узконосаго чирка были уже ранъе собраны мною и съ тъхъ поръ, къ сожальнію, не пополнились.

"Узконосый чирокъ, — писалъ я, — открытый Менетріе въ маф 1830 г. около Ленкорани, принадлежить самымъ южнымъ частямъ нашей страны. Г. Карелинъ упоминаетъ его въ спискъ птицъ Уралоказачынхъ владъній, гдь опъ, въроятно, встржчается въ самомъ устьф р. Урала. Арцибашевъ, Генке и Яковлевъ приводятъ его для дельты Волги, гдъ эта утка появляется очень поздно, именно въ самый сильный разливъ воды, и гитадится въ вороньихъ гитадахъ или въ дуплахъ деревьевъ. Богдановъ нашелъ этого чирка въ сентябрѣ на Прорвъ, въ дельтъ Терека. Зимою Радде наблюдалъ узконосаго чирка нодъ Ленкоранью, гдф, по его словамъ, эту птицу зовутъ лътнею уткой, что указываетъ на гибздованье ея подъ Ленкоранью. Правда, Радде не видътъ узкопосаго чирка въ упомянутой мъстности во время своихъ весеннихъ экскурсій, но за то Менетріе наблюдалъ его здѣсь въ концѣ мая—время слишкомъ позднее для пролета. Съ Чернаго моря эта утка намъ неизвъстна, но въ коллекціи г. Геллерта имъется экземпляръ узконосаго чирка, добытый 24 мая 1881 года въ области Пльменя, фактъ въ высшей степени замъчательный. На востокъ отъ Каспійскаго моря узконосый чирокъ очень обыкновененъ въ Закаспійскомъ краф, откуда распространяется и въ предълы Туркестанскаго края, гдф найденъ какъ на Аму-Дарьф, такъ и на Сыръ-Дарьф".

115. Утка сѣрая. Anas strepera, L.

Табл. 120.

Мензбиръ, Птичы Россіп, т. І, стр. 677.

Болѣе распростр. названія: полукряква, сърая утка.

Мъстныя названія: крякушка (Пермск.); семинулъ (Рязанск.); съруха, съружа, (Оренбург.); съруха, полукряква (средн. Поволжье); подматерая, полукряковая, единородная утка (охотн.); морская утка (Астрах.); перезень (Херсонск.); тростянка (Тамбовск.); сърия утка, полуматерая утка, полуматерка, подматерка (Москов.); ладожская кряква (на Ильменъ).

Польск. — krakwa. — Тат. — кооръ-урдакъ, кара-брдесъ. — Башк. — куейлъ.

Монг.—ширягой, борджо-погосюнь.—Бурят.—цанив-далю.

Распространеніе у насъ сърой утки далеко не такъ обширно, какъ нъкоторыхъ другихъ утокъ, такъ какъ она принадлежитъ южной половинъ Россіи. Начиная съ запада, мы видимъ, что сърая утка гивэдится въ небольшомъ числъ въ Польшъ, но не гивэдится въ Прибалтійскомъ краф, гдф бываетъ очень рфдко. Равнымъ образомъ мы не знаемъ ничего опредъленнаго объ ея гифздованіи въ Петербургской губ., куда она, повидимому, залетаетъ въ разное время, какъ и на Нюландское побережье. Не гитадится и въ Новгородской губ., гдф однако бываеть въ качествф залетной птицы, но, можетъ быть, гифздится въ Московской, и несомифино гифздится въ Рязанской, Тамбовской, Казанской и Пермской, поднимаясь до широты Екатеринбурга. Къ югу отсюда сърая утка распространена на гивадовыв во всей странв, исключая Крыма и окрестностей Астрахани, гдъ бываетъ только на пролетъ. На Кавказъ и въ Закавказъъ сърая утка гифздится какъ въ низменностяхъ, такъ и на озерахъ Армянскаго плоскогорья, и зимуетъ въ береговой зонъ.

Въ южной Россіи сърая утка появляется очень рано — уже въ началъ марта, но пролетъ ея къ съверу тянется медленно, такъ что въ центральную Россію она прибываетъ только въ началъ апръля. Отлетъ изъ средней Россіи пачинается съ сентября. По крайней мъръ въ Харьковской губ. болъе значительный пролетъ начинается около середины сентября, въ налбольшемъ количествъ сърыя утки попадаются въ половинъ октября, послъднія отлетаютъ иногда даже въ началь ноября.

116. Кряква. Anas boschas, L.

Табл, 121.

Мензбиръ, Птицы Россін, т. І, стр. 681.

Болъе распростр. названія: кряква, матерка.

Мъстныя названія: кряква, крякуша, кряковная или машерая ушка: свърука; еелезень (въ Полевск., Павдии, и Богосл, зав.); еелезинка (Турухан, край); крыжень, качка (Малор.); крыженя (Бессар.); крякушка (у русск. въ Якут, обл.).

Польск.— kaczka krakwa, posholita, krzyżówka.— Эст.— mets part, sini kal'.— Лат.— mescha pilde, mer: pihle.— Фин.— sinisorsa, punasorsa, puna-eller, punajalkasorsa.— Ланл.— сшуора фуояшъ, дёрса.—Молд.—рацы салбатикы де челиматъ.

Кпрг. — кониуръ - йирёкъ. — Вашк.- мени. — кунальурджъ. — Тат. — кональ, кизъ-урдакъ. — Морд. — якзерге. — Чув. — куаналь. — Зыр. — керагъ. — Ост. — ваза, васеэхъ, бънь. бъндъ (въ Турух. крав утка вообще, по Трет.). — Черем. — муда. — Вот. — ньише. иечь. — Вог. — нотъ, бънте. — Пушно-кол. — бани. — Имбац. — бёну. — Самовд. — нэби, напу. — Койб. — напъ. — Караг. — ура. — Монг. — азинъ. — Калм. — ногоссунъ, бороджинъ. — Тунг. — ченуль, чинкаръ. — Юрац. — нэбы. — Ост. - сам. — типа. — Лам. - сам. — никисъ. тирми. — Вилюйс. тунг. — къхэе. Якут. — кызнъ. кызони. — Танг. ср. Ам. — тармя. — Манягр. — тарми. — Баунт. тунг. — чукдуль. — Вил. якут. — колонь. — Монг. и Гольд. (Амуръ и Уссури) — тарми и тарми. — Ороч. (прибр.) — шха, (вер. Ам.) — ника. — Юкаг. — оаджинонда. — Ассан. — нинъ. — Арин. — нонжа. — Камч. — саинъ, мехмель. — Кур. — сианичъ, саанчичъ. — Ковяцк. — гейношчи. — Кавк.-тат. — эрдекъ. — Груз. — переули-ихви. — Арм. — бадъ. — Перс. — мухаби.

ВВЕДЕНІЕ.

Обзоръ области распространенія и мъстонахожденій кряквы.— Общій очеркъ повадокъ и привычекъ птицы.

При своемъ громадномъ распространении кряква пользуется такою популярностью, что трудно встрътить человъка, который, хоть нъсколько разъ держа ружье, не могъ бы сказать, что онъ охотился на утокъ. Большая часть настоящихъ охотниковъ начинаетъ обыкновенно

также съ утки и хотя потомъ переходитъ на другую, болъе завидную дичь, но въроятно не безъ удовольствія вспоминаеть и которые часы, проведенные на утиной охотъ. Правда, у охотниковъ слово "утятникъ" можеть почесться браннымъ словомъ, но происходить это не потому, что всякая охота на утокъ почитается пустою и не стоящею вниманія, а потому, что утки составляють одинъ изъ очень важныхъ предметовъ охотничьяго промысла и терминъ "утятникъ" употребляется наравиъ съ терминомъ "промышленникъ". Я лично по себъ знаю, что утиная охота можетъ иногда доставить большое удовольствіе и отношусь къ ней тъмъ безпристрастиве, что бывъ прежде горячимъ охотникомъ, теперь совствить оставиль охоту. Конечно, не вст охотники цтить въ охоть одно и то же, — одни увлекаются собакой, другіе — собственно стрѣльбой, третьи картинами природы и т. д., но я не могу забыть и долго не забуду т'яхъ первыхъ весеннихъ дней, когда, бывало, сквозь густую нелену тумана видишь передъ собою вершины темнаго л'ьса, слышши нескончаемое журчанье струй и жадно вдыхаешь въ себя теплый, сырой воздухъ. Қакое-то безпокойство, какъ перелетною итицей, овладъваетъ тобой, уноситъ въ поле, заставляетъ цълые дни проводить вить дома. Какъ, бывало, обрадуещься, услыхавъ крикъ кряквы, пріютившейся въ дозняк ближайшей разонки—и съ какимъ удовольствіемъ добудень ея красиваго селезня.

Распространеніе кряквы, повторяю, громадно: вся Европа, Азія, отъ Спбпри до Китая и Японіи на востокъ и до Персіи къ югу, Съверная Америка, отъ верхней Канады и земель Гудзонбайской компаніи до Мексики, Гренландія, Псландія, зимою—съв. Африка и Египеть. Въ Европ. Россіи кряква распространена положительно повсемьстно (къ югу отъ 70° с. ш.), и потому иътъ шикакой надобности перечислять всъ тъ болота, ръки и ръчки, на которыхъ водится эта птица. Осущеніе болоть, само собою разумъется, ведеть къ уменьшенію въ численности кряквы, но все-таки до сихъ поръ это самая обыкновенная изъ всѣхъ нашихъ утипыхъ нородъ.

Въ Европ. Россіп кряква принадлежить къ числу перелетныхъ птицъ, хотя не только въ южной, по и въ средней части Европ. Россіп эта птица въ видъ псключенія остается и на зиму. Въ средней Европъ кряква остается на зиму уже гораздо чаще, а что касается занадной и южной Европы, какъ, папр., Англіи, Франціи, Пспаніи, Пталіи, Венгріп и Турціи, то тамъ зимою кряковыя утки собираются громадными стадами. Впрочемъ, упоминаемое здѣсь явленіе—постепенное развитіе перелетовъ изъ кочевокъ по мѣрѣ отдаленія отъ западно-европейскаго берега Атлантическаго океана и приближенія къ Восточной Азіи — вовсе не есть частный случай, такъ какъ находить себѣ подтвержденіе на многихъ другихъ птицахъ и объясияется годичными колебаніями температуры въ зап. Европъ и въ восточной Европъ и центральной Азіи, годичными колебаніями, которыя отражаются косвенно на періодическихъ явленіяхъ въ жизии высшихъ животныхъ, имъя прямое вліяніе на жизиь растеній и низинихъ животныхъ, имъя прямое вліяніе на жизиь растеній и низинихъ животныхъ, имъя прямое вліяніе на жизиь растеній и низинихъ животныхъ, имъя прямое

Кряковая утка должна по справедливости почитаться итицею пръсноводныхъ бассейновъ; хотя ипогда стада кряквъ и спускаются на морскіе заливы, но пребываніе ихъ здъсь кратковременно, такъ какъ они спускаются сюда только для отдыха.

Любимое мъстопребывание кряквъ стоячія пръсныя воды, пороснія камынюмь, травою и кустарінкомь, стоячія воды, зароснія ряскої и съ небольшими болже глубокими участками, свободными отъ всякой растительности. Такія мѣстонахожденія дають кряквѣ все, что нужно: им в она находить себт вънихъ прекрасную защиту, почью—обиле корма, хотя, скажу теперь же, кряква не любить кормиться тамъ, гдв диюеть. Точно такъ же любить кряква такія неглубокія озера, края которыхъ на больное разстояне отъ берега поросли пловучими травами, но опять-таки и въ этомъ случав чистыя, свободныя отъ растительности м'яста необходимы: кряква выбирается сюда вечеромъ и раниимъ утромъ, а иногда и почью. Вообще говоря, днемъ кряква тантся въ заросляхъ камына, осоки, кустаринковъ и т. п., но какъ только настунаетъ вечеръ, такъ сейчасъ же вынлываетъ на открытыя wbcta. Здѣсь до уборки хлѣба она остается и ночью, а въ концѣ лѣта на почь стада кряквъ обыкновенно летають кормиться на хатьбныя поля. Но зато никогда, какъ въ концъ лъта и особенно въ началъ осени, кряквы не собираются въ такія огромныя стада на чистыхъ, незароснихъ водныхъ площадяхъ занятаго ими озера: нара за нарой, маленькія стадечки за большими вынлывають сюда съ приближеніемъ солнечнаго заката и наконецъ, буквально покрывають собою всв чистыя м'яста озера. Чамъ больше темизеть, тамъ туще становятся стада, но вывств съ твыть извоторыя изъщих начиняють подинматься съ озера. Первоначально поднявшіяся особи, описавъ одипъ-два круга, обыкновенно опять усаживаются на озеро. Но мало-но-малу такіе взлеты становятся чаще и чаще, и, наконецъ, вся масса утокъ раздетается въ разныя стороны большими или меньшими стадами. Онъ улетаютъ на мелкія болотца, на хлъбныя поля и т. п. и тамъ остаются до утренней зари. Вмфстф съ первымъ утреннимъ свфтомъ утиныя стайки опять слетаются на озера и, либо перелетая, либо переплывая, забираются въ глушь, гдф и проводять день. Впрочемъ, такія громадныя стаденія утокъ передъ ночной кормежкой и по окончаніи ея я наблюдалъ только въ южныхъ губерніяхъ; въ среднихъ-стаденій, поражающихъ своими размърами, нътъ, хотя передъ почной кормежкой утки выплываютъ на чистыя открытыя мѣста, – и эту разницу я объясняю просто тъмъ, что въ среднихъ губерніяхъ кряквы гитадятся болье врозь, чъмъ на югъ. Въ центральной Россіи, за немногими псилюченіями, гдъ я ни быль, кряквъ приходится выбирать для своего гнъздовья всякое мало-мальски подходящее м'всто, иногда на очень большомъ разстоянін отъ другого, такого же гибздовья. Видіть во время вывода дътей стадечки селезней въ 10-12 штукъ-здъсь ръдкость. Откуда же собираться въ концъ лъта большимъ стадамъ, когда мъстныя условія прямо заставляють птицу вести жизнь отдільными

семьями? Впрочемъ, слабое напоминаніе тахъ громадныхъ утиныхъ массъ, какія скопляются, напр., на озерахъ Воропежской губ., усъянныхъ такъ называемыми "коблами", представляютъ собою сборища утокъ на озерахъ и болотахъ губ. Ярославской, Владимірской и немногихъ другихъ, и я позволю себф привести описаніе этихъ "утиныхъ" мъстъ для полноты очерка, откладывая описание озеръ съ коблами до конца монографіи. Начну съ Владимірской губ. "Особую мъстность для охоты, - говоритъ г. Гавриловъ, - представляютъ кляземскія поймы и прилегающія къ нимъ болота. Клязьма постоянно течетъ въ глубокой долинъ, ширина которой иногда доходитъ до 4 версть, тогда какъ ширина самой рѣки при меженной водѣ не превышаетъ 150 саженъ; вся остальная долина, окружающая рѣку, называется поймой, потому что при весенней водополи и сильныхъ паводкахъ вся мъстность до краевъ долины понимается (заливается) водою. Изъ небольшой рѣчки въ водополь Клязьма дѣлается огромной рѣкою, въ иныхъ мъстахъ до четырехъ верстъ иприны; кое-гдѣ бугры и высокія кустарныя гривы долины выступають островами надъ этої огромной массой воды. Когда рѣка войдетъ окончательно въ берега, то, разумвется, углубленія рвчной долины остаются полными водою и образуютъ пойменныя озера; небольшія озера скоро пересыхаютъ, но другія, окруженныя кустарникомъ и кочками, расположенныя на болотистомъ грунтъ, сохраняютъ воду на весь годъ, до слъдующей водополи. Широкія низменности долины, не слишкомъ углубленныя и покрытыя кочками, образуютъ поемныя болота, вообще неглубокія и не опасныя для ходьбы; въ поемныхъ болотахъ очень ръдко встръчаются ключи, вся вода ихъ наливается водополью и дождями; въ жаркое и сухое лъто всъ эти болота пересыхаютъ.

"Болота, лежащія около озеръ, большею частью покрыты кочками и кустами, иногда такъ частыми и высокими, что ходьба бываетъ чрезвычайно трудна и утомительна, хотя и не опасна. Есть поймы, такъ густо поросиия кустарникомъ и изръзанныя такимъ множествомъ озеръ, что зашедши туда, трудно выбиться изъ этого лабиринта. Кустарникъ поймъ замѣчателенъ чрезвычайнымъ обиліемъ дубовыхъ деревьевъ; есть мъста, поросшія на нъсколько верстъ дубнякомъ. Дубъ этотъ вообще малорослъ, неровенъ и искривленъ; очень рѣдко встрівтишь дубъ, годный на что-нибудь, кром'в дровъ. Вівроятно, это выродившіеся остатки прежнихъ дубовыхъ лѣсовъ, окружавшихъ Клязьму. До сихъ поръ въ ръкъ и пойменныхъ озерахъ безпрестанно встръчаются огромные дубы, имъющие болье аршина въ діаметръ, въроятно, многія сотни лътъ уже лежащіе въ водъ; эти дубовыя деревья, называемыя здісь корягами, сохранили всю крізпость и плотность дуба, не подверглись почти нисколько гніенію и отъ долгаго пребыванія въ вод'в получили только особенную тяжесть и темный, почти черный цвътъ. Быстрота ръчного теченія, рыхлость почвы п ровность мѣстоположенія производять нерѣдко перемѣны по направленію кляземскаго русла. Прорывъ себф новый путь, Клязьма оставляеть обыкновенно на прежнемъ мѣстѣ узкое и длинное озеро; озера, образующися такимъ образомъ, называются старицами. Но сдѣланному нами описанно кляземской поймы, опытный охотникъ напередъ опредѣлитъ какая дичь и какой родъ охоты преобладаютъ въ поймахъ. Обилю воды соотвѣтствуетъ и обилю водяной дичи, утокъ и мѣстами гусей".

Еще лучній притонъ для нлавающей дичи представляєть собою Ростовское озеро, занимающее площадь въ 4846 десятинъ; къ тому же оно окаймлено но большей части не только инзменными, но въ иныхъ мъстахъ и совершенно болотистыми берегами, заросними густою осокою, но, повторяю, кляземенихъ поймъ и Ростовскихъ озеръ въ центральной Россіи немного.

Возвращаясь къ общей характеристикъ кряквы, я долженъ сказать, что, несмотря на мъстность, каждый вечеръ утки отправляются куда-інібудь на кормежку, слъдовательно, нормально не почують тамъ, гда были днемъ. Для почныхъ нохождений она обыкновенио выбирають всякое подходящее болотце, широкій оврагь съ застоявшеюся, норосшей кустами и камышомъ водою, пруды вырытые и мельничные и т. д. Глубокихъ водъ съ несчанымъ или каменистымъ дномъ онъ вообще не любять, —при такомъ днѣ имъ нечего взять своимъ мягкимъ клювомъ; напротивъ, при диф илистомъ онф находять обиле корма, нропуская черезъ клювъ, "щелокча" совсфиъ жидкую грязь. Точно такъ же избъгаетъ кряква быстро текучихъ водъ, и если иногда и встръчается здъсь, то только въ такихъ мъстахъ, гдъ за изгибомъ образуется заливецъ съ тихой водой, или гдѣ берега тѣнисты и норосли кустарникомъ, камышомъ и болотною травою. На облюбованномъ болоть или озеръ кряквы держатся обыкновенно всю ночь до утренней зари. Съ разсвътомъ, когда клубы тумана еще мъшаютъ разобрать кусты и траву, кряквы съ ночной кормежки отправляются на дневку въ болъе укромное мъстечко, хотя въ мъстахъ, гдъ ихъ не тревожать, остаются здѣсь и долѣе, даже часовъ до 6 — 7. Возвратившись на покой въ свое дневное убъжище, кряква охорашивается, перебираетъ перья и засыпаетъ. Спитъ она и на землѣ, и на водъ. Завернувъ голову подъ крыло или, строго говоря, засунувъ ее между сиинными и плечевыми перьями, она иногда нъсколько часовъ пребываетъ въ такомъ положении, при чемъ въ случать сна на водъ при волнть все-таки остается на одномъ м'вст'в, такъ какъ не перестаетъ равномърно двигать ногами даже во время сна.

Охотники хорошо знаютъ, что кряква мастерица нырять, но совершенно взрослая она прибъгаетъ къ этому только въ случать, если завидитъ хищную птицу или будучи тяжело раненою; напротивъ, въ молодости кряквы ныряютъ просто ради удовольствія, чтобы поиграть. Про искусство взрослої кряквы нырять С. Т. Аксаковъ разсказываетъ слъдующее: "подстръленная утка воровата, говорятъ охотники, и это правда; она умъетъ мастерски прятаться даже на чистої и открытої водъ: если только достанетъ силъ, то она сейчасъ нырнетъ и, про-

плывъ саженъ пятнадцать, иногда и двадцать, выныриетъ или, лучше сказать, выставитъ только одинъ носъ и часть головы наружу, и прильнетъ плотно къ берегу, такъ что нѣтъ возможности разглядѣть ее. Если же берега травянисты, то безъ хорошей собаки ни за что не найдешь подстрѣленной утки: она вылѣзетъ на берегъ и пропадетъ. Посреди чистой воды, когда берега голы и круты, она выставитъ одинъ носъ для свободнаго дыханія, и ногруженная всѣмъ остальнымъ тѣломъ въ воду, уплыветъ по теченію рѣки, такъ что и не замѣтишь".

Летаетъ кряква отлично. При этомъ она совершенно растягиваетъ крылья и производитъ ими небольшіе, но частые взмахи, отчего при полеть слышится особый свисть, которому можно подражать звуками "вихывихынхы..." и т. д. Опытное ухо сразу отличить по этому свисту крякву на лету даже среди ночи. Полетъ кряквы сильный, и итуп отомкап ато кінэноглято атклад атибок. не вистипи вте виотипи. Только обезпокоенная или боящаяся спуститься на воду прямо, не оглядвишсь, кряква описываетъ многочисленные круги, при чемъ, конечно, высматриваетъ м'ястность, стараясь открыть, н'ятъ ли на ней чего подозрительнаго. Спускаясь на воду, эта птица обыкновенно поворачивается нъсколько съ боку на бокъ, но въ это время не отклоняется отъ прямой линіп. Какъ на взлеть, такъ и при опусканін кряква не поднимается вертикально и не спускается, прямо падая внизъ, – она всегда и поднимается, и садится, летя вкось. На полетъ кряквы располагаются обыкновенно косымъ рядомъ, рѣдко двумя сложенными въ открытый сзади треугольникъ. Кучно, безъ особаго порядка кряквы летаютъ рѣдко, развѣ когда имъ перелетѣть недалеко. Если летитъ пара, то самка всегда впереди, а селезень и всколько свади и сбоку. Надъ водой кряква летить гораздо ниже, чъмъ надъ землей: летя надъ землей, эта птица поднимается иногда очень высоко. Изъ чувствъ у кряквы лучше всего развить слухъ; зрѣніе, какъ ни развито оно на самомъ дълъ, все-таки далеко уступаетъ слуху. Этимъ объясняется то, что кряква ночью далеко не такъ подвижна, какъ днемъ, когда она не только слышитъ, но и видитъ очень далеко. При отлично развитыхъ органахъ чувствъ кряква очень осторожна и на большихъ водныхъ пространствахъ удпраетъ, завидъвъ человъка болѣе чѣмъ за 400 шаговъ; на менышихъ водныхъ площадяхъ кряква подпускаетъ ближе, шаговъ на 200, на 150, но во всякомъ случав далеко не подпуская на выстрълъ. Впрочемъ, что касается осторожпости кряквъ, то, конечно, ивтъ охотинка, который не пспыталъ бы ее на себъ. Только при условін полной безопасности въ продолженіе очень долгаго періода временні въ изв'єстной м'єстности водящіяся въ ней кряквы относятся къ человъку съ сравнительно меньшимъ недовърјемъ, но стоитъ только разъ обезноконть итицу, и вся ея природная недовърчивость и осторожность проявляются въ полной силъ. Напуганная выстреломъ кряква долго не возвращается на покинутое ею м'всто и, будучи потревожена вторично, почти нав'врное оставитъ его навсегла.

Довольно хороню описываеть осторожность кряквы г. Ереминъ, "Утки, какъ и всякая дичь, —говоритъ опъ, —больне всего боятся собственно фигуры человъка и преимущественно охотника, а не того шороха и даже гула выстръда, на который обыкновенно сваливають всю вину пеудачнаго подхода: по крайней мъръ у насъ ръдко услышинь, что треспувний сучокъ все дъло пспортилъ. Нътъ сомпънія, что треспувний сучокъ всполонитъ утокъ, по, не увидавши человъка, опъ въ большинствъ случаевъ не подшимаются, а останутся на мъстъ.

"Однажды миф приньлось подкрадываться къ кряковымъ и сфрымъ уткамъ, сидъвнимъ на одномъ изъ концовъ Архинова сагова. Подобравнинсь къ камыну, я увиділь въ немъ свиней, рывшихъ землю и громко чавкавнихъ и хрюкавнихъ; зам'ятивъ меня, свиньи бросились бъжать, по произведенный ими трескъ только заставиль утокъ слегка насторожиться; немного времени спустя он в усноконлись, видимо не обращая на шумъ никакого винманія. Зам'ятивъ это, я началъ подбираться уже безъ особенной осторожности, продолжая тщательно скрываться; утки на трескъ и нлескъ, производимый мною, также почти не обращали вниманія. Я продолжаль подкрадываться, какъ вдругь на другомъ концф озера раздался выстрфлъ, затъмъ другой. "Ну,-думаю, пропало все дело", по утки продолжали сидать и только недовърчиво поглядывали по сторонамъ. Я, конечно, обрадовался такому ихъ смирению и отправился дальше, по внезанное кряканье заставило меня броситься впередь. Я увиділть поднявшихся утокъ и охотника, стоявшаго на другомъ концѣ сагова. Ясно, что птица испуталась только челов'вка, но не шума и не выстр'вла.

"Точно такъ же мив иногда приходилось подползать къ уткамъ, уже напуганнымъ, на совершенно голыхъ мъстахъ: ползешь весь на виду, и какъ онф ин посматриваютъ, какъ ни сторожатся, а все-таки подпускають на выстраль. Въ этомъ случав для утокъ охотникъ является въ совершенно иномъ видѣ, иной формѣ, почему онѣ къ нему и относятся индиферентно; но зато послъ и всколькихъ выстръловъ по одной став такимъ манеромъ къ ней уже не доберешься; если даже хоть одна утка изъ напуганнаго табуна затешется въ непроученную, то и тогда дело будеть, наверно, испорчено. Что утки больше всего боятся фигуры охотника, доказываютъ также неудачные подходы по ръдколъсью во время сильныхъ вътровъ: несмотря на то, что шумъ тростника и лъса совершенно заглушаютъ посторонній щорохъ, къ уткамъ никогда не подойдешь на выстрѣлъ. Наоборотъ, въ самую тихую погоду, вдобавокъ на зарѣ, если только приходится подходить къ уткамъ густымъ лѣсомъ съ валежникомъ и, слѣдовательно, дъло не обходится безъ страшнаго треска, охота всегда почти бываетъ весьма удачна.

"Къ концу отлета жилыя утки тоже становятся необыкновенно строги и пугливы, хотя далеко не въ такой степени, какъ прилетныя— чужія. Эти послъднія до такой степени осторожны и пугливы, что

пногда положительно нѣтъ никакой возможности подобраться къ нимъ. Нной разъ бѣгаешь безъ устали съ одного конца озера на другой, отъ одного сагова къ другому, а толку никакого: утокъ тьма, а стрѣлять не приходится. Въ особенности плохо подпускаютъ крыжныя и сѣрыя, а изъ шихъ селезни; тутъ всякое лыко, какъ говорится, идетъ въ строку: не говоря уже о томъ, что при видѣ человѣческой фигуры утки поднимаются чуть не за версту, въ это время малѣйшій шумъ, трескъ, колебаніе вѣтвей, даже шорохъ, произведенный какимъ-либо животнымъ, можетъ испортить все дѣло. По этимъ причинамъ охота на пролетныхъ утокъ очень интересна и заманчива, особенно въ половинѣ октября, когда лѣсъ оголится и осыпавшійся листъ шуршитъ подъ ногами. Сколько терялось тогда силъ и труда, сколько придумывалось разныхъ хитростей, чтобы подобраться къ уткамъ,—и все напрасно: въ результатѣ всего какія-нибудь 3—4 шт., между тѣмъ какъ, будь это жилыя, добычу можно было бы считать десятками".

Впрочемъ, надо сказать, что, будучи рѣшительно всегда птицею осторожной и недовърчивой, кряква въ разное время года ведетъ себя различно: въ періодъ линьки кряква не вылетить иначе, какъ въ крайнемъ случат; она хорошо знаетъ, что при ея медленномъ полетт въ это время ей нечего разсчитывать на силу своихъ крыльевъ и потому она забирается въ глушь, въ какую только можетъ; напротивъ, внѣ періода линьки, не им'тя возможности отплыть далеко, кряква поднимается очень скоро. Когда описываемая птица, находясь на небольшомъ прудѣ или озерѣ, замѣтитъ приближающагося охотника, она первымъ дѣломъ отплываетъ на середину, боязливо посматривая на предметь опасенія. При дальнѣїниемъ приближеніи птица начинаетъ безпокопться еще больше, порывисто переплываетъ съ мѣста на мѣсто все на небольшомъ пространствѣ и, наконецъ, срывается съ мѣста и улетаетъ. Точно такая же осторожность проявляется ею и въ то время, когда она только что прилетъла на воду. Сколько разъ, спрятавшись на берегу, следилъ я за утками, просиживая целые часы иногда въ далеко неудобномъ положении. Вотъ просвистали ихъ крылья, что-то мелькнуло, и, слегка поворачиваясь съ боку на бокъ, кряквы садятся на воду. Нъкоторое время проходить въ совершенномъ покоф: птицы гдф спустились, тамъ и остались, развф одна какая-нибудь проплыветъ нъсколько шаговъ, чтобы лучше разглядъть, что дълается кругомъ. Съ вытянутой шеей, вся на-сторожѣ, прислушиваясь ко всякому шороху, присматриваясь ко всякому подозрительному предмету, кряква въ эти минуты ожиданія положительно должна казаться красивой птицей и ръзко отдъляется своею стройностью отъ своей ближайшей родственницы – домашней утки. Иногда въ такомъ натянутомъ положеній кряква пробываеть очень долго: все діло въ томъ, сколько епустилось утокъ и какого онъ возраста: чъмъ ихъ больше, тъмъ больше и ихъ осторожность, что относится вообще ко всѣмъ птицамъ, и чемъ старше птица, темъ опять-таки она остороживе; молодыя глупы и неопытны и подпускають гораздо ближе старыхъ.

Голосъ кряквы, очень нохожій на голосъ доманшей утки, отличается отъ постедняго темъ, что онъ выше и чище, въ немъ меньше хрипоты, но и у кряквы основной звукъ можетъ быть переданъ словами "кваакъ" или "ваакъ". Кромъ того, при обычномъ крикъ "ваакъ, ваакъ, ваакъ, вакъ!" кряква кричитъ отрывиетве домашней утки, которая вм'ьсто трехъ разъ повторяетъ елогъ "ваакъ" иять, шесть разъ. Напболье высокимъ голосомъ "ваакъ" выкрикивается итицею въ нервый разъ, затъмъ голосъ постененно понижается, вмъсть съ тъмъ слогъ "ваакъ" перестаетъ быть протяжнымъ и, наконецъ, нереходитъ въ "вакъ". Радоеть свою кряква выражаеть, очень быстро произнося "вэктывакть, вэктывактывакты и т. д. и наклоняя вифстф съ тфит къ землѣ или къ водъ голову. Отрывистый "ваакъ" елужитъ предостереженість и призывомь. Утята не крякають, а шицать, а матка разговариваеть съ инми, произнося "ваакъ" черезъ разные промежутки и съ разными оттънками. Кромъ того, отвъчая на призывъ самки, саменъ издаетъ еще хринлымъ голосомъ крики "рээбъ, рэбъ" и т. д.

Чтобы покончить съ общимъ очеркомъ привычекъ и повадокъ кряквы, мит остается сказать только о ея пищть. Едва ли можно найти итицу ментве прихотливую на пищу, чтмъ кряква. Она фетъ ртинтельно все: листья, ночки и кории водяныхъ травъ, зерна, насткомыхъ, улитокъ, мелкую рыбенку и т. д., и все это уничтожаетъ въ громадномъ количествть.

говоритъ С. Т. Аксаковъ, — самая прожорливая птица. Она фстъ съ утра до поздней почи, фстъ все, что ни попало: щинлетъ растущую по берегамъ молодую гусиную травку, жретъ немилосердно водяной мохъ или шелкъ, зелень, цвътъ и всъ водяныя растения, жално глотаетъ мелкую рыбешку, рачатъ, лягушатъ и всякихъ водяныхъ, воздушныхъ и земляныхъ насъкомыхъ; за недостаткомъ же всего этого набиваетъ полонъ зобъ тиной и жидкою грязью и производитъ эту операцію насколько разъ въ день. Дворовыя же утки охотно апять всякую мясную пищу. Такому постоянному аппетиту отвъчаетъ и пищевареніе: съ неимовърною скоростью изнываетъ и разлагается въ ея зобъ всякая пища. Очевидно, что пищеварительный сокъ у нея долженъ быть очень остръ и горячъ. Утка безпрестанно испражняется, и пометь ея еще горячье гусинаго".—Въ тъхъ мъстахъ, гдъ утка чувствуетъ себя безопасной, она цълый день копошится у берега, пропуская черезъ ротъ, «щелокча" грязную воду со всъмъ въ ней находящимся. Все, что по вкусу или осязанію будетъ найдено ею съфдобнымъ, проглатывается. При этомъ можно слышать характерное чавканье, щелканье, происходящее оттого, что утка быстро открываетъ и захлопываетъ клювъ. Въ мъстахъ, не столь безопасныхъ, кряква кормится вечеромъ и ночью, для чего обыкновенно перебирается съ большихъ озеръ и заводей рѣкъ на мелкія болотца, озерки и пруды. Летомъ перелеты кряквъ на кормежку начинаются довольно поздно, совствить при закатть солнца или даже спустя иткоторое время послѣ него; осенью кряква вылетаетъ гораздо раньше, часа за три

до солнечнаго заката. Всю ночь кряква проводить или на одномъ болотив, или перелетая съ одного на другое, и инкогда не пропустить случая перехватить, что попадется. При этомъ следуетъ заметить, что каковъ бы ни былъ кормъ кряквы, вода ей необходима. Въ случать кормежки зернами на какомъ-либо нахотномъ поле кряква, набивни зобъ, немедленно отправляется на ближайшее озерко или лужу, чтобы смочить съеденное. Особенно охотно держатся кряквы на такихъ местахъ озера, где дно неглубоко и заросло травою: здесь обыкновенно во множестве водятся различные слизии и до шихъ-то и добираются утиные выводки, которые выводятъ сюда матки.

Хотя мною не разъ было сказано, что кряквы кормятся ночью, но не должно думать, что веф ночи одинаково пригодны для этого. Особенно д'ятельны утки въ ночь лунную. Напротивъ, въ очень темную почь описываемая птица смирна, такъ какъ плохо видитъ, а что касается ночей не очень темныхъ, то хотя въ теченіе ихъ кряквы и совершаютъ свои похожденія, однако бываютъ далеко не такъ оживленны, какъ при лунномъ свътъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ВЕСНА И ВЕСЕННЯЯ ОХОТА.

Хотя, строго говоря, разсматривать явленія въ жизни перелетныхъ птицъ слъдуетъ начиная съ осенияго отлета, которымъ открывается циклъ періодическихъ явленій, тъмъ не менъе я и на этотъ разъ придержусь уже раньше намъченной программы и начну описаніе образа жизни кряковой утки съ весны. Во-первыхъ, сути дъла это нисколько не мъшаетъ, а во-вторыхъ, такъ какъ ръчь идетъ почти исключительно объ образъ жизни кряквы въ Еврои. Россіи, то это представляетъ даже нъкоторыя удобства.

Прилетъ кряковыхъ утокъ начинается у насъ очень рано. Еще только что началъ станвать зимній сиѣгъ, едва-едва засинѣли лужи и стали отходить окраины рѣчного льда, въ воздухѣ уже слынится свистъ утиныхъ крыльевъ и видны стан утокъ, проносящіяся высоко надъ землею полетомъ ровнымъ и сильнымъ. Въ среднихъ губерніяхъ это обыкновенно бываетъ около перваго апрѣля, немногими днями ранѣе или поздиѣе, въ южныхъ – въ концѣ февраля или началѣ марта, въ сѣверныхъ — около половины, а иногда даже и въ концѣ апрѣля. Впрочемъ, иногда прилетъ начинается еще раныне, чѣмъ несомнѣнно доказывается, что причина его лежитъ въ тѣхъ условіяхъ, какія существуютъ въ странѣ, откуда летитъ птица, а не той, куда она летитъ. Бываетъ даже такъ, что еще иѣтъ ин рѣчныхъ, ин озерныхъ окраинъ, ни какихъ-либо другихъ весеншхъ водъ, а прилетъ начинается: мартовскіе утренники держатъ таяніе сиѣга, и вся прилетѣвшая птица, хотя, правда, обыкновенно въ еще очень ограниченномъ

количествѣ, принуждена искать себѣ пріюта на незамерзающихъ ручейкахъ или болотныхъ ключахъ. Здѣсь перебивается утка изо-дия въ день, пока не станетъ дружная весна, не зальють венния воды пизины рфиныхъ долинъ, перебивается въ голодф и холодф, всячески етараясь укрыться въ остаткахъ прошлогодней осоки. По вотъ зашумізін вешнія воды, поб'єжали въ шізины безчисленные ручейки изъподъ тающаго сивга, болота покрылись водой и слились съ озерами въ одну громадную нелену воды, ереди которой только мъстами поднимаются островки, поросшіе пвиякомъ или какими другими деревьями. Рано прилетавния утки оживають, вновь прилетающи продолжають прибывать все большими и большими массами, стада ихъ летятъ уже не такъ высоко, какъ прежде и уже опускаются отдыхать на мъста, гдв не боятся быть потревоженными. Въ это время пролетъ и прилеть въ самомъ разгарф, и летящія стада видны или слышны и днемъ н ночью; тв изъ нихъ, которыя спускаются отдыхать и кормиться, никогда не выберутъ въ это время глубокаго мъста, середины ръки или озера: имъ тутъ взять нечего, и потому онъ держатся вблизи береговъ, по береговымъ разливамъ, затопленнымъ дугамъ и т. п.

Проходить еще иткоторое время... Вода мало-по-малу спадаеть, мало остается льда на диб затопленныхъ болоть, на оголившихся отъ воды мъстахъ проглядываетъ уже молодая травка, и въ то же время утипыя стада разбиваются все на меньшія и меньшія партіи, все больше и больше подходять къ жизни парами. Этоть второй періодъ весенней жизни утки характеризуется тымъ, что прилеть собственно можетъ считаться оконченнымъ: болфе сфверныя особи уже прошли къ себф, на мъсть остались почти исключительно гифздовыя.

Еще итсколько дней и утки разбиваются на пары. Травка подросла уже пастолько, что уткт можно въ ней спрятаться, спльно спала вода, каждая самка съ своимъ селезнемъ занимаетъ извъстный участокъ и начинается періодъ гитадовитія и кладки янцъ, которымъ собственно и оканчивается брачная жизнь птицы.

Пногда во время пролета, иногда немпого поздиће, завернувшіе холода парушаютъ правильное теченіе весенней жизпи кряквы и отдаляютъ наступленіе посл'єдняго періода. Въ такомъ случать птица оставляетъ открытыя м'єста и перебирается въ бол'є укромные уголки: тф рфчные заливы, гдф больше деревьевъ и кустовъ, гдф, слфдовательно, больше защиты отъ вфтра, гдф теплфе. Но стоитъ только холоду кончиться, и утки опять выходятъ къ берегамъ рфкъ и озеръ сравнительно открытымъ, гдф и жируютъ пока еще цфлыми стадами. Такимъ образомъ, весенній образъ жизии утки довольно простъ

Такимъ образомъ, весенній образъ жизни утки довольно прость и отклоненія отъ него вызываются только бол'є или мен'є р'язкими изм'єненіями въ погодѣ. При дняхъ теплыхъ, хотя бы и пасмурныхъ, м'єстовыя утки, пока не разбились на пары, держатся вм'єстѣ стадичками и почти ц'ялыя сутки проводятъ въ добываніи корма. Въ среднихъ губерніяхъ такія стаїки обыкновенно бываютъ видимы на разливахъ мелкихъ р'єчекъ, которыя вскрываются раньше большихъ и

поросли по своимъ берегамъ густыми дозниковыми зарослями. Въ это время утка осторожна, и подойти къ ней трудно. При открытыхъ берегахъ она видитъ далеко и близко не подпуститъ, а если въ заверолько только етамъ можно только от принест въ лочникът от найти ее тамъ можно только случайно. Нѣсколько поздифе, когда утиныя стайки разобьются окончательно, и селезни станутъ спариваться съ утками, уже есть возможность добыть красиваго селезня, но и это можно только на разливахъ и озерахъ. Лозникъ, обрастающій берега нашихъ рѣкъ, бываетъ обыкновенно такъ густъ, что замътить утку съ селезнемъ изъ-за кустовъ на такомъ разстояни, чтобы можно было стрълять, нътъ возможности, а къ тому же на ходу производищь шумъ, заслышавши который утка вылетаетъ не въ мъру. На большихъ ръкахъ утка обыкновенно держится у берега, но опять-таки за линіей порфиныхъ кустовъ, и заслышавши что-либо подозрительное, отплываетъ на чистое мѣсто. Напротивъ, тамъ, гдѣ много маленькихъ озерковъ, постоянныхъ или временныхъ (т.-е. образовавшихся изъ застоя вешнихъ водъ и потомъ пересыхающихъ), тамъ утки не такъ осторожны, особенно когда самки начинаютъ заботиться о гибздѣ и начинаютъ хитрить, съ цфлью обмануть селезня.

Вообще говоря, весною, съ прилета, итица гораздо строже, чѣмъ позднѣе, когда обсидится, привыкнетъ къ занятымъ ею мѣстамъ. То же мы видимъ и на уткѣ. Говоря коротко, съ прилета до времени гнѣздовитія утка ведетъ сравнительно безпокойную жизнь: итица присматривается, подыскиваетъ себѣ наиболѣе удобное мѣсто для постройки гнѣзда и то плаваетъ туда и сюда по большому разливу, то перелетываетъ съ одного озерка на другое, съ одного поросшаго налочникомъ оврага къ другому.

Я не могу съ увѣренностью сказать, что утиныя пары каждогодно занимають однѣ и тѣ же мѣста, но сильно подозрѣваю, что это такъ, по крайней мѣрѣ я замѣчалъ, что на маленькихъ болотцахъ съ озерками гнѣздовье утокъ прекращалось на годъ, на два и болѣе послѣ того, какъ пріютившійся выводокъ былъ тамъ выбитъ. Да нѣтъ въ томъ и ничего удивительнаго послѣ того, какъ мы навѣрное зпаемъ относительно нѣкоторыхъ птицъ, что онѣ возвращаются къ своимъ прежишмъ гнѣздамъ.

Надо замѣтить, что мѣста гиѣздовья утокъ вообще подвержены гораздо болѣе частымъ колебаніямъ, чѣмъ мѣста гиѣздовья другихъ птицъ, напр., вальдшиена, по въ дѣлѣ распространенія утки это шраетъ далеко не такую существенную роль, какъ у другой названной птицы. Илохо приходится уткамъ только въ томъ случаѣ, когда засуха вообще выгоняетъ ихъ изъ запятыхъ ими мѣстъ или даетъ возможность забраться въ эти мѣста охотнику. "Какъ сѣрую куропатку,—говоритъ г. Вилинскій,—губитъ суровая зима, такъ утку лѣтияя засуха: чѣмъ меньше въ болотахъ воды, тѣмъ легче уничтожить утокъ. Послѣднія два лѣта (74—75 гг.) были очень сухи—утокъ били массами. Осенью прошлаго—75 г. утки (мѣстныя) держались на открытой водѣ неболь-

ними табунками, и прилеть веспой текущаго года быль самый инчтожный, и я не номню такого скуднаго года,—утки понадались редко даже въ дучинкъ утиныхъ угодьяхъ, а во многихъ болотахъ, гдъ въ прежніе годы бывало по два-три выводка –пынче пи одного. Многіе охотники думають, что на это есть какая-инбудь особая причина, миж же кажется, что причина эта ясна: пропилой осенью отлетило утки мъстной мало, а прилетъло еще меньше. Текущимъ лътомъ я постиль иткоторыя угодья и заметиль, что воды иссравненно больше, чвмъ въ проилые два года, такъ что выбить утокъ на такихъ угодьяхъ, какъ Иншима, Итушва, Аршона и Іода—невозможно, и къ осени въроятно уцфафеть больше итицы; при условін же сухого афта утка во многихъ мъстностяхъ едъдалась бы ръдкостью".—Выше я уже имълъ случай указать на то, что въ южныхъ губерияхъ утки гифздятся гораздо въ большемъ количествъ, чъмъ въ среднихъ, и притомъ гораздо болже кучно, что прямо объясняется мъстными условіями:большимъ количествомъ населенныхъ мфетъ въ центральной Россіи, но, конечно, въ видъ исключенія, гдъ есть подходящія угодья, т.-е. обишрныя поросиия у окрапиъ камыномъ и кустаринкомъ озера и болота съ чистыми водами, утки гитадятся во множествт и въ центральной Россіи. Впрочемъ, много ли кряквы или мало, а семейный быть описываемой итицы течеть своимъ чередомъ безъ всякихъ замътныхъ перемънъ.

Какъ я уже сказалъ, одновременно съ наступленіемъ настоящей весны и вывств съ окончаніемъ пролета, утки разбиваются на пары, изъ которыхъ каждая занимаетъ свой собственный участокъ. Въ высшей степени оригинальна семейная жизнь утки: это несомивниме моногамы, но вийсти съ тимъ селезень отличается такою страстностью, что совстямь не годится въ отцы семейства. Онъ не только не заботится о гитьздъ, но разоряетъ его, гдъ и когда можетъ: гитьздо для него помѣха удовлетворять его сладострастію, и потому уткѣ приходится прибъгать къ самымъ утонченнымъ хитростямъ и пускаться на всевозможныя продълки, лишь бы обмануть селезня. С. Т. Аксаковъ такъ хорошо описываетъ поведение утки въ это время, что миз не остается ничего другого, какъ привести его подлинныя слова. "Почувствовавъ во внутренности своей полноту и тяжесть, - говоритъ С. Т. Аксаковъ, — отъ множества въ разное время оплодотворенныхъ съмянъ, сдълавшихся крошечными желтками, изъ коихъ и которыя значительно увеличились, а крупнѣйшіе даже облеклись влагою бѣлка и обтянулись мягкою, но кръпкою кожицей, утка приготовляетъ себъ гнъздо въ какомъ-нибудь скрытномъ мъстъ, и потомъ послышавъ, что одно изъящъ уже отвердъло и приближается къ выходу, утка, всегда близъ удобнаго къ побъту мъста, всего чаще на лужъ или озеръ, присядеть на бережокъ, заложитъ голову подъ крыло и притворится спящею. Селезень присядеть возлъ нея и заснеть въ самомъ дълъ, а утка, наблюдающая его изъ-подъ крыла недремлющимъ глазомъ, сейчасъ спрячется въ траву, осоку или камышъ; отползетъ, смотря по

мъстности, иъсколько десятковъ саженъ, иногда гораздо болъе, поднимется невысоко и, облетъвъ стороною, опустится на землю и подползеть къ своему уже готовому ги-взду, свитому изъ сухой травы въ какомъ-инбудь кръпкомъ, но не мокромъ болотистомъ мъстъ, поросшемъ кустами; утка устелетъ дно ги взда собственными перышками и пухомъ, снесетъ первое яйцо, бережно прикроетъ его тою же травой и перьями, отползетъ на нѣкоторое разстояніе въ другомъ направленін, поднимется и, сдълавъ кругъ, залетитъ съ противоположной стороны къ тому мъсту, гдъ скрылась; опять садится на землю и подкрадывается къ ожидающему ее селезню. Ръдко случается застать его спящимъ; по большей части селезень просыпается во время отсутствія утки, которое иногда продолжается болбе часа. Проснувшись, онъ начинаетъ безпокойно звать свою дружку, торопливо озираясь и порывисто плавая по озеру или лужъ, потомъ бросится искать ее кругомъ около берега, но далеко не отходитъ, а безпрестанно ворочается посмотрѣть: не воротилась ли утка, не плыветъ ли къ нему по водѣ... что иногда случается. Утомясь своими тщательными поисками, селезень перестаетъ искать утку и начинаетъ плавать взадъ и впередъ, безпрестанно оглядываясь и покрякивая; плаваеть до тъхъ поръ, пока въ самомъ дълъ, внезапно, Богъ знаетъ какъ, откуда, воротится его дружка. Если селезень, находясь при уткв, увидитъ другого селезня, летящаго къ нимъ, то сейчасъ бросается навстръчу и непремънно прогонить, какъ имъющій болье права и причинь храбро сражаться. Если къ летящей парѣ пристанетъ холостой селезень, не нашедшій себъ еще дружки, то непремънно послъдуетъ драка съ законнымъ супругомъ на воздухѣ, сопровождаемая особеннымъ короткимъ живымъ крикомъ, хорошо знакомымъ охотнику. Видъ бываетъ живописный; оба селезня перпендикулярно повиснутъ въ воздухф, схвативъ другъ друга за шен, проворно и сильно махая крыльями, чтобы не опуститься на землю и, несмотря на всѣ усилія, безпрестанно опускаясь книзу. Побъда также, сколько я замъчалъ, оставалась всегда на сторонъ праваго. Иногда утка, чтобы усыпить селезня, употребляеть особаго рода ласку: она тихо и долго щекочетъ носомъ его шею и спину. Вотъ почему народъ, по примъненію къ себъ, думаетъ, а за нимъ повторяютъ охотники, что селезень любить искаться въ головф. Иногда утка находитъ средство уйти отъ неспящаго селезня: стоитъ ему только повнимательнъе заняться своимъ аппетитомъ или позазъваться на что-нибудьсъ неимовърнымъ проворствомъ утка пропадетъ нізъ глазъ. Но не всегда бываютъ удачны ея побъгн. Случается, что селезень примътитъ и отгадаетъ ея намъреніе, кинется за ней въ погоню, въ ту самую минуту, какъ она юркнетъ въ траву или камышъ, настигнетъ, ухватитъ носомъ за шею, вытащитъ ее на воду и долго таскаетъ и щиплетъ такъ, что перья летятъ. Вслъдъ за побоями и наказаніемъ немедленно слъдуютъ горячія супружескія ласки". — Иногда во время драки самцовъ страдающимъ лицомъ является самка, такъ г. Поляковъ разсказываетъ слъдующее: "Однажды меня среди ръки, на лодкъ, заетала кряковая утка-самка; она стремительно инденнулась въ воду и исчезла подъ вей въ изъсколькихъ шагахъ отъ меня. Оказалось, самку преслудовали два селезня, которые за ней и появились также внезанно, ища удобнаго случая поразить ударами одинъ другого. Понятно, что въ этой ехватку положение самки было самое незавидное, она была единственнымъ страдательнымъ предметомъ; каждый изъ ея сонскателей старалея нанести ей болуве сильные щинки и удары, какъ бы въ томъ расчетъ, что чей ударъ сильнуе, тому она и должна отдать себя въ распоряжение".

На этомъ можно кончить съ описаніемъ весенняго образа жизни птицы и перейти къ способамъ весенней охоты.

Самая ранняя охота на утокъ-охота на перелетахъ. Заключается она въ томъ, что охотникъ узнаетъ тъ мъста, черезъ которыя летаютъ утки вечеромъ, съ лужи на лужу или озера на озеро,-кормиться, и поджидая ихъ здъсь, стръляють въ леть. Въ ивкоторыхъ мъстностяхъ, какъ напр., въ Богодуховскомъ у., по словамъ г. Селастеншкова, крестьяне выканывають гдф-инбудь на берегахъ озера ямки и садятся въ нихъ. Нъсколько поздиве, когда утки разобьются на мелкія стадички и выбеть съ тъчъ станутъ смириве, къ нимъ уже можно подъфажать на простой тельть или охотинчыхъ дрожкахъ, при чемъ слъдуетъ брать дробь 2 и з нумеровъ, такъ какъ птица еще дика, а еще ноздиве, когда начиется жизнь парами, къ уткамъ можно уже не только подътвжать, но и подходить. Въ это время болотная трава подрастаеть настолько, что утка уже можеть въ ней спрятаться, почему и становится мен'ве осторожной. Обыкновенно еще издали удаетея зам'ятить голову селезия, который или изображаетъ изъ себя часового при своей дружкъ или же пребываетъ въ ожидании ея въ нъкоторомъ безпокойствъ. Замътивъ, что охотникъ направляется къ нему, селезень не улетаетъ, а присъдаетъ, и потому въ большинствъ случаевъ его приходится стрълять въ летъ. Само собою разумвется, если вмъстъ съ селезнемъ будетъ найдена и утка, никто изъ порядочныхъ охотниковъ ее бить не станетъ. С. Т. Аксаковъ описываетъ привычки кряквы въ это время такимъ образомъ: "Весна становится часъ отъ часу все теплъе, и полая вода сливаетъ. Небольния стан кряковыхъ утокъ окончательно разбиваются на пары, понимаются и дѣлаются смириће, особенно потому, что подрастетъ трава, и уткамъ можно прятаться въ ней. Селезень, сладострастнъйшій изъ самцовъ, не отходитъ отъ утки ин на шагъ, не разлучается съ ней ни на минуту, ни за что прежде ея первый не слетить съ м'яста. Иногда утка полощется въ какой-нибудь лужѣ или щелочетъ носомъ въ жидкой грязи, а селезень, какъ часовой, стоптъ на берегу пли на кочкѣ; охотникъ подътважаетъ къ нему въ мтру, но утка не видитъ или не замтиаетъ инчего; селезень пошевеливается, повертывается, покрякиваетъ, какъ будто подаетъ ей голосъ, ибо видитъ опасность, но утка не обращаетъ

вниманія; одинъ онъ не летить прочь,—и мѣткій выстрѣлъ убиваетъ его наповаль. Утка улетаеть, не показывая никакого участія къ убитому селезню. Совсѣмъ другое бываетъ, когда охотникъ какъ-нибудь убьетъ утку (хотя онъ все-таки выбираетъ селезня): селезень не только будетъ летать кругомъ охотника, не налетая, впрочемъ, слишкомъ близко, но даже итсколько дней сряду станеть колотиться около того мъста, гдъ потерялъ дружку. Въ это время уже нетрудно подъъзжать къ разсъяннымъ парамъ кряковыхъ утокъ и часто еще удобиве подходить или подкрадываться изъ-за чего-нибудь: куста, берега, пригорка, пбо утка, замышляющая гивздо или начавшая нестись, никогда не садится съ селезнемъ на открытыхъ мъстахъ, а всегда въ какомънибудь овражкт, около кустовъ, болота, камыша, или нескошенной травы: ей надобно обмануть селезня, несмотря на его бдительность, надобно спрятаться..."—Позднве, когда утки сядуть на яйца, а селезни еще не забьются въ крѣпь, слѣдовательно, до начала ихъ линьки, можно охотиться за селезнями, собпрающимися въ небольшія стадички, какъ раньше производилась охота за селезнями спарившимися, но эта охота обыкновенно бываетъ недолговременна, такъ какъ настоящему охотнику скоро надобдаетъ, а промышленникамъ не приноситъ особыхъ выгодъ. Совсѣмъ не то надо сказать о чисто промысловой весенней охотъ за утками изъ шалаша съ круговой уткой. Охота эта производится въ самый пролетъ и перелетъ и такъ хорошо описана г. Маракуевымъ для Ростовскаго озера, что миз остается только привести его слова, по крайней мъръ для Тульской губ. я не могу привести никакихъ дополнительныхъ свъдъній, касающихся самой охоты.

"Лишь только весною начнутъ показываться проталины,--говоритъ г. Маракуевъ, – а на ръкахъ и озеръ небольшия закраинки, каждый охотникъ-промышленникъ спъшитъ занять свое излюбленное, насиженное мъсто и пока еще не прилетъли утки, устроить на немъ шалашъ. Устройство шалаша до прилета птицы, конечно, не есть непремѣнная необходимость, но оно предпочитается на томъ основании, что птица, прилетъвъ и увидавъ уже готовый шалашъ, скоро къ нему присматривается, привыкаетъ къ нему, считая его, в фроятно, за какойлибо кустъ, и впослъдствии вовсе его не боится; напротивъ того, если птица уже прилетъла и, приставъ въ неизвъстномъ районъ, услъла освоиться въ немъ, то, не замѣтивъ ранѣе въ данномъ мѣстѣ шалаша, впоследствии, когда такой шалашъ будетъ поставленъ, станетъ относиться къ нему въ высшей степени недовърчиво, будетъ держаться отъ него въ отдаленін, не приближаясь на разстояніе выстрѣла, да н селезень, несмотря на всю свою весеннюю горячку, хотя и идетъ къ выставленной около такого шалаша круговой утків, но старается въ такомъ случав състь отъ нея подальше и подплываетъ къ уткв осторожно, частью пыряя, а шюгда, зам'ятя обманъ, и вовсе къ ней не

"Такъ какъ озеро не векрывается довольно долго (векрытіе его происходить обыкновенно въ половинѣ апрѣля), то мѣсто для поста-

новки шалаша выбирается первоначально или на берегу закрашны, или на берегу какого-либо весенияго разлива, а если охотятся съ лодки, то и на неглубокомъ разливъ, примыкающемъ къ озеру. Во всякомъ случать при охотть съ берега избранное мъсто должно удовлетворять двумъ условіямъ: і) разливъ передъ шалашомъ долженъ быть неглубокъ (папр., не выше колѣнъ), для того чтобъ охотшикъ безъ труда могъ достать убитую дичь; 2) чтобъ весениее теченіе воды было въ этомъ мфстф, по возможности, тихо, ппаче при быстромъ теченін, пока охотникъ успѣетъ вылѣзть изъ шалаша и по колѣші въ водѣ добраться до убитаго селезия, его весьма легко можеть унести теченіемъ на такое разстояніе, что охотнику придется проститься съ добычей, тъмъ болъе что при охотъ съ берега додка почти инкогда не употребляется. Устройство такихъ береговыхъ шалашей въ нашей мъстности вездъ одинаково и состоитъ въ слъдующемъ: на избранномъ и, по возможности, сухомъ мъстъ втыкаются крестообразно четыре или шесть хворостинъ и верхушки двухъ противоположныхъ изъ шихъ сгибаются вмъстъ и связываются кръпкой мочалой, вслъдствіе чего отъ совокупности связанныхъ и перекрещивающихся между собою верхушекъ и образуется сводъ; затъмъ внутри этого сводообразнаго остова шалаша, наприм., на аршинъ отъ земли, помѣщается обручъ, который и привязывается къ хворостинамъ. Такой обручъ им'веть двоякое назначеніе: во-1-хъ, онъ служить распоркой остову шалаша, заставляя хворостины держаться въ извѣстномъ другъ отъ друга разстоянін, всл'ядствіе чего и самый шалашъ пришимаеть впоследствін довольно правильную куполообразную форму, и, во-2-хъ, служить для прицела, такъ какъ охотникъ, выцеливая дичь, кладетъ стволъ ружья на этотъ обручъ, какъ на подставку или сошки, чемъ и достигается върность выстръза. Наконецъ, когда остовъ готовъ, его обтыкаютъ со встхъ сторонъ еловымъ или сосновымъ лапникомъ; первый, впрочемъ, предпочтительнее, такъ какъ овъ плотиве прилегаетъ къ остову шалаша, вслъдствіе чего и самый шалашъ менфе сквозитъ; иногда, впрочемъ, для того чтобъ шалашъ былъ плотнѣе и не очень просвъчиваль, а равно для того, чтобъ въ немъ не такъ продувало, что весьма важно, потому что во время подобнаго рода охоты приходится просидѣть цѣлую ночь напролетъ иногда при холодномъ вътръ, а зачастую подъ дождемъ и снъгомъ, -- по всей внутренней окружности шалаша пом'ыцаются стойкомъ пучки соломы, которые прикръпляются къ обручу, образуя въ иныхъ мъстахъ небольшія отверстія для стрѣльбы. Въ такомъ видѣ шалашъ совершенно готовъ.

"Лишь только начнутъ показываться прилетныя утки и вообще всякая прилетная дичь, охотникъ, одъвшись въ полушубокъ и захвативъ съ собою криковую утку, кружки, топорикъ и прочія необходимыя принадлежности охоты, идетъ на свої весенній промыселъ; опъ уходитъ обыкновенно къ вечеру, разсчитывая время такъ, чтобъ уситъ състь въ шалашъ незадолго до солнечнаго заката. Придя на мъсто и осмотръвъ шалашъ, онъ первымъ дъломъ пройдетъ по разливу къ

тому м'єсту, на которомъ предполагаетъ выставить утку, для того, чтобъ узнать глубину воды; затъмъ сообразно съ этимъ выбираетъ еоотвътствующей длины коликъ съ насаженнымъ на немъ наглухо кружкомъ; далъе надъваетъ на лапу утки опутинку **) и, взявъ кружокъ и топоръ, отправляется въ воду, гдв на разстояни шаговъ 15—20 отъ шалаша втыкаетъ палку съ кружкомъ, надѣвъ па нее предварительно берестяное кольцо опутинки, и вбиваетъ колъ въ дно разлива настолько, чтобъ площадка кружка едва только покрывалась водой, и пускаетъ утку на воду. Усадивъ такимъ образомъ утку, охотникъ заряжаетъ свое, по большей части одноствольное, ружье и садится въ шаланъ. Хороная и привычная круговая утка (старка) не заставить себя долго ждать: очутившись среди привольнаго разлива и по своей утиной привычкъ хлебнувъ раза два свъжей водицы, а затъмъ пополоскавшись, она усаживается на кругъ и внимательно осматривается; едва до ея тонкаго слуха долетить голосъ дикой утки или селезия или ея зоркій глазъ завидитъ вдали летящихъ дикихъ ея родичей, какъ она начинаетъ кричать. Спачала, въ особенности же съ перваго раза, утка кричить мало и какъ бы нехотя, а больше занимается добываніемъ себѣ свѣжаго подводнаго корма, такъ что охотшку, для того чтобъ заставить ее кричать, весьма часто приходится манить ее свистомъ, на который утка начинаетъ тотчасъ же откликаться. Впрочемъ, вначалѣ, съ прилета, и дикія утки летятъ на ея крикъ неходко; когда же погода станетъ теплъе и начнется валовой прилетъ и пролетъ, когда поминутно надъ головою будутъ проноситься со свистомъ стан летящей птицы, круговая утка входитъ въ азартъ и начинаетъ кричать, почти не переставая, въ продолженіе всей вечерней зари и вилоть до тъхъ поръ, пока совершенно не стемиветь и въ воздухв мало-по-малу не смолкиетъ птичій концерть; съ наступленіемъ утренней зари снова начинается та же исторія. Не только холостой, но и парный кряковной селезень, находясь въ это время въ полномъ разгаръ полового влеченія, заслышавъ азартный крикъ утки, мигомъ несется къ ней и если еще не путанъ, то опускается въ педалекомъ отъ нея разстоянін и вплавь катитъ къ ней на всъхъ парусахъ, песмотря ин на какой вътеръ и волны. Это-самый удобный для охотника моментъ: выставивъ чрезъ отверстіе шалаша дуло ружья и положивъ стволъ на обручикъ, онъ быстро начинаеть цълить; пройдеть какихъ-нибудь нъсколько секундъ, и красавецъ селезень, пораженный мъткимъ выстръломъ, затренещется въ предсмертной агонін; впрочемъ, шюй, какъ говорятъ охотники, "бывалый" селезень ловко избътаеть такой незавидной участи; такой сенезень сразу съ налета опускается къ самой уткъ и, пользуясь тъмъ, что она не совствить свободна, быстро начинаетъ топтать ее, а заттямъ,

^{*)} Опутинкой называется сплетенная въ три пряли изъ конскаго волоса бечевка; однимъ концомъ она прикръпляется къ берестяному кольцу, а другимъ продівается сквозь кожаную петлю, называемую башмачкомъ, который и надъвается на лапку утки.

удовлетворивъ своей страсти, тотчасъ же венархиваетъ и удетаетъ; въ такомъ случат охотнику остается проводить его глазами, если только онъ не ножелаетъ рискнуть задъть выстриломъ свою утку и тъмъ но большей части испортить ее въ конецъ".

Ипогда, что дълается въ Рязанской и Тульской губ., при охотъ съ круговой уткой дикихъ утокъ не етръляютъ, а ловятъ сильями, для чего сильями или окружають кругь или же, "если вокругь утки находится затопленный тростникъ, то силья прикрапляются къ нему на линін соединенія его съ водой". — Чтобы покончить съ охотой на криковичю утку, остается сказать итсколько словъ о самой уткть, которую называють также тульской, потому будто что она впервые выведена въ Тулъ. Отличительная черта этой утки состоитъ, какъ извъстно, въ томъ, что, завидъвъ или заслынавъ дикихъ утокъ, она начинаетъ пеумолчно кричать, приманивая къ себф дикупть своимъ крикомъ. Какъ выведена эта порода — преданій не сохранилось, по несомивнно только одно, что криковная утка отличается отъ обыкновенной домашней, и владъльцы криковныхъ утокъ тщательно берегутъ ихъ отъ смъненія еъ простыми доманними утками. Напротивъ, что касается смъщенія криковной утки съ кряквой, то его допускаютъ охотно, и нотому, кажется, можно предполагать, что тульская, или криковная, утка выведена искусственнымъ подборомъ отъ доманней утки и дикаго селезня, что поддерживается постояннымъ притокомъ новой крови (спаривашемъ криковныхъ утокъ съ дикими селезиями). Отъ простой домашней утки круговая отличается клювомъ, который у круговой утки гораздо короче и шире, и желтаго цв'ята, только ноготокъ и пятно на хребтъ черное. Цъна круговой утки, смотря по ея достопиству, колеблется отъ 5 до 8 рублей. Иногда вм/сто круговой утки беруть для охоты изъ шалаша простую домашнюю, по последняя очень молчалива, и охота на нее пдеть неудачно. Съ хорошей криковной уткой въ теченіе весны можно добыть далеко за 50 селезней, что, конечно, совершенно окупаетъ и самую круговую утку и ея содержаніе.

Упомянутая выше охота на перелетахъ, благодаря мѣстнымъ условіямъ, иногда пріобрѣтаетъ особенный характеръ, пменно въ случаѣ спуска прудовъ, которые, напр. въ Подольской губ., спускаются обыкновенно одинъ разъ въ каждые три года. "Это дѣлается очень просто, — говоритъ г. Давидовичъ; — поперекъ плотины прорываютъ нѣсколько канавъ, и такимъ образомъ вся или большая частъ воды уходитъ, а дно пруда обнажается. Спуски устраиваются у насъ арендаторами прудовъ въ тѣхъ видахъ, что будто бы періодическое обнаженіе дна способствуетъ росту и размноженію рыбы, а также мѣшаетъ презмѣрному зарастанію дна. Какъ бы тамъ ни было, но спускъ обнажаетъ большую часть дна, и если только спущенъ большой прудъ, то массы болотной и водяной дичи летятъ на его грязное, тинистое дно, гдѣ онѣ находятъ и безопасный пріютъ, и обиліе пищи. Я назвалъ этотъ пріютъ безопаснымъ, потому что спущенный прудъ предзваль этотъ пріютъ безопаснымъ, потому что спущенный прудъ предзвальна протоком при предзвальна при предзвальна при предзвальна при предзвальна при предзвальна предзвальна

ставляеть море грязи, доступное только для птицы; но если человѣкъ или собака попали въ это вязкое море, то гибель ихъ неизбѣжна: говорять, у насъ бывали такіе случаи... Послѣ заката солнца все кочующее населеніе пруда приходить въ движеніе: утки и гуси съ окрестныхъ прудовъ летятъ на спускъ, и въ это время начинается охота. Она производится обыкновенно цѣлой компаніей стрѣлковъ, которые растягиваются шеренгой въ камышѣ или въ прибрежныхъ кустикахъ и бомбардируютъ утокъ, снующихъ туда и сюда. Иногда напутанныя утки держатся такъ высоко, что охотники совершенно безплодно нагрѣваютъ небо и только одному или двумъ счастливцамъ удается спустить съ вышины полновѣснаго гуся или утку въ виду цѣлой компаніи товарищей, и они долго будутъ помнить и разсказывать про эти выстрѣлы. Но какъ бы ни была неудачна стрѣльба на перелетѣ, охотники возвращаются домой очень довольные: "хоть не убилъ ничего, но по крайней мѣрѣ настрѣлялся!"—утѣшаетъ себя каждый.

Бьютъ утокъ весною съ подъйзда въ челнахъ, но эта охота очень недобычлива и мало практикуется.

Тогда какъ охота съ криковной уткой не можетъ быть названа исключительно промысловой, потому что такъ охотятся часто и настоящіе охотники, охота на манку и перевъсами практикуется исключительно промышленниками.

Первый способъ охоты распространенъ очень нироко, по крайней мъръ онъ употребляется въ Могилевской, Вятской, во многихъ центральныхъ губерніяхъ и, въроятно, также на югъ, при чемъ одни промышленники манятъ селезней, подражая голосу утки, просто задувая въ кулакъ, другіе при помощи особаго манка. Самая охота пронзводится очень просто: охотникъ садится или за кустъ, или въ шалашъ и затъмъ начинаетъ манитъ. Для успъха охоты на водъ на разстояніи въ предълахъ выстръла помъщаются чучела утокъ, часто поражающія своей грубостью и все-таки достигающія цѣли, такъ какъ цикія утки охотно подсаживаются къ нимъ.

Говоря о манкѣ вятскихъ промышленниковъ, г. Бѣловъ описываетъ ее такъ: "манятъ они селезней просто въ кулакъ, при чемъ большой палецъ нѣсколько отгибается внизъ, а указательный и средній прижимаются не очень плотно, такъ что образуется родъ конической трубки. Входъ въ трубку, т.-е. мякоть большого и указательнаго пальцевъ, смачивается языкомъ и кулакъ подносится къ губамъ, сложеннымъ почти такъ, какъ при игрѣ на охотничьемъ рогѣ,—и при задуваніи получается звукъ, чрезвычайно нохожій на крикъ утки. Но такъ какъ крикъ утки двухтонный, то перемѣна тоновъ достигается откидываніемъ мизинца и двухъ сосѣдиихъ съ нимъ пальцевъ, при окончаніи періода манки сразу полуоткрытіемъ кулака.

"Съ неменьшимъ, пожалуй, при наблюдательности усивхомъ можно манить утокъ не въ кулакъ, а манкомъ, —разумвется, не выписнымъ, налаженнымъ для одной какой-либо породы утокъ, а самодъльнымъ и очень простымъ. Приготовляется онъ изъ дерева. Двухверин-

ковая (или съ небольшимъ) деревяника обтачивается въ видъ нетолстаго конуска съ закругленной вершинкой, раскалывается вдоль, внутри каждая половина выбирается лодочкой, такъ что, когда онъ сложены, образуется трубка, скръпленная металлическими кольцами, двумя неподвижными и въ вершинъ одинмъ подвижнымъ. Края расколотыхъ ноловинокъ къ той же вершинъ сръзываются наискосокъ, такъ что при передвижении кольца то болъе сжимаются, то болъе расходятся. Внутрь трубки вставляется язычокъ, выръзанный изъ старой жестянки изъ-нодъ пороха. Двигая подвижное кольцо, т.-е. распуская или сдвигая половинки манка и тъмъ давая большую или меньшую свободу для вибраціи язычка, а также меньше или слабъе прихватывая кошцы манка зубами, получается измѣненіе звука манка. Къ концу его въ видъ раструба прикладывается опять-таки кулакъ, и отъ сжатія или откидыванія нальцевъ получается необходимая яркость звука".

Охота на манку производится какъ съ прилета утокъ, когда онъ еще не разбились на пары, такъ и ноздиће, когда самки съли на яйца и селезни до начала линьки бродять безъ дружекъ. Лучшіе часы для охоты—вечернія и утренція зори.

Переходя теперь къ ловлъ утокъ перевъсами, надо прежде всего сказать, что она имбетъ мѣсто въ лѣсной области. Такъ, въ Тобольской губ, главный предметь птичьяго промысла составляеть утка, которую здісь довять тысячами, по именно довять, а не стрівдяють. Въ Березовскомъ округф у каждаго хозявна есть просъки или перевъсы, т.-е. узкія просъки въ лъсу между озерами, притоками главной ръки и вообще близъ воды, и здъсь въ концъ просъки на очень высокихъ, въ уровень съ лъсомъ, шестахъ разставляется сѣть, которая спускается и поднимается на блокахъ. Весною, когда самцы утокъ зорями престъдуютъ самокъ или же когда утки просто перелетаютъ съ м'яста на м'ясто въ поискахъ за кормомъ, он'я обыкновенно устремляются на свътъ-въ просъки и такъ какъ летять низко, то и налетають на съть. Охота производится такимъ образомъ: охотинкъ приходитъ къ съти за нъкоторое время до начала перелетовъ, поднимаетъ ее и терифливо ждетъ, когда утки на своихъ перелетахъ ударятся въ нее. Тогда ловецъ быстро опускаетъ съть, вмѣстѣ съ которой утки падаютъ внизъ, тутъ же спѣшно свертываетъ имъ головы или "закусываетъ головку" и снова поднимаетъ съть. Въ каждый пріемъ попадаетъ не менъе 3-4 утокъ, а пногда при большей численности пролетающаго табуна и до 30. Вечеромъ, на зарѣ, такая охота длится часа $1^{1}/_{2}$ —2, ночью прекращается, а на утренней зарѣ, когда снова происходитъ летъ утокъ, опять возобновляется на тотъ же срокъ.

Добытыя такимъ способомъ и варварски умерщвленныя утки идутъ въ "засолъ", т.-е. ихъ ощипываютъ, потрошатъ (далеко, впрочемъ, не всегда), складываютъ въ кадки и бочки и засаливаютъ съ тѣмъ, чтобы лѣтомъ такими "консервами" кормить рабочихъ. Засоленная утка стоитъ одну копейку, но для того, чтобы питаться такимъ мясомъ, всегда вымоченнымъ и невкуснымъ, а иногда и совершенно

испорченнымъ, нужна крайняя неприхотливость рабочихъ, большею частью изъ остяковъ, на туу.

Перевъсы считаются въ Сибпри недвижимой собственностью, переходять отъ отца къ дътямъ и зачастую упоминаются въ завъщаніяхъ.

Вотъ вст извъстные мит способы весенней охоты за утками. Какъ видно изъ сказаннаго, періодъ, въ теченіе котораго весною пронзводится охота за утками, непродолжителенъ, но тъмъ не менте способы охоты довольно разнообразны, если взять и собственно охотничье добываніе и промысловое.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ЛЪТО И ОСЕНЬ.

Кряква очень неприхотлива въ выборъ мъста для своего гитада: лишь бы можно было укрыться и вода не была очень далеко — вотъ и все, что ей надо; но непосредственной близости воды для гиѣзда кряква даже избътаетъ, въроятно, изъ боязни селезня, который сторожитъ ее здѣсь. Такимъ образомъ кряква гнѣздится по всѣмъ прѣснымъ водамъ подъ кустами, подъ деревьями, въ камышѣ, кугѣ, травѣ, даже въ хлъбахъ, дуплахъ вербъ и въ видъ исключения въ брошенныхъ гивадахъ воронъ, сорокъ, хищныхъ птицъ и т. д. Если гивадо устранвается на землъ, оно вовсе не представляетъ собою безпорядочной кучи растительнаго матеріала, какъ пишутъ нѣкоторые авторы; напротивъ, оно довольно искусно свивается изъ сухой травы и листьевъ камыша и выстилается сначала болбе нѣжнымъ растительнымъ матеріаломъ, а потомъ, когда кладка янцъ окончена и начинается насиживаніе, устилается еще и пухомъ. При сходствъ мелкихъ ящъ кряквы съ яйцами шилохвости пухъ служитъ очень хорошимъ признакомъ для опредъленія того, какой уткъ принадлежитъ гитвою у кряквы пухъ съ едва замътными бъльми вершинками, у шилохвости, напротивъ, бълыя вершинки развиты хороню.

Число ящъ кладки колеблется обыкновенно между 8 и 12, но иногда кладка содержитъ 14 и даже 16 ящъ. Окраска ихъ измъняется отъ зеленовато-охристой до блъдно-охристо-зеленой, иногда они совсъмъ безъ блеска, иногда съ слабымъ блескомъ. Но мъръ того, какъ высиживаніе продолжается, зеленоватая окраска все болъе и болъе замъняется блъдно-буроватой. Длина ящъ колеблется между 2,5 и 2,2 д., поперечникъ между 1,7 и 1,5 д. Утка сидитъ на яйцахъ очень кръпко и сходитъ съ гиъзда не болъе одного раза въ сутки, чтобы нохватать поблизости какого-нибудъ корма. Но и этого достаточно, чтобы ея въчные враги сумъли воснользоваться ея отсутствіемъ; не говоря уже о селезиъ, который нока еще не примирился съ уходомъ дружки, непремънно разобъеть яйца, если найдетъ ихъ, утку подсте-

регають и вороны, и сороки, и болотные лупи, оть которыхь ей чрезвычайно трудно укрыться. Затьмъ, смотря по мъстности, для нея въ это время онасны лисицы, хорьки, дикія и одичавния конки и т. д., и потому потеря уткою первой кладки вовее не ръдкость. Однако больной бъды въ этомъ еще иътъ: потерявни первыя яйцы, утка большею частно безъ труда онять сходится съ какимъ-шобудь селезнемъ, несется вновь и на этотъ разъ ведетъ себя еще осторожитье, чтыть прежде.

Насиживаніе продолжается отъ 3 до 4 недівль, смотря по погодів и потому какъ часто и надолго ли оставляла утка яйца. Такимъ образомъ въ южной Россіи, гдв полныя не насиженныя кладки находятъ съ начала до конца анръля, утята выводятся въ разныхъ числахъ мая, въ средней Россіи—не ранъе конца этого мъсяца, въ съверной—еще поздиве. Только что выдушивниеся утята, какъ только обсохнуть, переводятся маткой на ближайшую воду, при чемъ въ трудно проходимыхъ мъстахъ она переноситъ ихъ въ клювъ. Точно такъ же въ клювъ перепоситъ утка дътей на воду и въ томъ случать, если гитвадо расположено высоко надъ водою. Утята очень бойки съ нервыхъ же часовъ своей жизни, и маткъ не стоило бы особеннаго труда сохранить своихъ дътей, если бы ихъ не преслъдовали самые разнообразные враги. Но утятамъ угрожаютъ и хищныя итицы, и разные звъри, поджидающіе выводки на берегу, и рыбы, между которыми сомы п щуки, при ихъ прожорливости, можетъ быть, являются вообще самыми опасными врагами. Чтобы сохранить дътей, утка почти не показывается съ ними на открытыхъ мъстахъ: чаще всего она держится или въ камышахъ, или въ густой береговой травъ, или среди самыхъ корней прибрежныхъ кустовъ и деревьевъ. Если же выводокъ открытъ, въ такомъ случат утка совершенно позабываетъ о личной безопасности: она нарочно выплываетъ на открытое мъсто и здъсь съ тревожнымъ покрякиваньемъ начинаетъ метаться туда и сюда, точно больная или раненая, вмфстф съ тфмъ удаляясь мало-по-малу отъ того мфста, гдф спрятаны ея дъти. Убить ее въ это время ничего не стоитъ, хотя при выстрѣлѣ она и пробуетъ спастись ныряньемъ.

По мѣрѣ того, какъ утята подрастаютъ, ихъ охотничій районъ все болѣе и болѣе расширяется, и въ понскахъ за кормомъ, особенно за червями и улитками, они не только выходятъ на берегъ, но и довольно далеко отходятъ отъ воды. Хотя первыя 4—5 недѣль своей жизни утята совсѣмъ не могутъ летать, однако въ это время они далеко не безпомощны сами по себѣ: они съ такой ловкостью и быстротой пробираются въ густой травѣ, что если только не замѣчены на близкомъ разстояніи, всегда сумѣютъ проскользнуть къ водѣ. При такомъ передвиженіи утята крайне комичны съ ихъ совершенио вытянутыми и низко опущенными шейками и неуклюжимъ тѣльцемъ, на низкихъ ножкахъ, по бокамъ котораго выдаются небольшія крылышки. Скорѣе можно сказать, что они ползутъ, нежели бѣгутъ, почему въ иѣкоторыхъ мѣстахъ ихъ и называютъ "ползунами". На водѣ утята

умфють отлично прятаться пыряя и потому тамъ, гдф ифтъ сомовъ и щукъ, они довольно безопасны отъ преследования другихъ враговъ.

Утята пачинають летать спустя недѣль шесть по выклюнутіи, но спачала летають очень плохо и лишь на пебольшомъ разстояніи, предпочитая искать себѣ защиту въ прятаныи. Слѣдовательно, въ южной Россіи первыхъ летныхъ молодыхъ можно встрѣтить не ранѣе половины іюня, обыкновенно въ концѣ этого мѣсяца; а въ центральныхъ губерніяхъ утята и въ началѣ іюля летаютъ еще очень плохо. Несмотря на то, что въ такомъ возрастѣ они могутъ отлично обойтись безъ матки, послѣдияя никогда не оставляетъ ихъ, и выводки осенью закладываютъ основаніе утиныхъ стай. Если по какой-нибудь причинѣ матка погибла прежде чѣмъ утята выросли, послѣдніе нерѣдко пристаютъ къ другому выводку и держатся съ нимъ вмѣстѣ пока не выростутъ. Такимъ образомъ, въ заботахъ о дѣтяхъ у матки проходитъ все лѣто и она даже въ тяжелое для себя время—время линьки—не оставляетъ дѣтей.

Что касается селезней, то какъ только утки сядутъ на яйца, селезии собираются небольшими стайками и бродятъ въ поискахъ за кормомъ, ни теперь, ни позднѣе не принимая никакого участія въ семейной жизни. Сначала они щеголяютъ въ своемъ брачномъ нарядѣ, но когда самки сѣли на яйца, селезни начинаютъ линять. Въ это время они сбрасываютъ лишь мелкое перо, сохраняя рулевыя и маховыя, и на лѣто одѣваются въ такой же сѣрый нарядъ, въ какомъ всегда ходятъ утки. Въ разгаръ линьки селезни мало видимы: хотя, благодаря сохраненію маховыхъ, они въ это время летаютъ не хуже, чѣмъ рапьше, однако, забираются въ крѣпи и ведутъ скрытый образъ жизии, рѣдко выбираясь на открытыя мѣста. Линючіе селезни очень худы какъ отъ весеннихъ похожденій, такъ и отъ линьки, и можетъ быть эта слабость птицы и дѣлаетъ ее осторожной.

Въ своемъ невзрачномъ костюмѣ селезни остаются недолго — до августа; въ концѣ августа у нихъ уже начинается вторая линька, при которой смѣняется не только мелкое перо, но и маховыя съ рулевыми, достаточно износившияся за годъ, и въ половинѣ октября можно уже встрѣтить старыхъ селезней въ новомъ нарядѣ, который, сохраняясь до весны, называется поэтому, хотя и неправильно, брачнымъ. Молодыя итицы смѣняютъ свое первое оперене нѣсколько позднѣе взрослыхъ селезней, но къ концу октября и онѣ усиѣваютъ перелинять совершенно. Взрослыя самки начинаютъ линять послѣ того, какъ дѣти иѣсколько подросли, и оканчиваютъ свою линьку въ то время когда самцы начинаютъ линять вторично. Такимъ образомъ, къ началу осени одиѣ утки уже перебрались, другія еще перебираются, но въ октябрѣ линька кончается если не у всѣхъ, то у огромнаго большинства, пными словами,—къ этому времени всѣ готовы къ отлету.

Съ половины йоля на югѣ, съ августа въ средней Россіи утки начинаютъ совершать правильные перелеты зорями на кормежку, о чемъ я уже упоминалъ въ общей характеристикѣ кряквы. Въ это

время утки любять посъщать хлѣбныя поля, особенно ноля гречи, проса, гороха и овса, и если утокъ много, а поля небольшія, эти итицы могуть нанести хозяевамъ весьма существенный ущербъ. Подобно гусямъ, он в очень мнуть и путають хлѣбъ, такъ какъ ѣдятъ всегда спѣшно, вырывають пучки стеблей другъ у друга, лѣзутъ одна на другую и т. д. Позднъе, когда хлѣбъ связанъ и собранъ въ копны, утки раздергивають даже сноны, а когда поля совсѣмъ убраны, довольствуются тѣмъ, что подбираютъ осыпавшееся зерно.

Тамъ, гдѣ утки не поважены летать въ хлѣба, или гдѣ мѣстность этому не благопріятствуеть, онѣ на почь летають кормиться на озерца и чистую воду среди болотистыхъ зарослей; на большихъ озерахъ нерелетаютъ съ того мѣста, гдѣ прятались днемъ, въ болѣе кормиыя заводи, но вообще утка къ ночи всегда перемѣняетъ мѣсто и кормится тамъ, гдѣ ея не было днемъ.

Эти перелеты наблюдаются и въ приморской береговой зонѣ, но здѣсь они пріобрѣтаютъ особый характеръ. Такъ, въ мѣстностяхъ, лежащихъ бколо Финскаго и Ботническаго заливовъ, кряква гиѣздится вдали отъ моря, но съ половины іюля, т.-е. когда выводки начнутъ летать, опять появляется на побережьѣ и по мѣрѣ того, какъ лѣто нодходитъ къ концу, скоиляется здѣсь все въ большемъ и большемъ количествѣ. Съ половины августа утки начинаютъ совершать здѣсь правильные перелеты, такъ какъ день эти птицы проводятъ въ открытомъ морѣ, а на ночь прилетаютъ въ прибрежныя бухты. Слѣдовательно, подъ вечеръ утки летятъ съ моря къ берегу, а утромъ обратно, отъ берега въ море. Въ октябрѣ кряква держится только по прибрежью, но уже не такъ многочисленна, какъ была раньше; когда же море у береговъ покрывается льдомъ, кряквы отлетаютъ.

И вообще, что касается отлета кряквъ, то можно сказать, что онъ связанъ не столько съ уменьшеніемъ корма, сколько съ наступленіемъ заморозковъ. Уже въ средней Россіи пролетъ съверныхъ утокъ отдъленъ довольно рѣзко отъ отлета мѣстныхъ, а въ южной это выражено и еще рѣзче: тогда какъ, напр., въ Харьковской губ. осенній пролетъ бываетъ около середины октября, отлетъ мѣстныхъ прямо зависитъ отъ состоянія водъ и происходитъ вообще въ ноябрѣ. При мягкихъ зимахъ, когда на рѣкахъ остаются большія полыны, даже въ средней Россіи можно встрѣтить на нихъ оставшихся зимовать утокъ, а въ южной Россіи, гдѣ вода, при такихъ зимахъ, то замерзаетъ, то оттаиваетъ, число такихъ зимующихъ особей еще больше. Однако, про большую часть утокъ надо сказать, что когда рѣки и озера южной Россіи замерзнутъ, онѣ переселяются на лиманы, а потомъ и въ море, гдѣ зимуютъ у береговъ.

Въ заключение этого описания образа жизни кряквы я не могу не остановиться на причинахъ, ведущихъ за собою уменьшение ея количества, такъ какъ то, что будетъ сказано о кряквѣ, относится и къ большинству охотничыхъ и промысловыхъ птицъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ прибавить, что во всемъ существенномъ я въ этомъ отно-

шенін вполн'ї согласенъ съ С. Н. Алфераки, который также коснулся разнообразныхъ враговъ кряквы въ своей стать в объ этой птип'ь.

Причины, вліяющія на уменьшеніе количества кряквы, двухъ родовъ: однѣ общія, другія частныя. Къ общимъ надо отнести такія, какъ измѣненія въ характерѣ мѣстности, пеожиданно рѣзкія измѣненія въ состояніи погоды; къ частнымъ — преслѣдованія со стороны различныхъ враговъ.

Объднъніе мъстности водою, въ свою очередь обусловливаемое разнообразными причинами, составляетъ зло, распространившееся на большую часть нашего отечества. Мелфють рфчонки, рфки, пересыхаютъ озера и болота и въ связи съ этимъ утки липаются тъхъ м'єсть, которыя служили имъ для гн'єздовья. Какъ ни мало прихотлива эта птица на м'всто и на кормъ, но вода ей безусловно необходима, и потому уменьшение проточныхъ и стоячихъ водъ всегда влечетъ за собою уменьшеніе количества утокъ. Пногда въ какія-нибудь 5—10 лѣтъ число утокъ сокращается до минимума и тамъ, гдф эти птицы прежде держались десятками паръ, едва найдешь одну-двъ. Но я чаще уднвлядся не уменьшенію числа утокъ, а тому, какъ онъ вообще могли удержаться въ прежней мъстности. Ръчонка почти пересохла, кусты лозника отчасти повырублены, отчасти посохли, кой-гдв уцвлвли небольшія заводи съ палочникомъ, казалось бы никакой порядочной уткъ не придетъ въ голову поселиться въ такой мъстности. Нътъ, смотришь—одна, другая пара удержалась и даже ухитрилась благополучно вывести дътей. Конечно, очень много значитъ то, что утка придетаетъ рано и проводитъ свою брачную жизнь, когда воды еще относительно много благодаря таянію снізга. Можеть быть потомъ птиці и самой странно оказаться въ слишкомъ сухопутной обстановкѣ, но дѣло сдѣлано: дъти вывелись, надо ихъ укрыть и вырастить, а уже тамъ и летъть на водный просторъ.

Что касается измѣненій въ состояніи погоды, то они уже далеко не такъ гибельны для утокъ, такъ какъ рѣзкія измѣненія бываютъ не часто. Однако, хорошо извѣстная гибель утокъ въ февралѣ 1854 г. на Сивашѣ, гдѣ ихъ послѣ теплой погоды захватила сначала буря, потомъ морозъ до 11⁰ и наконецъ снѣгъ, ясно показываетъ, съ какими невзгодами приходится имѣть дѣло перелетной птицѣ. Весьма возможно, что мы просто остаемся въ невѣдѣніи о гибели множества перелетныхъ птицъ и въ томъ числѣ утокъ, когда послѣ теплой погоды вдругъ настапутъ морозные дни съ вѣтромъ и снѣгомъ. Особенно опасны эти неожиданные возвраты зимы, конечно, для тѣхъ утокъ, которыя только что перелетѣли море и еще не усиѣли отдохнуть, что и было на Сивашѣ; но въ меньшей стенени это всегда имѣетъ значеніе, хотя, можетъ быть, и не всегда ведетъ прямо къ смерти птицъ.

Изъ враговъ кряквы мы уже упоминали хищныхъ рыбъ, птицъ и четвероногихъ, которые, конечно, особенно опасны для итенцовъ разнаго возраста, для ящъ и въ меньшей степени для взрослыхъ итицъ. Но напболъе опасенъ для утокъ все-таки промышлениихъ,

который не щадить ни ящиь, ни птенцовъ, ни взрослыхъ. Такъ какъ сборъ ящиь имъетъ значене только въ томъ случаѣ, когда ихъ добываютъ въ больномъ количествѣ, его, естественно, можно практиковать только тамъ, гдѣ утокъ очень много. Такимъ образомъ, какъ промыселъ, сборъ ящиъ производится у насъ только на югѣ, между прочимъ въ Астраханской губ., гдѣ яйца продаются на мыловарни. Но помимо промысловаго сбора ящиъ, ихъ въ разныхъ мѣстахъ собираютъ на ѣду, и безъ сомнѣнія этимъ путемъ не только уничтожается масса ящиъ, но, что еще хуже, добрая половина ихъ уничтожается совершенно непроизводительно, такъ какъ сильно насиженныя яйца просто бросаются, какъ пегодныя въ пищу.

Затъмъ, утокъ во множествъ истребляютъ во время линьки и птенцами, когда послъдніе подросли, по еще почти не летають. Кто не видълъ, тотъ никогда не составитъ себт полнаго представленія о варварскомъ истеблении подлини при помощи простыхъ дворияжекъ и палокъ. И опять-таки, и въ этомъ случав множество птицы пронадаетъ непроизводительно даже для промышленинка, такъ какъ въ жару мясо легко портится и становится негоднымъ къ употребленію даже при крайней невзыскательности. Насколько губительна ловля перевъсами уже было говорено, но къ этому необходимо прибавить, что утокъ ловятъ сътями и уничтожаютъ всячески не только на мъстъ ихъ родины, но и на зимовкахъ и на перелетахъ. Вит всякаго сомитьнія, они ежегодно уничтожаются миллюнами и, принимая все это во винманіе, надо удивляться не тому, что м'встами количество ихъ видимо уменьшилось, а тому, что ихъ еще такъ много. Это служитъ лучшей мъркой и выносливости птицы и ея способности размножаться при мало-мальски сносныхъ условіяхъ, и ея умѣнью воспитать въ среднемъ изъ 10 птенцовъ хотя нѣсколько интукъ до полнаго возраста.

Переходя теперь къ описанію лѣтней и осенней охоты за утками, я прежде всего привожу описаніе охоты за молодыми изъ-подъ собаки и съ лодки, данное г. Давидовичемъ.

"Большая часть утокъ, пишетъ онъ, выводится въ концѣ мая и въ началѣ іюня, но охоту на нихъ не стоитъ начинать раньше середины іюля. До этого времени онѣ держатся еще тѣхъ мѣстъ, гдѣ вывелись: по преимуществу маленькихъ прудовъ и болотъ, окруженныхъ со всѣхъ сторонъ колосящимся хлѣбомъ. Для этой охоты необходима собака, такъ какъ молодыя, нелетающія утки крѣпко таятся въ камышѣ и между кочекъ, и только хорошая собака способна выгнать ихъ на плесъ (т.-е. на чистую воду) и подвести подъ выстрѣлы. Охотникъ прежде всего поднимаетъ старку, которая съ шумомъ вылетаетъ изъ-подъ охотника или собаки, но летитъ тихо и низко, постоянно падаетъ, притворяется тяжело раненой и всѣми силами старается отвести охотника отъ страстно любимыхъ дѣтей. Иногда совершенно забывая осторожность, она съ тревожнымъ крикомъ вьется

надъ самой головой охотника — и какъ часто она падаетъ жертвой своего самоотверженія... Особенной горячностью къ дѣтямъ отличаются полукряквы и чернушки, — горячностью, которая доходитъ иногда до глупости, такъ какъ издали завидя охотника, онѣ летятъ ему навстрѣчу и такимъ образомъ выдаютъ свой выводокъ.

"Правду сказать—охота на молодыхъ утокъ хоть и добычлива, но не особенно пріятна: приходится брести плогда по поясъ въ водѣ и стрѣлять "подлетовъ", которые поднимаются чуть не изъ-подъ морды собаки. Нужно замѣтить, что утки поднимаются (т.-е. начинаютъ летать) очень поздно, такъ что весьма часто собака дѣлаетъ стойку и ловитъ уже совершенно развившуюся, по все еще нелетающую утку. Побродивъ въ это время года по маленькимъ прудамъ и болотамъ, можно набрать много утокъ, не сдѣлавъ ни одного выстрѣла. Но такая охота можетъ быть по вкусу развѣ только промышленнику или очень молодому охотнику.

"Если поблизости того мѣста, гдѣ вывелись утята, находится больной прудъ, то утка немедленно переводитъ ихъ туда и живетъ съ ними въ береговыхъ камышахъ, которые представляютъ надежную охрану противъ враговъ всякаго рода; только по утреннимъ и вечернимъ зорямъ семейства утокъ показываются на плёсѣ. Около половины йоля молодыя утки поднимаются и небольшими станичками начинаютъ слоняться по всему пруду. Тогда начинается лучшая, по моему мнѣню, охота на утокъ: именно, охота въ лодкъ.

"На каждомъ большомъ прудѣ есть маленькія лодки-душегубки; есть и рыбаки-охотшки. Договоривъ наканунѣ такого рыбака, охотникъ еще до зари прівзжаеть на прудь. Холодно, сыро, а бълый волнистый туманъ полупрозрачной завъсой покрываетъ и чистую гладь озера, и лъса камышей. Тишина мертвая. Изръдка закрякаетъ чъмъ-то встревоженная утка и со свистомъ пронесется надъ головой охотника-и опять все тихо. Накопецъ звъзды начинаютъ гаснуть на востокъ, туманъ клубится, сгущаясь надъ самой водой, и готовится исчезнуть при первыхъ лучахъ солица. Пора отправляться. Рыбакъ столкнулъ лодку на воду, усадилъ охотника, самъ сълъ на корму и отчалилъ. Быстро скользить душегубка въ густомъ, колеблющемся туманъ и до слуха охотниковъ то и дъло долетаютъ кряканье утокъ и гоготанье гусей, которые вырываются почти изъ-подъ носа лодки. Но стрълять еще не видно. Наконецъ блесную солнце, туманъ быстро разсъялся, а рыбакъ подъежалъ къ камышамъ и начинаетъ прислушиваться. Беззаботно плещутся утки, и на этотъ плескъ рыбакъ направляетъ лодку. Если утки сидъли въ очень густомъ камьниф, и подъфхать безъ шуму не удалось, то охотникъ стръляетъ въ летъ; а въ противномъ случать-по сидячимъ. Конечно, всего пріятитье съ одного ствола выстрфлить по сидячимъ, съ другого въ летъ и такимъ манеромъ положить пары двъ. Зарядивъ ружье (заряжать приходится сидя и, стало быть, весьма удобно имъть дъло съ ружьемъ скоростръльнымъ), охотникъ отправляется далъе; недолго приходится ему ждать слъдующаго

выстрѣла, потому что голодныя утки чрезвычайно заняты своимъ аппетитомъ и не обращаютъ вниманія даже на близкіе выстрѣлы.

"Такая частая стрѣльба продолжается педолго: часовъ до 7—8 утра. Нажпровавшись вдоволь, утки скрываются въ густые камыши. Если вы не отличаетесь охотничьею жадностью и десятокъ утокъ удовлетворяетъ васъ, то вы приказываете ѣхать домой,—тѣмъ болѣе, что солнце начинаетъ сильно поджаривать вашу усталую голову; глаза смыкаются, и охотникъ то и дѣло забывается сномъ; а если и стрѣляетъ, то дѣлаетъ пеприличные промахи. Но въ пасмурный и вѣтрянный день, когда всѣ эти неудобства значительно уменьшаются, а подъщумъ камышей можно подъѣхать ко всякой уткѣ, почти во всякомъ мѣстѣ,—въ такую погоду ни одинъ охотникъ не уѣдетъ преждевременно съ поля: онъ будетъ охотнться цѣлый день и возвратится домой только ночью.

"Утомительна эта охота и не всякому она понравится: приходится сидъть неподвижно иногда часовъ 18, подвергаясь все время палящимъ лучамъ солнца и съ напряжениемъ всматриваясь въ густую съть камышей и осоки. Въ вътренную погоду однообразный видъ этихъ мърно колеблющихся стеблей производитъ, наконецъ, какое-то головокружение и обманъ зрѣнія, такъ что не замѣчаешь иногда утки, сидящей въ нъсколькихъ шагахъ и, наоборотъ, палишь въ какую-нибудь точку, принимая ее за утку. А комары, а яркое отражение солнца въ водъ "), ослъпляющее охотника и затрудняющее стръльбу, а ръзкое чувство досады и подчасъ просто бъщенства, когда 2, 3, 4 утки, убитыя, повидимому, наповать, одна за другой пропадають Богь-въсть куда и какъ?! Вотъ сколько терніевъ представляетъ охота въ лодкъ. А всетаки я очень люблю эту охоту, и сильно оппоутся, которые возразять мнъ: "Какое, молъ, искусство убить утку? Это-де вовсе не охотничья дичь!" Это замъчание върно въ отношении молодыхъ утокъ, которыхъ стръляютъ на болотъ изъ-подъ стойки: дъйствительно, эта стръльба черезчуръ уже незамысловата. Но на прудѣ совсѣмъ другое дѣло: во-первыхъ, стрълять приходится не близко и подчасъ бываютъ такіе блестящіе дуплеты, что даже вспомнить пріятно. Второе-убивать необходимо наповалъ, потому что на водъ утка вполнъ въ своей сферъ и если въ ней осталась хоть искра жизни, то она пропала для охотника. Ни на какой охот не пропадает в столько подстр вленной дичи, какъ на этой. Причины этому различны. Иногда убитая наповалъ утка падаетъ въ такую трущобу, куда ни пройти, ни профхать (замѣтимъ здѣсь, что собаку на эту охоту никогда не берутъ, потому что душегубка очень мала, и неосторожное движение собаки могло бы ее опрокинуть). Въ другой разъ смертельно раненая утка нырнетъи только вы ее и видъли: она забъется въ густой камышъ, высунетъ

^{*)} Впрочемъ комаровъ у насъ не очень много и они наскучаютъ только вечеромъ, когда охотникъ сидитъ неподвижно въ камыштъ и ждетъ выхода утокъ на плесъ. Но блестящая поверхность озера чрезвычайно утомляетъ глаза, и только въ пасмурную погоду это неудобство вполнтъ устраняется.

- въ такомъ положен и уволот ундо въ такомъ положен нін даже рысын глаза рыбака не въ силахъ разглядѣть ее. Но всего удивительнъе, что раненая въ летъ утка падаетъ иногда на чистую воду, вдали отъ камыша, нырнетъ и больше не показывается. Исчезнувшихъ такимъ образомъ утокъ я находилъ иногда (конечно въ прозрачной водъ) на диъ пруда, укръпившихся между густыхъ корней водорослей; нужно предположить, что некоторыя изъ нихъ такъ запутываются въ этихъ корняхъ, что, наконецъ, лишаются возможности выбиться на поверхность-и погибаютъ. И вотъ такимъ-то манеромъ даже у хорошаго стрълка пропадаетъ не мало утокъ; а у плохого пропадаетъ ихъ большая часть. Отсюда ясно, что хорошее далекобойное ружье, правильный зарядъ и точность прицъла—такія условія, которыхъ на этой охотъ обойти нельзя (не то, что на болотъ или на охотъ на перепеловъ). Ружье должно быть скоростръльное, какъ потому, что заряжать приходится сидя, такъ и потому, что послѣ двухъ выстръловъ очень часто требуется третій, — чтобы добить ныряющую утку.

"Не легка эта охота и для рыбака, и тутъ можно видъть невъроятную выносливость нашего мужичка. Отъ ранней до вечерней зари безостановочно гребетъ рыбакъ весломъ, мѣняя его въ мѣстахъ неглубокихъ на "сохаръ" (дерев. шестъ, длиною около сажени), а подчасъ въ густыхъ заросляхъ подвигаетъ лодку просто руками,—и при этомъ никакихъ признаковъ усталости и неизмѣнный отказъ отъ предлагаемаго отдыха. Въ особенности въ благопріятную (т.-е. въ вѣтреную и пасмурную) погоду онъ возитъ хорошаго стрѣлка съ увлеченіемъ: радуется его успѣхамъ, горюетъ въ неудачу и очень мало думаетъ о вознагражденіи. Каждый рыбакъ обыкновенно въ то же время обладатель длинной рушницы и добывъ гдѣ-нибудь пороху, онъ сейчасъ же дѣлается охотникомъ. Конечно, онъ такъ дорожитъ зарядомъ, что никогда почти не стрѣляетъ въ летъ или по одной уткъ, а приберегаетъ его для гуся или для цѣлой стаи утокъ.

"Охота въ лодкт можетъ продолжаться до начала сентября, т.-е. до того времени, пока утки не собьются въ большія стан и не переселятся въ плесъ. Тогда, конечно, подобраться къ нимъ трудно, ттмъ болтье, что въ сентябрт камышъ уже высыхаетъ, легко ломается и своимъ трескомъ выдаетъ приближеніе лодки. Но въ ненастную погоду или рано утромъ, когда мокрый камышъ становится гибче, можно тихонько подътхать къ стат утокъ и двумя выстртлами положить не одну пару. Одиночныя утки въ это время встртвчаются ртдко, и стртлять ихъ довольно трудно, потому что жирная утка поднимается весьма неохотно, а завидя охотника она быстро спасается ныряпіемъ".

Разгаръ ружейной охоты за утками приходится на августъ и сентябрь, когда молодыя уже сравнялись со старыми и когда большая часть утокъ усиъла уже нерелинять. Въ это время молодыя уже отлично летаютъ, и убить утку вовсе не такъ легко, какъ многіе думаютъ. Дѣло въ томъ, что полетъ кряквы чрезвычайно быстръ, и для того,

чтобы убить ее въ летъ, надо, смотря по положеню утки относительно охотника, очень сильно брать впередъ. Особенно трудно попасть въ утку, пролетающую надъ охотникомъ, и въ такомъ случаѣ малѣйшая оплошность ведетъ за собой отчаянный промахъ; легче стрѣлять въ догонку, и не особенно ловкимъ стрѣлкамъ мы совѣтуемъ всегда пользоваться этимъ пріемомъ. Ружейная охота за утками такъ картшию описана С. Т. Аксаковымъ, что для дополненія нашего очерка было бы просто опшбкой не привести его слова.

"Въ продолжение августа, —пишетъ онъ, —пдетъ самая изобильная, добычная стръльба утокъ: молодыя еще смирны, глуны, какъ выражаются охотники, и близко подпускають еъ подъезда. Ловко также стралять ихъ въ летъ, поднимающихся съ небольшихъ рачекъ, по берегамъ которыхъ ходятъ охотники, осторожно высматривая впереди, но изгибистымъ колфиамъ рфки, не плывутъ ли гдф-иибудь утки, потому что въ такомъ случаф надобно спрятаться отъ нихъ за кусты пли отдалиться отъ берега, чтобы онъ, увидъвъ человъка, не поднялись слишкомъ далеко; надобно забъжать впередъ и подождать, нока онъ выплывутъ прямо на охотника: шумно столбомъ *) поднимаются утки, если берега ръки круты, и онъ испуганы нечаяннымъ появленіемъ стрълка; легко и весело спускать ихъ сверху внизъ въ разныхъ живописныхъ положеніяхъ. Добрая собака, особенно водолазъ или пудель, тутъ очень пужна: она не допустить пропасть ни одной уткъ, даже легко пораненой въ крыло, или упавшей на отлетъ далеко на другой сторои в ръки, иногда посреди густой и болотистой уремы. Въ септябръ эти охоты еще пріятиве, потому что утки разжиръютъ и селезни выцвътутъ; казалось бы все равно, а спросите любого охотника, и онъ скажетъ вамъ, что убить птицу во всей красотѣ ея перьевъ, въ порѣ и сытую-гораздо веселѣе.

"Въ октябрѣ утки сваливаются въ большія стан, и въ это время добывать ихъ уже становится трудно. День онѣ проводять на большихъ прудахъ и озерахъ. Нерѣдко вода бываетъ покрыта ими въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Къ такой огромной стаѣ, сидящей всегда на открытой поверхности воды, или на голыхъ и пологихъ берегахъ, ни подъѣхать, ни подойти, ни подкрасться невозможно. На небольшую рѣчку утки, по многочисленности своей, уже не садятся, какъ бывало прежде, и я употреблялъ съ пользою, даже въ продолженіе всего октября, слѣдующее средство: я сбивалъ съ широкихъ прудовъ утиныя стан ружейными выстрѣлами и не давалъ имъ садиться, когда онъ, сдѣлавъ нѣсколько круговъ, опускались опять на середину пруда. Утки улетали вверхъ или внизъ по рѣкѣ; но по привычкѣ къ своему обыкновенному мъстопребыванію и не желая отъ

^{*)} Говоря выше, что кряква какъ на взлетѣ, такъ и при опусканіи не поднимается вертикально и не спускается прямо падая внизъ, я разумѣлъ тѣ случаи, когда кряква взлетаетъ ненапуганная. Будучи испугана, она поднимается прямо вверхъ, хотя, конечно, ничего не выигрываетъ отъ эгого во времени, нѣсколько разъ тяжело ударяя крыльями по водѣ. Hрим• автора.

него отдалиться, принуждены были разбиваться на мелкія стаи и разсаживаться кое-какъ по рѣкъ. Я оставлялъ охотника на пруду, который отъ времени до времени стръляль по возвращающимся станицамъ утокъ. Разумъется, выстрълы были безвредны, но они заставляли утиныя стайки садиться по рфчнымъ изгибамъ. Самъ же я отправлялся пъшкомъ по берегу ръки, шелъ безъвсякаго шума, выказываясь только въ тъхъ мъстахъ, гдъ, по положеню ръчныхъ извилинъ, должны были сидъть утки. Неръдко удавалось мнъ добывать до десятка крупныхъ и жирныхъ крякушекъ, по большей части селезней, потому что, имъя возможность выбирать, всегда ударшиь по селезню; только совътую въ подобныхъ случаяхъ не горячиться, т.-е. не стрълять въ тъхъ утокъ, которыя поднялись далеко. Разбившіяся утиныя стан расплывутся по всей рѣкѣ, и потому поднявшіяся утки не улетятъ очень далеко, а только пересядуть къ переднимъ, которыя находятся отъ охотника подальше. Дробь надобно употреблять, сообразно дальности или близости подъема утокъ, отъ 3-го до 5-го номера включительно; чъмъ дальше, тъмъ дробь нужна крупнъе. Я всегда употреблялъ мелкую утиную № 4. Впрочемъ, успѣхъ такой стрѣльбы зависитъ отъ мъстности. Во-первыхъ, надобно, чтобы поблизости не было большихъ прудовъ и озеръ, и чтобы утинымъ стаямъ не было куда перемѣщаться не разбиваясь; во-вторыхъ, чтобы рѣка текла не въ пологихъ берегахъ, и чтобы по ней росли кусты, безъ чего охотникъ будеть виденъ издалека, и утки никогда не подпустять его въ мѣру".

Въ концъ же лъта хорошую охоту представляетъ охота за утками на перелетахъ, основанная на томъ, что передъ вечерней зарей утки выбираются изъ крѣпей, гдѣ держались днемъ, на открытыя мѣста и съ наступленіемъ темноты отправляются отсюда на кормежку, пли въ хлъбныя поля, или на болота, озера и разливы, гдъ кормиъе и привольные. Въ частностяхъ охота эта можетъ разнообразиться до чрезвычайности. Такъ, въ Воронежской губ. охотятся съ кобелъ, куда забираются за нъкоторое время до захода содица. Укрывшись между вывороченными корнями ольхи или среди кустовъ и травы, охотникъ выжидаетъ утокъ, когда онъ выплываютъ на открытое мъсто. Хотя охота эта добычлива, но не изъ легкихъ, такъ какъ стрѣлять часто приходится въ совершенно неестественномъ положеніи. По окончаніи вечерней охоты можно переночевать въ устроенномъ на берегу шалашѣ и утрениюю зорю опять охотиться уже за возвращающимися утками.—Въ средней Россіи подстерегають утокъ на перелетахъ или прячась въ кустъ, или садясь въ шалангъ. Тутъ главное состоитъ въ томъ, чтобы върно опредъдить мъсто, которымъ утки пролетаютъ съ одного озера на другое, или гдв опв любятъ кормиться. При устройствъ шалаша, какъ и весною, надо прежде всего озаботиться тъмъ, чтобы онъ былъ на сухомъ мъстъ, невысокъ, выстроенъ обязательно изъ того матеріала, который его окружаетъ, и лучше всего имълъ съ одной стороны полукруглую форму, это та, съ которой происходитъ стръльба, а съ другой былъ прямо сръзанъ. Пногда и въ это время

около шалаша сажають криковыхъ утокъ, для приманиванія дикихъ, но такъ поступають чаще не охотники, а промышленники.

Такъ называемая "охота на стойкъ", практикуемая подъ Петербургомъ, относится къ этой же групиъ охотъ на перелетахъ и производится по вечерамъ, когда утки съ приморскихъ отмелей, гдѣ держались днемъ, летятъ на ночь кормиться въ болотахъ.

Послѣдий способъ охоты за утками, описанный г. Вилинскимъ для Ковенской губ., состоитъ въ томъ, что на небольшомъ озерѣ проканиваютъ отъ воды до самого берега узкую полосу камыша и охотники располагаются у берега, а лодочники гонятъ утокъ изъ тростниковъ шестами. Въ такомъ случаѣ утки всегда устремляются въ прокосы и здѣсь попадаютъ подъ выстрѣлы охотниковъ.

Переходя теперь къ промысловымъ способамъ добыванія утокъ дѣтомъ и осенью, мы имѣемъ ихъ четыре: 1) добываніе молодыхъ и нодлини изъ-подъ собакъ или просто даже безъ собакъ; 2) ловлю перевѣсами; 3) охоту изъ шалаша, и 4) охоту на садахъ.

Добываніе молодыхъ и подлини есть настоящая бойня, производимая даже не промышленниками, а мъстнымъ населеніемъ либо на болотъ, либо въ заводяхъ ръки. Заранъе замътивъ, гдъ гнъздятся утки, и выждавъ время, когда молодыя подросли, но еще не летаютъ, а матки уже начали линять, жители какой-нибудъ деревни цълымъ обществомъ безъ различія возраста отправляются на заранъе намъченное болото и, расположившись въ поперечную шеренгу, съ гамомъ и крикомъ, пустивъ передъ собою своихъ дворняжекъ, начинаютъ проходить болото. По бокамъ шеренги держатся немногіе стръльцы, вооруженные ружьями. Испуганныя гамомъ и крикомъ утки выскакиваютъ изъ травы, начинаютъ метаться и то попадаютъ подъ ударъ палки, то на зубы собакъ; если же какая можетъ летать, обыкновенно натыкается на стръльцовъ. Обыкновенно послъ такого похода утиное населеніе болота выбивается начисто, а тъ утки, что уцълъли отъ погрома, перебираются въ другія мъста, чаще всего на ръки.

На большихъ рѣкахъ, гдѣ есть заводи, поросшія камышомъ и ситникомъ, подобная же охота производится съ лодокъ, и при опытности лодочниковъ съ неменьшимъ успѣхомъ.

Что касается охоты на садахъ, то она описана только для пинскихъ болотъ и состоитъ въ слѣдующемъ. Осенью, состадившись, утки по зорямъ перелетаютъ съ рѣкъ на болота, въ камыши, болотныя озерки и ямы, но при этомъ почти всегда выбираютъ одни и тѣ же мѣста для отдыха. На эти низины и ямы въ благопріятные для вывода дѣтей годы утки садятся въ огромномъ количествѣ, такъ что иногда сплошь покрываютъ собою площадь не на одинъ десятокъ саженей. Когда такое стадо станетъ садиться на привычное мѣсто, оно ни на что не обращаетъ вниманія: куда сѣли первыя утки, туда садятся и остальныя. Зная это, мѣстные жители замѣчаютъ мѣста, куда садятся утки, и, забравшись сюда еще съ ночи и укрывшись подъ кустомъ или среди камыша, ждутъ утренней зори, когда начинаютъ

слетаться утки. Первыхъ не трогають, а ждутъ, когда ихъ соберется много, и лишь видя передъ собою сотии и даже тысячи, начинаютъ "пинчуки" свою работу: выскакиваютъ изъ засады и просто палками начинаютъ бить несчастную птицу, напозняя ею цѣлые мѣшки. Нѣкоторые стрѣляютъ на такихъ утиныхъ садахъ, но большинство пользуется множествомъ птицы просто, чтобы произвести бойню.

Относительно охоты изъ шалаша, практикуемой и настоящими охотниками при такъ называемыхъ утиныхъ перелетахъ, надо сказать, что это — одинъ изъ наименте губительныхъ способовъ добыванія утокъ, въ чемъ замъчается его несомитьное преимущество. Промышленникъ пользуется этимъ способомъ, п. ч. онъ даетъ ему върную добычу въ теченіе довольно продолжительнаго времени, и къ тому же добытая изъ шалаша птица, какъ свъжая, всегда въ цънъ. Въ нъкоторыхъ мъстахъ, какъ, напр., на Ростовскомъ озеръ, осенняя охота изъ шалаша принимаетъ совершенно своеобразный мъстный колоритъ, какъ это можно видъть изъ слъдующаго описанія ея, сдъланнаго г. Маракуевымъ.

"Задумавъ отправиться на промыселъ, —пипетъ онъ, —и узнавъ предварительно о томъ, въ какомъ изъ охотничьихъ угодій больше держится въ данное время птица, промышлениикъ заранве загоняетъ домой своихъ дворовыхъ утокъ *), кормитъ ихъ, выбираетъ изъ нихъ пъсколько штукъ понадежнъе (т.-е. такихъ, которыя больше кричатъ), а остальныхъ вторично выпускаетъ на свободу. Затѣмъ, обыкновенно передъ вечеромъ, нагружаетъ въ лодку всф необходимыя принадлежности охоты, какъ-то: ружье, а весьма часто и два, серпъ, топорикъ, бечевки и мочалы, савокъ для вычерпыванія изъ лодки воды, кружки на длиныхъ тычкахъ, штукъ восемь длинныхъ кольевъ для шалаша, а утокъ съ надътыми уже заранъе опутинками помъщаетъ въ особыя досчатыя катьтушки, устроенныя въ носу и кормъ лодки. Весьма часто и въ л'ьтнее время онъ беретъ самыя топорныя и разнокалиберныя чучела: тутъ есть и чирокъ, и гоголь, и пегарь въ своемъ весеннемъ нарядѣ, но такая несообразность однако писколько не вредитъ успѣху охоты, такъ какъ суть оказывается не въ томъ, какихъ породъ выставлены чучела, а въ томъ, чтобы около шалаша разставлено было, по возможности, больше живыхъ и деревянныхъ утокъ (первыхъ всегда бываетъ, конечно, гораздо меньше). Прівхавъ на надлежащее мфсто, охотникъ выбираетъ растущій въ водѣ кусть осоки такой величины, чтобы его небольшая лодка могла въ немъ помфститься, и вдвигаетъ лодку внутрь куста, по такъ какъ такой кустъ всего чаще не можетъ

^{*)} Каждый озерной охотникъ постоянно имъетъ достаточное количество утокъ при одномъ-двухъ селезняхъ: эти утки во время лътняго дия, а иногда и ночи почти не бываютъ дома, а пользуясь близостью озера, свободно плаваютъ у его береговъ, никогда, вирочемъ, не уплывая слишкомъ далеко отъ дома. Каждый охотникъ знаетъ поэтому, глъ въ случат надобности онъ можетъ найти своихъ утокъ, а на тотъ случай, если бы утки смъщались съ чужими, каждый хозяинъ мътитъ утокъ посредствомъ различнаго рода надръзовъ, дълаемыхъ на плавательной перенонкъ.

достаточно скрыть лодку и охотника, то этотъ последній первопачально нажинаеть серпомъ цълый ворохъ осоки, которая, къ слову сказать, на нашемъ озерѣ въ нныхъ мъстахъ растетъ даже въ нзлишки, и тогда уже въизжаетъ въ кустъ. Первымъ диломъ опъ втыкаетъ (виутри куста) спереди и по бокамъ лодки ифсколько кольевъ, прикрѣпляеть къ инмъ поперечины, играющія роль обруча въ береговомъ шалашъ, а къ этимъ послъднимъ привязываетъ стоймя пучки осоки, наконецъ, сдвигаетъ надъ лодкой ихъ верхушки для того, чтобы утка, пролетая надъ такимъ искусственнымъ кустомъ, не могла замътить обмана,—и шалашъ готовъ. Затъмъ онъ разставляетъ передъ нимъ круговыхъ утокъ, пускаетъ чучела и, въбхавъ въ кустъ, спокойно выжидаетъ добычу. Самая дучшая стрфльба изъ такого шалаша бываетъ обыкновенно на вечерней и утренней заръ; почью же птица летитъ плохо, а потому и охотникъ можетъ спать совершенно спокойно, а если бы и налетъла случайно дичь, то привычная круговая утка не замедлить дать знать ему объ этомъ своимъ крикомъ.

"Дикія утки, переносясь по ворямъ съ мъста на мъсто и отыскивая кормъ, весьма легко поддаются обману и садятся не только вблизи дворовыхъ утокъ и чучелъ, по и сразу опускаются въ ихъ средину, гдѣ, само собой разумъется, не представляется охотнику особаго труда взять 2—3 утки на выстр'яль, что по большей части и бываеть, потому что охотникъ только въ крайнемъ случать будетъ стрълять по одной уткъ, а всегда предпочтетъ "сводить" ихъ, т.-е. выждетъ того времени, пока и всколько утокъ не сойдутся группой или и всколько утокъ не размъстятся по лини выстръда,—и тогда уже стръдяетъ. Убитыя утки обыкновенно тотчасъ не подбираются, а остаются на водъ до окончанія охоты *), конечно, если только послъдняя продолжается не болже сутокъ, и потерь при этомъ почти никогда не бываетъ. Днемъ стръльба бываетъ не такъ добычлива, а потому промышленникъ, просидъвъ обыкновенно вечернюю и утреннюю зори, часамъ къ девяти утра возвращается уже домой, исключая только тъхъ случаевъ, когда охота идетъ особенно успъшно и когда онъ отправился на озеро на нѣсколько сутокъ. Отправляясь на долгії срокъ, охотникъ запасается, понятно, и всей необходимой провизіей, даже самоваромъ, а также котелкомъ или чугунчикомъ, въ которомъ и варитъ себъ уху изъ рыбы, добытой удами; уды беретъ съ собою обыкновенно почти всякій промышленникъ, отъфзжающій на озеро на продолжительный срокъ. Вотъ подобныя то продолжительныя охотничы экскурсін поздней осенью весьма нерѣдко кончаются не совсѣмъ благополучно; очень часто случается такъ, что вдругъ наступившій морозъ скуетъ озеро и лишитъ охотника возможности возвратиться домой. Въ такомъ случать ему остается или съ большимъ усиліемъ пробивать постепенно ледъ и, понятно, весьма медленно подвигаться къ берегу, или же, вооружившись теривніемъ, дожидаться новой от-

^{*)} Понятно,-при тихой погодъ.

тепели, которая однако весьма легко можетъ и не воспослѣдовать,— и охотнику, иногда почти голодному, приходится выжидать того времени, когда ледъ значительно окрѣпнетъ. Тогда, собравъ всѣ свои охотничьи принадлежности, онъ идетъ во-свояси пѣшкомъ, а лодку оставляетъ на озерѣ до наступленія настоящей зимы и тогда, уже вырубивъ ее изо льда, переправляетъ домой на лошади. Вышеописаннымъ способомъ охота производится въ продолженіе всего лѣта вплоть до глубокой осени, т.-е. до тѣхъ поръ, пока озеро почти сплошь не покроется льдомъ; съ этого времени начинается уже охота по полыньямъ.

"Въ иныхъ мъстахъ озера существуютъ довольно значительные ключи, вслъдствіе чего на такихъ мъстахъ и образуются полыньи, не замерзающія вполнѣ даже въ зимнюю стужу. Въ концѣ октября или началт ноября, когда озеро уже покроется настолько кртпкимъ льдомъ, что представится возможность безъ особаго риска ходить по немъ, вся водоплавающая птица сваливается на такія полыньи, на которыхъ и держится до времени отлета; такъ какъ подобныхъ незамерзающихъ пространетвъ все-таки сравнительно немного, то отсюда ясно, какая масса птицы должна на нихъ скопляться. Охотникъ, вооружившись, кромф ружья, длиннымъ деревяннымъ крюкомъ, отправляется къ такимъ полыньямъ пфикомъ и съ подхода стръляетъ скопившуюся птицу, доставая убитую упомянутымъ крюкомъ. Въ это время птица гибнетъ массами, потому что спугнутая съ одной полыны она перебирается на другую, гдт ее ожидаетъ та же участь, —и такъ изо дня въ день до тъхъ поръ, пока она, поуменьшившись значительно въ числъ, не решится, наконецъ, покинуть негостеприимное пристанище. При такой охотъ оказывается чрезвычайно много подстръленной птицы, которая, за невозможностью двинуться въ далекій путь, остается на озерѣ и добивается охотниками уже впослъдствін; часть же ея, понятно, не попадаетъ въ руки охотникамъ и гибнетъ безъ всякой пользы, умирая съ наступленіемъ морозовъ отъ голода. Подобная охота для промышленника — чистый праздникъ, но она случается однако не каждый годъ; иной разъ озеро не замерзаетъ слишкомъ долго (до декабря), и тогда птица улетаетъ, не дождавшись его окончательнаго замерзанія".

Г. Давидовичь сообщаетъ еще объ одномъ способъ ловли утокъ, практикуемомъ въ Подольской губ., но, повидимому, этотъ способъ не имъетъ особенно большого значенія. Состоитъ онъ въ слѣдующемъ: на маленькомъ ручьѣ, протекающемъ черезъ болото, устраиваютъ запруду и въ образовавнійся отъ этого прудикъ или лужу кладутъ иѣсколько сноповъ гречи, проса и т. п. Въ теченіе августа утки постепенно привыкаютъ къ этому корму и по мѣрѣ своего стаденія, т.-е. сокращенія корма въ другихъ мѣстахъ, прилетаютъ сюда все большими и большими стадами; пріучивъ птицъ летать на извѣстное мѣсто, охотникъ ставитъ здѣсь сѣть въ родѣ шатра, которымъ кроютъ тетеревовъ, и пріучаетъ птицъ къ виду этой сѣти, послѣ чего

начинается уже и самая охота. Говорятъ, что ипогда при удачт можно сразу накрыть до 40 паръ, а въ среднемъ ежегодно на человтка достается свыше 100 паръ, продаваемыхъ по цтить 20—30 к.

О ловять перевъсами, какъ описанной въ главт о весенией охотъ, но употребляемой также и осенью, мы болъе говорить не будемъ.

Вотъ и вст способы добыванія утокъ вообще и кряквъ по преимуществу. Изъ сказаннаго само собою вытекаетъ, что утиный промыселъ имбетъ у насъ огромное значение и твмъ, что даетъ народонаселенію непосредственно пищевой матеріаль и тімъ, что доставляетъ много продажной дичи. Если цена на утку и не велика, зато количество добываемыхъ и продаваемыхъ утокъ очень велико. Одиако учесть результаты утинаго промысла нѣтъ никакой возможности: для утки нътъ такого центра сбыта, какимъ для рябчика и тетерева является Москва и Петербургъ. Для сбыта утокъ въ каждой мъстности есть свой центръ, больше или меньше-вопросъ второстепенный, и потому, говоря вообще, выручка отъ утинаго промысла распредъляется въ народонаселении равномърнъе и болъе непосредственно, т.-е. минуя руки скупщиковъ дичи. Но зато тъмъ печальнъе, что мъстныя условія, неразвитость низшаго сословія и легкость заработка охотничымъ промысломъ ведетъ за собою столько же безпощадное, сколько и непроизводительное истребление утокъ.

117. Шилохвость. Anas acuta, L.

Табл. 122.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 690.

Болъе распростр. названія: шилохвость, шилохвость.

Мѣстныя названія: острохвость, шилохвость, шилохвость; большая порхова (въ Кандалакшѣ); страя утка (Петерб., Новгор.); овсянка (у олонецк. охотн.); косачка (у Мангазейц.); свитторъ (на верхнемъ Байкалѣ).

Польск.—rozeniee.—Фин.—jouhisorsa.—Лапл.—вушет, вуоятишет, вуовьять, вуоять.—Вогул.—кирте.—Остяц.—куртеть (Березов.), котерть (на Сургуть).—Бурят.—шурунгь.—Коряц.—хейчогачи.—Тунгус.—шеджить, ибчаль: хитицль (Впл.), ичемукчань (верх. Амур.).— Якут.—мойногонь (на Боган. у Якутска), мойногонь (на Ленъ).—Самоъд.—мойнагань.—Камчад.—катахыначь, куйнейлемь.—Укинс. (Камч.)—хейтогали.—Татар.—сидякомь (юж. Касп.).—Сартек.—еуксурь.

Шилохвость распространена по всей Европ. Россіи, но только на пролет'в бываетъ въ Прибалтійскомъ кра'в, очень р'ядкая гн'яздянцаяся птица губ. средняго теченія Дн'впра, только на пролет'в въ Новороссійскомъ кра'в и подъ Астраханью. Въ Крыму также бываетъ на пролет'в, за исключеніемъ южной части полуострова, гд'в, какъ и вообще на Черномъ мор'в, зимуетъ. На Кавказ'в не только зимуетъ, но и гн'яздится какъ въ низменностяхъ, такъ и на армянскихъ озерахъ.

118. Свіязь. Anas penelope, L.

Табл. 123.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 693.

Болѣе распростр. названія: свіязь, свищъ.

Мъстныя названія: свіязь, свіязка, свіяца, свищь; суязь (Рязан.); свистемь (Яросл.); свіяца, свизь, свищь (Петерб.); свиступь (Оренб. каз.); свиступь, свизь (Пермск.); свись (у помор.); лють (по Палласу на Окъ); вьязь (Харьков.); фіцзовая утка, фіязь (Ворон.); фіцсы (олон. охот.).

Польск. – swistun. — Эст. — murulas. — Тат. — schwukschkis. — Фин. — haa-

рапа.—Лапл. — сиятья, снарталь.

Кирг.— шуалдакъ.—Вогул.—вуйю.—Остяц.—лопте (на Оби и Иртышѣ), ловуши и лоптиваестъ (у Сургута), почёнш (на Нарымѣ).—Татар.—боюлъ (Закавк.).—Зыр.—въязь.—Тунг.—кюршенъ (на Вилюѣ), хилтыверъ (по Палласу), хилтыръ (на верхи. Байк.).— Камчад.— шуимумъ. хейчогачи.— Якут.—тыньякъ.

Мить решительно нечего прибавить къ темъ сведеніямъ о распространеніи свіязи, которыя я собралъ ранте. Вотъ что я писалъ объ этомъ:

"Свіязь распространена у насъ даже въ качествѣ гнѣздящейся птицы очень широко. Она въ изобиліи встрѣчается въ Лапландіи, обыкновенна во всей Финляндіи, въ области Ладожскаго и Онежскаго озеръ, у Бѣлаго моря, найдена на Вайгачѣ и Новой Землѣ, очень обыкновенна на Нижней Печорѣ и, за исключеніемъ озеръ и рѣкъ черноземной полосы, гнѣздится въ Пермской губерніи. Затѣмъ свіязь гнѣздится въ Казанской губерніи, по всей равнинной части Уфимской губ., въ Оренбургскомъ краѣ, по средней и нижней Волгѣ, не доходя верстъ 50 до Астрахани, и въ средней Россіи. Провести точную южную границу области гнѣздовья свіязи въ послѣдней мѣстности не представляется пока возможнымъ; но эта птица гнѣздится въ Рязанской, Тульской и Московской губ. и обыкновенна на сѣверъ отъ нихъ. Далѣе на западъ гнѣздится въ Тверской, Новгородской и по окраинамъ Петербургской губ. Но въ части Петербургской губ., прилежа-

щей къ Финскому заливу, въ Прибалтійскомъ крав, Польшѣ, губ. Кіевской и прилежащихъ, а также Харьковской, Воронежской, въ Новороссійскомъ крав, на Сарив и въ Киргизскихъ стеняхъ бываетъ только на пролетв. Въ Крыму въ небольшомъ числѣ гнѣздится, во множествѣ на пролетѣ; отдѣльныя особи зимуютъ. На Черномъ и Каспійскомъ моряхъ свіязь зимуетъ. Отдѣльныя особи остаются зимовать въ Закавказъѣ внутри страны, но преимущественно бываютъ здѣсь на пролетѣ".

По времени прилета свіязь является у насъ одной изъ самыхъ раннихъ птицъ, такъ какъ буквально шагъ за нагомъ слѣдуетъ за вскрытіемъ ръкъ. Въ области Финскаго залива, въ средней Россіи и Пріуральскомъ крат свіязь прилетаетъ въ апръть; на крайній съверъ она прибываетъ уже въ первой трети мая, одновременно съ вскрытіемъ рѣкъ.

Что касается осенняго пролета, то въ средней Россіи онъ происходить въ сентябръ; въ Польшъ эта утка держится до замерзанія ръкъ. На среднемъ Днъпръ пролетъ длится съ половины сентября до половины октября. Наконецъ, въ восточной Россіи свіязь пролетаетъ съ начала августа до половины сентября. На Черномъ и Каснійскомъ моряхъ свіязь держится сначала около ихъ съвернаго побережья, а потомъ отлетаетъ далъе къ югу.

119. Пѣганка. Tadorna cornuta, Gm.

Табл, 124.

Мензбиръ, Птицы Россін, т. І, стр. 697. Болѣе распростр. названіє: пьганка.

Мѣстныя названія: пышика, пышиь; оплия степция дтка, былая зиморская дтка (у лип, казак. Оренб. края); бугровая утка (уральск. каз.); хархаль (Астрахан.); бирь (Херсон.); плитазь (Крымъ); атайка (въ Сибири). Польск.—ohar.—Эст.—ristlind, wagalind, kiwi ani.—Фин.—ristisorsa.

Тат.—и.ш-кизъ. ишъ-кизъ. ишъ-или-кизъ. — Калм. — лоиготу-алакъ-ноисионъ. — Кирг. — ишъ-казъ, туръ-или-кизъ. — Монг. — иниту. иликту. цоохоръилу. — Тунг. — бушталъ.

Я совершенно согласенъ съ С. Н. Алфераки, что изганка, благодаря отвратительному, неспосному запаху ея жира и мяса, не можеть считаться охотинчьей птицей, т.-е. дичью; тымь не менже охотники стръдяють ее иногда за красоту, а иногда и по незнаию, что это за утка (въ тъхъ мъстахъ, куда она только залетаетъ), и потому я сообщаю зувсь указанія отпосительно ея распространенія у насъ. Въ сущности опа распространена у насъ очень широко, по занимаетъ четыре довольно обособленныя области. Напболъе широко она распространена въ бассейнъ Каспійскаго моря, гдъ обыкновенна по нижнему Ураду, нижней Волгъ и вообще въ степяхъ Урадо-казачыхъ владфий и Астраханской губ. Гифздится также въ южныхъ и югозападныхъ частяхъ Оренбургскаго края, па Бишъ-Копъ, у Соръ-Куля и въ урочищѣ Кандыкты, слъдовательно приблизительно подъ 50° с. ш.; по на Волгъ едва ли гиъздится такъ далеко къ съверу, хотя обыкновенна у Сарепты. Въ области чернозема пъганка не гитадится, однако въ качествъ случайно залетной птицы подинмается очень далеко къ съверу и наблюдается подъ Оренбургомъ, въ Екатеринбургскомъ у., подъ Саратовомъ, Самарой и въ Симбирской губ. На Кавказф и въ Закавказыв, по Каспійскому побережью, пвтанка встрвчается круглый годъ; отдъльныя пары гифздятся и внутри страны, но чаще описываемая итица залетаеть сюда зимою. Вторую область распространенія изганки составляєть бассейнъ Чернаго моря. Здѣсь эта итица гиѣздится по соленымъ озерамъ стенной части Крыма, на соленыхъ лиманахъ всего побережья, въ диѣстровскомъ и диѣпровскомъ лиманахъ и на Кавказскомъ берегу. Свѣдѣнія о гиѣздованіи пѣганки въ Подольской губ, все еще не подтверждены, по какъ залетная итица она бываеть въ Кіевской, Харьковской и, вѣроятно, другихъ губерніяхъ южной Россіи. Третью область пѣганки составляєть Балтійское море, гдѣ эта птица гиѣздится на о. Эзель, въ Дифляндіи, на западномъ побережьѣ Эстляндіи и прилежащихъ островахъ, на Аландскихъ о-вахъ и въ береговой зопѣ юго-западной Финляндіи къ сѣверу до 61°25′ с. ш. Отсюда случайно залетаеть на побережье Вазской губ., въ окрестности С.-Петербурга и въ Польшу. Наконецъ, еще пѣганка встрѣчастся въ области Варангеръ-фіорда.

120. Утка красная. Tadorna rutila, Pall.

Табл. 125.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 702.

Болѣе распростр. названія: красная утка, огарь, огаръ.

Мьстныя названія: турнань (на Қавказѣ); красная ушка, каразатка (южн. Росс.); о́ларъ, кинуна (Новорос. и Малоросс.); юшка (Подольск.); красная стенная ушка, красная зиморская ушка или залара (у лин. казак. Оренбург. края); варнава (зап. Спбирь); красный, поровый турнань (вост. Спбирь).

Кирг.—ишъ-ала-казъ.—Тат.—ашъ, ишъ-казъ (на Кавк.).—Груз.—апре-

.и. - Монг. -. имашево, лима-шубу, анитеръ, -Тупг. - ичаной.

Красная утка точно такъ же негодна для ѣды, какъ и пѣганка; на Кавказѣ распространено даже мнѣніе, будто мясо красной утки причиняетъ лихорадку. Но отъ времени до времени и ее стрѣляютъ при тѣхъ же условіяхъ, что и пѣганку.

О распространенін этой утки я могу привести св'єд'єнія, собранныя мною ран'єе.

"Красная утка, - писалъ я, - распространена у насъ только въ юго-восточной и южной части страны. Здѣсь она гиѣздится въ степяхъ по Эмбъ, Уралу и нижней Волгъ, поднимаясь нормально до средняго теченія р. Урала и до Самарской луки, но отдільными парами гивадясь и далве къ свверу. Такъ, П. П. Сушкинъ нашелъ ее въ Уфимской губ, на громадномъ болотъ Берказанъ-Камышъ при условіяхъ, не оставляющихъ сомибній въ томъ, что эта птица здісь гибздится. Палласъ во множествъ наблюдалъ ее на оз. Кулатовъ Челябинскаго у. М. Н. Богдановъ говоритъ, что красная утка гифздится въ степяхъ Саратовской губ. и Сызранскаго у. и залетаетъ въ Ставропольскій и Сенгилеевскій уу. На Кавказ в п въ Закавказь в красная утка обыкновенна и гивздится до высоты въ 7.000' н. у. м. На западъ отъ Каспійскаго бассейна красная утка встрфчалась прежде въ небольшомъ числъ въ Воронежской губ. Гитэдится по озерамъ степной части Крыма и, въроятно, вообще по всему съверному побережью Чернаго моря, откуда залетаетъ въ губ. Харьковскую, Полтавскую п Подольскую. Старая самка была убита даже на съверномъ берегу Эстляндін.

121. Лебедь кликунъ. Cygnus musicus, Bechst.

Табл. 126.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 706. Болѣе распростр. названія: лебедь, лебедь кликунъ.

Мъстныя названія: лебедь скриналь (на Дивстрв); желтоносый лебедь (Уфим.).

Польск.—labedz krzykliwy.—Эст.—luig, luike.—.Лат.—gubbis.—Фин.—iso joutsen, iuak-kuinen. — Лапл.—иухиь, иуфиа. — Тат.—акошъ. — Башк. — юсъ. — Кирг. — ку. — Хивин. — кую. — Бух. —перс. — джуниа. — Якут. — куба. — Морд. —локсти. — Перм. —джоджегъ. — Вотяп. — юсъ. — Черем. —іокиу. — Чуваш. —агышъ. — Вогул. —іошвой. — Ост. — чини (на р. Кеть), хотенъ (у Берез.), кытикъ (Васюг.), куттункъ (у Сургута). — Қалм., монг. — хонгъ. самка — лянъ, съ желтизн. на головъ-ингръ-тологиту-хонгъ. — Тунг. — нагъ. уушъ, бидавки. — Ламут. —узи. — Самоѣд. —хорой. — Арм. —куй. — Қамч. —матамъ (запади.), битушмъ (въ друг. мъст.), колъ (укип.). — Қар. — кайтиштъ. — Юкаг.—іону́ттора.

Чтобы познакомить читателей съ распространеніемъ и образомъ жизни у пасъ лебедя кликуна, я приведу съ нѣкоторыми измѣненіями и дополненіями свою рапѣе составленную статью о немъ.

"Лебедь кликунъ гибэдится во всей Лапландін и во внутрешихъ частяхъ Финляндін къ югу до 62° с. ш., но въ широкой береговой зонть Ботинческаго и Финскаго заливовъ бываетъ только на пролетть и въ это время обыкновененъ. Однако, прежде кликунъ гибэдился въ Курляндін, хотя теперь едва ли это имбетъ мъсто. Иногда въ Ирибалтійскомъ крать кликуны перезимовываютъ. Въ Польшть кликунъ бываетъ очень ръдко, что объясияется положеніемъ страны между Балтійскимъ и Дибировскимъ пролетными путями. На востокъ отъ Финляндін кликунъ гибэдится подъ Архангельскомъ и, въроятно, во всей области Ств. Двины, оставаясь осенью въ Вологодской губ. до декабря и появляясь весною уже въ февралть. Вопросъ о нахожденіи лебедя кликуна на Новой Землть, новидимому, ръшается отрицательно. Въ области Нечоры кликунъ всюду болтье или ментье обыкновененъ какъ въ тундрахъ, такъ и въ лібеной странть. Къ югу отсюда лебедь встрк-

чается во всей Пермской губ., но не вездъ въ одинаковомъ количествф; на западномъ склонф онъ многочисленъ только на Камф и по берегамъ стверныхъ ръкъ: Вишеры, Печоры, Косьвы; на восточномъ встръчается ръдко, хотя, какъ говорятъ, водится на Сосьвъ и Лозьвъ. Вообще чъмъ ближе къ Ураду, тъмъ меньше количество лебедей; исключеніе составляють только безчисленныя озера восточнаго склона средняго Урада. Начиная съ 571 20 с. н., кликунъ появляется даже въ большемъ числъ, чъмъ на Камъ и съверо-западныхъ ръкахъ Пермекой губ.; мъстами, какъ, паприм., въ Сысертскомъ Ураль, близъ Сосноваго, онъ гивадится огромными колоніями, чуть не сотнями паръ; точно такъ же лебеди гивздятся, несмотря на преследованія башкирцами, на большей части озеръ Каслинскаго у. Но въ степной полосф лебеди обыкновенны только на пролеть, а л'ятомъ здъсь встръчаются лишь холостыя особи. Немногія особи зимують въ южной части Пермской губ. Относительно прилежащихъ частей Тобольской губ. Н. Я. Словцовъ говоритъ, что кликунъ ръдко гивадится въ Тюменскомъ округъ, чаще въ Ялуторовскомъ, Иншискомъ и Курганскомъ; обинрныя стада кликуна и шипуна гифздятся въ самой южной части Тюкалинскаго округа. Относительно Уфимской губ, мы имбемъ показаніе Ф. Д. Илеске, что кликунъ обыкновененъ на гивздовъв по Бфлой и Камѣ. По наблюденіямъ П. П. Сушкина, кликунъ встрфчается на гивадовыв во всей равнинной части Уфимской губ.; въ горахъ, по показаніямь м'ястныхъ жителей, "желтопосый лебедь", какъ они называютъ эту птицу, изръдка, не каждый годъ, гиъздитея на оз. Зюракъкуль. По наблюденіямъ Н. А. Заруднаго, кликунъ гизадится въ Оренбургскомъ краф въ видъ исключения; подъ Оренбургомъ даже на пролеть встрычается въ небольшомъ количествь, такъ какъ предпочтительно пролетаетъ подъ Орскомъ, следовательно, летя по Ори съ Эмбы. Однако возможно, что кликунъ прежде былъ обыкновеннъе п по р. Уралу; по країней мъръ въ 1860 г. Съверцовъ отмъчаетъ его ръдкимъ гиъздящимся въ долинъ р. Урала. Въ большомъ количествъ гитздится въ камышахъ морского побережья между устьями Урала и Эмбы, откуда для линьки отправляется въ море къ Прорвинскимъ о-вамъ (на ю. в. отъ Эмбы, у восточнаго берега Каспія подъ 46° с. ш.). Что касается Волги, то всѣ натуралисты, бывше здѣсь, говорятъ, что кликунъ бываетъ здъсь только на весеннемъ и осеннемъ пролетъ. На пролетъ же бываетъ онъ и на Сарпинскихъ озерахъ, но въ области средней Волги и нижней Камы кликунъ гитздится, равно какъ и по нъкоторымъ притокамъ Дона. По словамъ М. Н. Богданова, кликунъ еще около 1870 года былъ весьма обыкновенною птицей по средней Волгъ и Камъ, гдъ гнъздился по большимъ камышистымъ озерамъ и затонамъ. Кромѣ того, кликунъ гнѣздился въ долинахъ Суры, Хопра (мало), Медвъдицы, Усы, Мёши (оч. ръдко), Вятки; чаще встръчались гнъздящіеся лебеди по долинамъ ръкъ и ръчекъ, впадающихъ въ Каму и Волгу съ лѣвой стороны, наприм., помимо уже вышеупомянутой Бълой, въ долинахъ Ика, большого Черемшана, Майны. Отно-

ентельно текущаго времени М. Д. Рузскій сообщаєть, что кликунь въ Казанской губ. гизадится больше всего въ долинъ Камы, ръже Волги, по крупнымъ старицамъ и озерамъ. На другихъ ръкахъ гибздуеть только мъстами и даже не каждый годъ; изъ шихъ можно указать на Вятку, Мёшу, Плеть, Ветлугу. По ръкамъ таежной полосы лебедь не найденъ, но гивадится наръдка на большихъ лъсныхъ озерахъ среди боровъ Козьмодемьянскаго и Царевококшайскаго увздовъ, а также западной части Казанскаго. По Б. Череминану и Майигь М. Д. Рузскій уже не пашель гизьздящихся лебедей. На западъ отсюда лебедь гивздится въ Костромской, Ярославской и Тверской губ., но въ Московской бываеть только на пролеть. Теперь только на пролеть въ Тульской и съверо-западномъ углу Тамбовской, по прежде гиъздился здась. Въ Петербургской губ, только на пролета, но тогда обыкновененъ. По Дивпру кликунъ только пролетаетъ, но и то въ пебольшомъ числъ. Въ Харьковской губ. обыкновененъ на пролетъ и изрѣдка зимуетъ. Что касается Черноморской области, то здѣсь кликунъ зимуетъ въ устьяхъ Дифстра и Дифпра, откуда перекочевываетъ, когда лиманы замерзаютъ, въ море, гдв и держится вблизи его еввернаго побережья. Кром'в того, на пролет'в и зимой бываетъ въ Крыму, гдв въ пезначительномъ числв остается даже гивадиться на островахъ Сиваша у Геническа. Наконецъ, что касается Каспійскаго моря, то здізсь дебедь найденть зимующимъ въ устьів Терека и не только зимующимъ, по и гизадящимся на Закавказскомъ побережь в; зимуетъ и на Гокчайскомъ озерѣ.

"Лебедь кликунъ является одной изъ самыхъ раниихъ перелетныхъ птицъ. Въ восточной России онъ уже въ первой половинъ марта появляется на нижнемъ теченіп Урала и не позже конца марта прилетаетъ въ Уфимскую губ., по валовой пролетъ происходитъ позднѣе: во второй половинъ марта на нижнемъ Уралъ, въ началъ апръля—на среднемъ и въ первой половинъ апръля-въ Уфимской губ. Въ Казанской губ, пролетъ лебедей длится съ 20-го марта до мая. Подъ Усть-Цыльмой первыхъ пролетныхъ кликуновъ Зибомъ и Броунъ видбли 29-го апръля; затъмъ число ихъ все увеличивалось, пока 8-го мая пролеть или точиве прилеть не кончился. Съ Чернаго моря лебеди начинають весною улетать въ началф марта, а въ концф марта появляются уже въ средней Россіи. Въ Прибалтійскомъ краф кликунъ прилетаеть въ очень большомъ количествъ въ концъ марта и въ апрълъ. Подъ Петербургомъ лебедь появляется обыкновенно во второй половнив марта, когда море еще силоны покрыто льдомъ, и приблизительно недъди за двъ, за три до векрытія Невы. Въ Ланландін лебеди прилетаютъ въ половнић апръля. Такимъ образомъ первое появленіе лебедей происходить въ то время, когда рѣки и озера еще не векрылись и громадной итицъ приходится отыскивать для отдыха польшьи и просто лужи. Конечно, въ связи съ этимъ стоитъ то, что первые прилетные лебеди появляются одиночками или парами; по поздиже, когда ржки вскроются, и лебеди начинають летжть стайками

въ то и больше штукъ, выстронвшись угломъ. Обыкновенно стайки продетныхъ дебедей держатся очень высоко, такъ какъ кликунъ очень остороженъ, и летятъ быстро; но что касается времени дня, то, повидимому, это не имветь для нихъ большого значенія, и продетныхъ кликуновъ можно наблюдать какъ днемъ, такъ но ихъ трубному крику узнавать и почью. Ночью лебединый голосъ раздается даже какъ-то особенно полно и удивительно гармонируетъ съ весениимъ шумомъ; точно дъйствительно трубные звуки раздаются сверху, прорываясь сквозь глухой шумъ безчисленныхъ ручьевъ, осъдающаго ситга и разнообразныхъ годосовъ продетныхъ птицъ. Кликунъ далеко не такъ красивъ, какъ шинунъ, который за красоту подъ охраной человъка сталъ полудоманнею итицей и во многихъ мъстахъ уже не встръчается въдикомъ состоянии. Особенно портитъ кликуна шея, которую онъ держитъ прямо, точно палку, тогда какъ у шишуна она обыкновенно изящно изогнута въ видь французскаго в. Но эта же шея даетъ всей птицъ болье дикій видъ, особенно когда лебедь насторожится и начнеть осматриваться, поворачивая свою головку. Само собою разумфется, что такая тяжелая птица съ трудомъ подинмается, обыкновенно тяжело хлопая крыльями и какъ бы волочась по водъ, но, подиявшись на воздухъ, лебедь летить очень быстро.

"Черезъ педълю или двъ послъ прилета лебеди разбиваются на пары и приступаютъ къ устройству гиззда. Впрочемъ, изкоторые очень запаздывають, чемъ и объясняется различное время кладки. Для гивзда всегда выбирается уединенное и мало доступное мъсто, гдв лебедь со своей лебедкой и остаются до твхъ поръ, пока двти въ состояній будуть слівдовать за ними на ріжи и другія боліве открытыя м'єста. П. И. Сушкинъ снабдиль меня следующей выпиской изъ его наблюденій надъ кликунами въ Уфимской губ.: "На камышистомъ озерѣ Шушгакъ-куль,—пишетъ онъ,—мнѣ удалось 3-го мая найти гивздо кликуна. Оно помъщалось среди камыша, на берегу небольшого пространства открытой воды. Вышиною оно было около аршина, а въ діаметр'є около т1/, аршина и было построено довольно искусно. Основаніе гитада составляли стебли и корни камыша, а главную массу – торфяной мохъ (sphagnum). На очень тонкой выстилкъ изъ иуха и перьевъ лежало 6 ящцъ ровнаго блъдно-съро-желтоватаго цвъта; яйца были сильно насижены; въ одномъ изъ нихъ, которое я вскрылъ на другой день, оказался уже сформировавшійся лебеденокъ. Самка сидъла на гибздъ въ то время, какъ самецъ плавалъ вокругъ. При приближеній лодки самка, предупрежденная крикомъ самца, слетъла въ воду и затъмъ объ птицы улетъли. Но, спустя не бол $= \frac{1}{4}$ часа, когда лодка была спрятана въ камышѣ, обѣ птиңы появились онять, опустились на воду и вскорф опять самка подплыла къ гифзду и взобралась на него. Однако, самецъ замѣтилъ что-то подозрительное; самка быстро сошла съ гитзда въ воду и заттъмъ приблизилась къ засадъ. Неудачный выстрълъ спугнулъ объихъ птицъ. Тъмъ не атоте на слъдующий день объ плино икаю игвло и тве этотъ

разъ самка была убита. Грудь и брюхо ея были сильно ощипаны, такъ что перья, выстилавийя гивздо, несомивнию принадлежали ей". Вылуинвинихся итенцовъ въ Уфимской губ, находять уже въ концѣ мая, по это въроятно ранніе. Въ Казанской птенцы выдунляются во второй половинть йоня. На шижней Печорть Зибомъ и Броунъ нашли итъсколько гивадъ кликуна, въ которыхъ было отъ 2 до 4 ящъ. Гивада были устроены въ заросляхъ ивняка изъ камыша и толстыхъ травяныхъ стеблей. Яйца имъють въ длину отъ 4,7 до 4,2 д. и въ діаметръ отъ 2,9 до 2,65 д. Когда птенцы подрастуть съ утку, родители уводять ихъ съ собою на ръку, гдъ и остаются до отлета, забираясь только на время линьки въ болве укромное мъсто. На Касийскомъ морв лебеди для линьки уплывають въ открытое море или къ дальнимъ островамъ, такъ какъ отлично знаютъ свою безномощность, благодаря одновременному вынаденію большихъ перьевъ, всятаствіе чего линяющіе лебеди, какъ и гуси, совершенно не могутъ летать въ продолжение одной или двухъ педъть, т.-е. до тъхъ поръ, пока новыя перья вырастуть и окрапнуть. Перелинявии, старыя итицы онять соединяются съ мододыми и, образовавъ стада отъ 10 до 50 штукъ, постепенно откэтовансванство амажда он дтегоди в наможит пово ви атоктет. отдыхать на косахъ, отмеляхъ и островахъ, а кормятся или по озерамъ, или летаютъ въ дуга и поля. Впрочемъ, осенью лебеди часто летятъ, минуя теченія р'якъ и придерживаясь озеръ, чего весною не д'ялають, такъ какъ озера вскрываются послъ рѣкъ. Пищу лебедя составляютъ водяныя растенія, водяныя насъкомыя, слизняки и многія другія вещества. Что касается времени осенняго пролета, то для средней Россіи онъ длится съ конца сентября до конца октября, если не говорить о ръдкихъ зимующихъ особяхъ. На Каспійское море пролетныя стада лебедей прибывають съ конца октября, и длится пролеть въ болже южныя части моря до декабря. На Черное море лебеди прилетаютъ около декабря".

122. Лебедь малый. Cygnus bewicki, Yarr.

Табл. 127.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 714.

Свѣдѣпія о распространеніп у насъ и образѣ жизип малаго дебедя совершенно шитожны. Временами онъ посѣщаетъ окрестности Варангеръ-фіорда, гиѣздится около Бѣлаго моря, въ дельтѣ Печоры, на Колгуевѣ и на Новой Землѣ. На пролетѣ бываетъ подъ Петербургомъ и въ Прибалтійскомъ краѣ, добытъ въ Курской губ., наблюдался въ Пермской и Астраханской. Повидимому, особи этого вида, гиѣздящіяся на Новой Землѣ, на Колгуевѣ и въ нашихъ сѣверныхъ тундрахъ, зимуютъ предпочтительно на морѣ у Британскихъ о—въ, пролетая туда отчасти норвежскимъ побережьемъ, отчасти Балтійскимъ моремъ, и только случайно попадаютъ съ этого пути въ бассейнъ Чернаго моря. Напротивъ, изъ западно-сибирскихъ тундръ малый лебедъ, повидимому, правильно пролетаетъ на зимовку на Каспіѣ.

По образу жизни, какъ кажется, сходенъ съ кликупомъ.

123. Лебедь шипунъ. Cygnus olor, J. S. Gmelin.

Табл. 128.

Мензбиръ, Итицы Россін, т. І, етр. 716.

Болѣе распростр. названіе: лебедь шипунъ.

Мъстныя названія: лебедь шинунг, лебедь шовкунг (на Дифстрф). Польск,—labedz gluchy.—Қалм,—суркура.

Инпунъ распространенъ въ настоящее время далеко не такъ шпроко, какъ кликунъ; кромф того, онъ занимаетъ болбе южную область, нежели кликунъ и малый лебедь, хотя мфстами гифздится вмфстф съ кликуномъ.

У насъ иншунъ въ больномъ количествъ гивздитея въ области Чернаго моря, именно: на Прутъ, на Дивстръ, о. Тендръ, Сарабулатскихъ о—вахъ близъ западной оконечности Крыма, на оо. Сиваша и въроятно во многихъ другихъ мъстахъ. Въ 50-хъ годахъ еще гиъздился въ Харьковской губ., но послъ перевелся.

Въ юго-восточной Россіи инпунъ въ большомъ количеств'в гивздится въ камышахъ по съверному побережью Каспійскаго моря, въ дельт'в Терека, на нижней Волт'в къ съверу до Саренты и на Сарпинскихъ озерахъ. Въ Оренбургскомъ кра'в иншунъ—правильно гивадящаяся итица, но вовсе не многочислениая. Въ Уфимской губ. онъ бываетъ только на пролет'в, по въ юго-западной части Пермской губ. (Полевская дача) гивадится, и, какъ говорятъ, даже въ большемъ числ'в, нежели кликунъ. Во вс'в части центральной Россіи шипунъ только залетаетъ, по какъ далеко къ с'вверу—я не могу опред'влить. Во всякомъ случать онъ бываетъ отъ времени до времени въ Тульской и Орловской губ. и на с'вверо-западъ долетаетъ до Польши.

Иннунъ зимуетъ на Черномъ морф и на Каспійскомъ побережьф Закавказья, хотя въ последнемъ месте не гивалится.

Сдъланное С. Т. Аксаковымъ описаніе шинуна такъ хороно извъстно всімъ охотникамъ, что приводить его здісь было бы излишне. Фактическихъ данныхъ о разныхъ явленіяхъ въ жизни этой птицы у насъ, къ сожальнію, чрезвычайно мало.

Добываніе лебедей.

Не будеть преувеличеніемъ, если мы скажемъ, что лебедь является скорѣе предметомъ случайной, нежели настоящей охоты. При осторожности этой птицы, подобраться къ ней—дѣло очень трудное. Поэтому охотники чаще всего и не пробуютъ подкрасться къ лебедю, а практикуютъ стрѣльбу изъ засады. Такая охота производится у насъ въ южной Россіи, особенно по нижнему теченію Волги, преимущественно осенью.

Замътивъ озера, па которыхъ кормятся лебеди, что безопибочно можно узнать по присутствію вырванной съ корнемъ травы, охотники подъ вечеръ садятся въ камыни, а гдѣ ихъ мало, устранваютъ шалани изъ хвороста или сѣна, и ждутъ, когда лебеди, прилетающіе на озера кормиться, подплывутъ на разстояніе выстрѣла. Само собою разумѣется, что ждать приходится долго и часто совершенно безуспѣнно, да и не во всякую почь можно стрѣлять. Тамъ, гдѣ лебеди не напуганы, ихъ можно сторожить такимъ образомъ и днемъ; по напуганные, они не остаются днемъ на озерѣ, а улетаютъ отсюда на большій водный просторъ, гдѣ имъ легче наблюдать за приближеніемъ врага, и гдѣ послѣднему невозможно укрыться отъ ихъ зоркаго глаза.

Удобиће всего стрћлять лебедя, когда онъ только что поднялся съ воды: тутъ онъ летитъ низко и медленио, и если охотникъ усићетъ заблаговременио спрятаться, въ такомъ случаћ его ожидаетъ върная добыча.

Совствить въ другомъ видт представляется промысловое добывание лебедей: и на югъ, и на съверъ промышленники пользуются для этого летними месяцами, когда лебедь линяеть и совсемъ не можеть летать вслъдствіе потери или слабости большихъ маховыхъ перьевъ. На такъ наз. Мертвомъ Култукъ Каспійскаго моря это добываніе лебедей носить названіе "гонки" и даеть уральскимь казакамь очень хороній заработокъ какъ въ видѣ цѣлыхъ шкуръ лебедя, такъ и въ видѣ нуха и перьевъ. Для гонки лебедей казаки собираются артелями человъкъ въ 15, подъ предводительствомъ старинаго или "артельнаго" и, запасшись всёмъ необходимымъ, выбажаютъ въ море въ кусовыхъ лодкахъ или салмовкахъ, на которыхъ держатъ для гонки особыя легкія и чрезвычайно вертлявыя лодочки, въ родѣ душегубокъ, такъ наз. "будары". Придя къ мѣсту лова, казаки высматриваютъ лебедей, спускають будары и начинають ловлю раннимъ утромъ. Прежде всего повцамъ предстоитъ отрѣзать лебедей отъ берега, для чего туда посылаются всѣ или и всколько бударъ, а когда это достигнуто, и лебеди, не имѣя возможности улетъть, плывутъ въ море, охотники гонятся за ними на бударахъ, пока птицы не выбьются изъ силъ. "Тогда ту, которая устала, - пишетъ г. Бобылевъ, - и дается въ руки, берутъ мирно, а ту, которая защищается, бьютъ весломъ. Ошеломленныхъ втасмівають въ лодку, подвернувъ имъ головы съ длинной шеей подъ плечевую кость крыла. После того несчастная птица безсильна. Очень

любонытно смотрать, какъ на восхода солица двадцать или нятнадцать черныхъ точекъ крадутся осторожно, какъ воры, подъ берегомъ, чтобы отръзать отъ него и отпутпуть лебедя въ море, и затъмъ всъ летять, какъ стръда, въ догонку. Этотъ последній ударъ очень интересенть и не легокъ. Лебедь сначала илыветъ быстро и уходитъ неръдко отъ преслъдователей изъ вида. Неопытные зрители могутъ предположить, что все потеряно; однако, теривніе и настойчивость -инф финти йониэтнобо и доло, и обезсилений птинф фини--оп ониудолитея водаться великодунием податься великодунием бъдителя. Но, —увы! — тщетно! Итица привозится на лодку, ръжется, съ нея едираютъ серебристую шкурку, которая выворачивается, чтобы не марать пуха и пера, потому что она очень жирна, пересыпается солью или смачивается тузлукомъ и убирается. Маховыя перья *) выдергиваются, доставляя писчее перо, а мясо ппогда солится и употребляется на варево, доставляя жирную похлебку. Лебедь могъ бы быть вкусенъ, если-бъ итица была выдержана и мясо ея вымочено. Къ сожалвийо, время лова, т.-е. болвзиенный періодъ линянія, когда нтица худветъ, соленая вода для варева, неимвніе приправъ, оставляеть ее худой, жесткой и безвкусной въ морф, гдф она даеть ифкоторый вкусь похлебкъ и смягчаетъ морскую воду".

Артели панимаются обыкновенно къ какому-шібудь частному предпринимателю издільно, коп. по 40—50 со штуки загнаннаго лебедя. Добыть въ день 150 штукъ на 15 человіжь считается плохой добычей: хорошій уловъ даетъ 300—400 лебедей въ день. Предприниматели получають отъ этого лова хорошій барышъ, по для казаковъгонка—промысель трудный и даже изпурительный. Къ тому же, они работають всегда на плохихъ харчахъ, даже варять на соленой водів, большею частію не иміють водки, и потому, при жестокой жарів, многіе изъ нихъ платятся тяжелымъ заболіваніемъ.

Сдѣлать подсчеть матеріальной выгодѣ отъ этого варварскаго способа истребленія лебедей нѣтъ шикакой возможности при полной безконтрольности промышленниковъ, по несомнѣнно, что этимъ способомъ истребляются тысячи лебедей.

Самобды точно такъ же пользуются неспособностью линяющихъ лебедей летать и, подилывая къ нимъ въ лодкахъ, убиваютъ стрѣлами изъ луковъ, или выгоняя на берегъ, затравливаютъ собаками и убиваютъ просто налками.

Наконецъ, по словамъ г. Михайлова, кореляки ловятъ лебедя капканами во время весеннихъ разливовъ. Капканы ставятся на мелкихъ мъстахъ; приманкою служитъ пучокъ травы. Завидъвъ зеленую травку, лебедь опускаетъ въ воду свою шею, но капканъ схватываетъ его за голову и убиваетъ мгновенно.

^{*)} Которыя еще не выпали.

124. Гусь бѣлый. Anser hyperboreus, Pall.

Табл. 129.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. 1, стр. 722.

Мѣстное названіе: бівльні тусь.

Якут. юридить-касъ.— Ост.—унидла-хошешть (Берез.)—Ламут. пилиили. – Юрац.- самобд.— варакъ.

Бълый гусь ръдкая залетно-пролетная птица Европ. Россіи, гдъ, новидимому, чаще другихъ мъстъ встръчается въ области Волги. Упоминается для Пермской и Оренбургской губ., небольшими стайками, штукъ до 10, бываетъ на пролетъ подъ Астраханью. Радде говоритъ со словъ охотниковъ, что эти итицы встръчаются зимою на Касийскомъ моръ въ Кизилъ-Агачскомъ заливъ между многими дикими гусями небольшими стаями, которыя очень пугливы.

По свъдъніямъ, сообщеннымъ Кесслеромъ, облые гуси были замъчены въ 1851 г. въ окрестностяхъ Кіева и имъ самимъ одинъ, въ стаъ другихъ, надъ самымъ городомъ.

125. Казарка черная. Anser brenta, Briss.

Табл. 130.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 724.

Бол ве распростр. названія: черная казарка, нівмокъ.

Мѣстныя названія: пъмокъ (на Ленѣ и въ Камчаткъ); морской гусь, казарка (Петербург. губ.); ревушка (у поморовъ); черная казарка (Бѣлое море). Эст.—lagel, lagles.—Фин.—sepelhanli, mustakanhi.

Эст.—lagel, lagles.—Фин.—sepelhanhi, mustahanhi. Якут. — хардыръ - хасъ. — Ламут. — каркаллу. — Қор. — ветшопоаль. — Қамч. теридъ.

Черная казарка несомивино гивздится на Колгуевъ и на Новой Земл'в и, быть можетъ, гивздится на Вайгач'в. Прилетаетъ сюда двумя нутями: со стороны Варангеръ-фіорда, следуя берегомъ Кольскаго полуо — ва къ Канинскому и отсюда на Вайгачъ и Новую Землю, и со стороны Балтійскаго моря. Послідній путь начинается изъ южной чаети Балтійскаго моря двумя в'втвями: одна идетъ черезъ Лифляндію и Пейнусъ къ Финскому заливу, другая приводитъ сюда эстляндскимъ побережьемъ. Перелетъвъ черезъ Финскій заливъ, казарки собираются на Аландскихъ о—вахъ и пюландскомъ побережьи и отсюда направляются черезъ озерную область къ Бѣлому морю, минуя Архангельскъ, гдв только изръдка встрътится заблудивнійся экземплярь этой итицы. Долетьвъ до горда Бфлаго моря, стан едфлуютъ вдодь восточнаго берега Кольскаго полуо-ва, черезъ Поной, Три острова, Сосновецъ, Моржовець, и затімь направляются къ Новой Землів. Вив этихъ пролетныхъ путей черная казарка встръчается въ нашей странъ только случайно, сбивнинсь съ дороги или следуя за другими гусями.

Такъ она бываетъ въ Польшт, въ центральной Россін, б. м. на озерахъ къ востоку и западу отъ южныхъ частей Уральскаго хребта и не лишено въроятія, что попадаетъ даже на Черное море.

На Балтійскомъ морѣ весенній пролетъ длится съ конна апрѣля но конецъ мая, осенній — въ теченіи сентября и октября. Черная казарка летитъ больними массами, особенно на осеннемъ пролетѣ, но въ разные годы количество ея сильно колеблется въ зависимости отъ состоянія полярнаго лѣта.

126. Казарка бѣлошекая. Anser leucopsis, Bechst.

Табл, тзт.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 727.

Мъстныя названія: Эст. — lagles, pugala lagles. — Φ un. — valkeaposki manhi.

У насъ бѣлощекая казарка встрѣчается только на пролетѣ, въ то же время и на тѣхъ же пролетныхъ путяхъ, что и предыдущій видъ, т.-е. въ области Варангеръ-фіорда съ одной стороны, и на побережьѣ Прибалтійскаго края, на Чудскомъ озерѣ, на побережьѣ Нетербургской губ., въ южной береговой полосѣ Финляндіи и на Аландскихъ о-вахъ съ другой. Въ очень рѣдкихъ случаяхъ отдѣльныя особи залетаютъ въ Польшу. Съ Финскаго залива, конечно, летитъ къ Бѣлому морю, но правильнаго пролета здѣсь бѣлощекой казарки еще шкому не удалось наблюдать, отдѣльные же экземпляры залетаютъ и подъ Архангельскъ. Какъ гиѣздящаяся птица бѣлощекая казарка можетъ быть приписана у насъ только Колгуеву, гдѣ очень немногочисленна, и Новой Землѣ.

127. Казарка краснозобая. Anser ruficollis. Pall.

Табл. 132.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. 1, стр. 730. Болъе распростр. названіє: краснозобая казарка.

Мѣстныя названія: чаквой, морекая казарка (на Оби); рыжешейка, рыжешеяя казарка, цвышная казарка (Сарпа); чубарая казарка (на Ураль).

Краснозобая казарка гифздитея въ тундрахъ западной Сибири отъ нижней Оби до пижияго Енисея, едва ли удаляясь отъ морского берега на гифздовъф далфе 500 веретъ. Такъ какъ эта итица зимуетъ только въ южной части Касийскаго моря, естественно, что и область ея правильнаго пролета представляетъ собою довольно узкую полосу, за предфлы которой краснозобая казарка залетаетъ лишь рфдко и случайно. Вотъ какъ я опредфлилъ въ свое время пролетный путъ краснозобой казарки:

"Пролетный путь краспозобой казарки начинается на сфверф въ долинъ р. Таза, затъмъ переходить на шижиюю Обь и отсюда на Пртышъ. Съ Пртыша опъ продолжается по Тоболу и такимъ образомъ доходить до р. Урала въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ него внадаетъ р. Орь. Отсюда краснозобая казарка сконявьть эмерожительного детить примочения степта и образоваться в собразования в с стень къ Калмькову на Ураль, верстахъ въ 200 отъ устья ржи, потомъ спускается по Уралу къ Цаснійскому морю и вдоль берега поеліздняго долетаеть до его южной части, гдіз и остается зимовать. Только небольнюе число краснозобой казарки пролетаеть долиною рфки Урада въ ся среднемъ теченін и съ Тобода детить прямо черезъ Киргизскія степи Западной Спопри жь шижнему теченію Сыръ-Дарыі, вфроятно следуя отсюда побережьемы Аральскаго моря и далес онять-таки долетая до южной части Касийскаго моря. На обратномъ пролеть весною масса краспозобой казарки, подиявишеь къ съверу до устыя Волги, частью продолжаеть летать правильнымъ путемъ, т.-е. къ устью р. Урала, на Калмыковъ, Орскъ, Тоболъ и т. д., часть же сворачиваеть на Волгу и подшимается ся долиной до Саренты, останавливаясь на короткое время на Сарит, откуда вылетаеть на р. Ураль къ Уральску. Отдъльныя стайки краснозобой казарки и весною и осенью летять вить главнаго пролетнаго пути, особенно въ киргизскихъ степяхъ, останавливаясь по ръкамъ и озерамъ, и отчасти самостоятельно, отчасти увлекаясь за другими гусями, даже совершенно сбиваются съ дороги. Такимъ образомъ у насъ краснозобая казарка залетаетъ къ Архангельску, въ Финляндію, въ область Камы, средней Волги и Оки и даже въ Польшу и Новороссійскій край. Многія особи пролетаютъ даже далье и, за исключеніемъ Пспаніи, въ Европъ пътъ страны, гдъ бы не была найдена краснозобая казарка. Въ Азіи эта птица залетаетъ на востокъ до Пркутска".

Что касается времени пролета, то изъ южной части Каспійскаго моря краснозобая казарка отлетаетъ уже въ послъднихъ числахъ февраля, и въ началъ марта появляется подъ Астраханью. Однако дальнъйшее движеніе къ съверу изъ Киргизскихъ степей описываемая казарка начинаетъ лишь въ апрълъ, едва ли прибывая на мъста своего гиъздовья ранъе конца мая. Осенній отлетъ съ родины начинается въ первой половниъ сентября, въ концъ сентября и въ октябръ казарки тянутъ черезъ киргизскія степи, въ ноябръ прилетаютъ на свою зимовку.

128. Казарка бѣлолобая. Anser albifrons, Scop.

Табл. 133.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 133.

Болѣе распростр. названія: казарка былолобая, казарка.

Мъстныя названія: казарка (б. пли м. повсемъстно); ередняя, бъло-лобая казарка, казарка: лысушка, плышивка (Екатеринб., Шадринск. у.); казарка, казара, тусь казапокъ (на Сарпъ); таркавый тусь (въ Малоросс.); каргарка (на Диъстръ); тугайка (въ Сибири).

Фин. — iso kiljuhanhi. — Моиг. — ачинъ. — Кал. — шошинаръ-галимъ. — Башк. — кири-касъ. — Тунг. — иллли. — Лам. — каркилу. — Вог. — лукъ. — Ост. — кирри-семъ. ай-лоитъ. — Самоъд. — сингерее. — Якут. — люлюя, ханъ-халисъ. —

Камч.-кепрешь, кересидъ.

Бълолобая казарка гифздится на Каппискомъ полуостровъ, на Колгуевъ и на Новой Землъ, повидимому не гифздится на Вайгачъ и не наблюдалась на нижней Печоръ. На пролетъ встръчается во всей Европ. Россіп, за исключеніемъ Лапландіи и внутреннихъ частей Финляндіп, но въ большомъ количествъ конечно по такъ наз. пролетнымъ нутямъ, которые ведутъ къ ея гифздовой области съ зимовокъ, т.-е. съ Средиземнаго, Чернаго и Каспійскаго морей.

Такъ какъ панимъ охотникамъ приходится имѣть дѣло съ пролетными казарками, я дополню эти свѣдѣнія слѣдующею выдержкою изъ моей кинги "Итицы Россіи".

"Подобно другимъ гусямъ, бълолобая казарка на пролетъ и зимою является въ высшей степени общественной птицей. Трудно представить себѣ тѣ стан, которыя собираются, наприм., въ стеняхъ, лежащихъ верстъ на 10—15 отъ низовья Дифстра и его лимана. А. А. Брауперъ говоритъ, что во время пролета казарокъ здѣсь вѣчно слыненъ неумолкаемый крикъ безчисленныхъ табуновъ, которые утромъ съ больнихъ озеръ и съ лимана летятъ въ стень на кормежку, а вечеромъ, часто уже въ сумерки, снова тянутъ къ водѣ. Иногда бываютъ табуны въ иѣсколько тысячъ штукъ, но чаще по иѣсколько сотъ. Въ Крыму бѣлолобая казарка держится обыкновенно съ конца сентября

до марта, но въ очень суровыя зимы казарки въ декабръ удетаютъ южигве. Въ юго-западномъ углу Каспійскаго моря бълолобыя казарки и осенью прилетаютъ поздиве, въ октябръ, и весною улетаютъ рашье, въ февралъ. Но при дальнъйшемъ течении время пролета на понтійскомъ и каспійскомъ пути сравнивается, такъ какъ, прилетфвиш въ область нижней Волги и Урала, казарки дѣлаютъ здѣсь продолжительныя стоянки, и подъ Оренбургомъ главный пролетъ ихъ бываетъ только въ половинт апръля, на свои же лътнія квартиры за полярнымъ кругомъ бълолобая казарка прилетаетъ цълымъ мъсяцемъ ноздиће, а то и болће. Надо, впрочемъ, сказать, что казарки не летятъ годъ изъ году по одићиъ и тимъ же виточкамъ главныхъ пролетныхъ путей. Ипогда какія-то причины заставляють ихъ мѣнять старую излюбленную дорогу на новую, и тогда вмфстф съ измфненіемъ направленія пролетнаго нути изм'вняются и м'вста стоянокъ. Весьма возможно даже, что именно измънение условий стоянокъ и добывания корма заставляетъ казарокъ мънять малые пролетные пути. Въ разгаръ пролета описываемыя птицы летятъ стаями, которыя часто непосредственно следують другь за другомъ, на разстоянін одной или полутора версты, пролетая надъ одними и теми же озерами, селеніями, деревьями и т. д. Летятъ обыкновенно очень высоко, или косой линіей или тупымъ угломъ, и время отъ времени мъняются мъстами, при чемъ стая временно смъщивается, но потомъ опять выстранвается. Иногда, въроятно при усталости, линія казарокъ начинаетъ сильно, волнообразно колебаться или изъ стороны въ сторону, или сверху внизъ; на полетѣ казарки, подобно другимъ гусямъ, держатся вытянувъ впередъ шею и быстро, и сильно машутъ крыльями. Хотя въ разгаръ пролета казарки летять и днемъ и ночью, но предпочтительно пролетъ происходитъ ночью, днемъ же стада останавливаются на отдыхъ и чтобы пастись. Ночью казарокъ безъ труда можно опредълить по ихъ крику, который хотя и напоминаетъ собою крикъ съраго гуся, но болъе трубный и чаще повторяется".

129. Казарка малая бѣлолобая. Anser erythropus, L.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 740.

Мъстныя названія: малая казарка, пискулька (Пермск.). Фин.—kiljhuhanhi, killiohanhi.—Лаил.—руёдди-чуонья, тьюонья, уккачуоньялась, къльшиньюнчуонья, шибенъ-юдие-чуонья.

Повидимому, малая казарка только въ Лапландіи гивздится одна, безъ своего болве крупнаго родича, на Канинскомъ полуо—въ гивздятся оба вида, еще далве на востокъ, насколько можно судить по пролету малой казарки въ восточной Россіи и по ея отсутствію на Колгуевъ и Новой Землъ, она, въроятно, гивздится вмъстъ съ большой бълолобой казаркой въ полярныхъ странахъ Сибири.

Въ небольшомъ числъ найдена на пролеть въ Польшъ и Петербурской губ., и нормально пролетаетъ береговой областью Финляндін и подъ Архангельскомъ, направляясь въ Канинскую тундру. Въ средней Россіи малая казарка бываетъ только случайно, что стоитъ въ связи съ тъмъ, что она не зимуетъ на Черномъ моръ. Напротивъ, на Каспійскомъ моръ этотъ видъ зимуетъ въ большомъ количествъ, и потому не удивительно, что онъ обыкновененъ на пролетъ отсюда но Волгъ и Камъ въ западную Сибирь или обратно.

Мы не даемъ рисунка этого гуся, потому что, кром'в величины, онъ инчъмъ не отличается отъ предыдущаго вида.

130. Гуменникъ. Anser segetum, Gm.

Табл. 134.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 741.

Болѣе распростр. названія: гуменникъ, гусь гуменникъ.

Мѣстныя названія: пуменникъ (Поволжье), ейбирякъ (Казан. губ.); ньмтырь, ньмая казарка, хрушкой (Пермек. губ.); пусь, дикій пусь (у помор.). Пол.—ges polna, ges zbožowa.—Фин.—hanhi, isohanhi, komahanhi, metsähanhi.—Лоп.—чонъ, чуонья, етуора чуонья.

Говоря вообще, гуменникъ гифздится южифе бфлолобой казарки, по кой-гдф оба гуся гирэдятся вмъсть. Въ Лапландін, за псключеніемъ морского побережья, гуменникъ вездъ обыкновененъ. Въ Финляндін гивадится къ югу до 62° с. ш., но въ широкой прибрежной полосъ Ботинческаго залива бываеть только на пролеть. Отдъльныя парочки гивзаятся даже кой-гав въ Лифляндіи. На востокъ отъ Лапландіи и Финляндін гуменникъ гибздится подъ Архангельскомъ, на Колгуевъ, на Новой Землъ и въ тундрахъ по нижнему теченію Печоры. Въ Зауральской области гуменникъ, по всей въроятности, гитздится къ югу до 75° с. ш. Нормально гуменникъ зимуетъ на Черномъ морѣ, прилетая въ Крымъ въ концт сентября и улетая отсюда въ половинт марта, по большимъ ръкамъ Закавказья, и въроятно, на Каспійскомъ морф; но въ мягкія зимы опъ остается даже на Балтійскомъ морф. Распространеніе гуменника въ періодъ гитьздованія и его зимовки въ достаточной степени объясняютъ намъ, что на пролеть онъ встръчается во всей Россін; однако псключительно онъ принадлежитъ только западной и центральной части страны; въ восточной Россіи онъ очень ръдокъ, уступая свое мъсто красноносому гуменнику, который въ свою очередь не встръчается уже въ центральной Россіи.

131. Гуменникъ красноносый. Anser neglectus, Suschk.

Табл. 135.

Этотъ гуменшикъ, отмъченный и описанный Н. П. Сушкинымъ уже по выходъ въ свътъ монхъ "Птицъ Россіп", по экземплярамъ, добытымъ на пролетъ въ Уфимской губ., и до сихъ поръ чрезвычайно мало извъстенъ по своему распространенію. Правда, Треворъ Бэтти, новидимому, наблюдалъ его на Колгуевъ и Зибомъ упоминаетъ гуменниковъ, подходящихъ къ красноносому, съ Новой Земли, но все это пока еще гадательно. Поэтому охотники изъ восточной Россіи и занадной Сибири могутъ очень помочь выяспенію вопроса о распространеніи красноносаго гуменника сообщеніемъ о немъ своихъ свъдъній. Помимо превосходнаго рисунка, прилагаемаго къ этой статът и сдъланнаго Лоджемъ, надо имъть въ виду, что при общемъ сходствъ съ гуменшикомъ красноносый имъетъ лапы и середину клюва мясного, а не оранжеваго цвъта.

Привожу слъдующее картинное описаніе повадокъ этого гуся на пролеть со словъ П. П. Сушкина.

"Весною, съ 16 апръля и кончая 3 мая, иншетъ онъ, я наблюдалъ подъ Уфой и въ окрестностяхъ Шунгакъ-куля стан, иногда очень большія, какихъ-то гуменниковъ; гуси співшно летівли на с.-в.; построеніе стаїї было угломъ или прямою линіей, косо расположенной относительно направленія пролета. Судя но тімъ результатамъ, которые далъ осений пролетъ, я склоненъ думать, что по крайней мъръ значительная часть этихъ стай состояла изъ краспоносаго гуменника. Осенній пролеть красноносаго гуменника въ 1901 году начался 21 сентября, послъ отлета съраго гуся; такое соотношение, по словамъ башкиръ, является правиломъ. Послъ полудия въ этотъ день были замъчены 4 большія стан краспоносаго гуменника, около сотни штукъ въ каждой, летъвния на ю.-з.-ю.; построение одной изъ нихъ было утломъ или "ключомъ", а три изъ пихъ были построены такъ, что отъ объихъ сторонъ угла отходило вбокъ по одной линіи, перпендикулярной къ направленію пролета. Голоса пролетныхъ гусей слышались и почью, и на следующій день на жинвахъ, озимыхъ поляхъ н

степи, въ окрестностяхъ Шунгакъ-куля была масса этихъ гусей. Многія м'вста представляли издали такой видъ, какъ будто за ночь ихъ раснахали плугомъ, - до того они почернъли отъ покрывавнихъ ихъ гусиныхъ стай. На слъдующій день гусей стало еще больше. Все время стояла ясная осенняя погода и постепенно становилось все холоди ве. На 29 и 30 сентября я съфздилъ на Аслы-куль. Въ окрестностяхъ озера я наблюдалъ 29 сентября такую массу гусей, что всякое описание должно показаться бледнымь въ сравнении еъ действительностью. Летящія на озеро стан могли бы буквально затміть евітть солица, а когда гуси поднимались съ полей, то отъ массы итицъ буквально рябило въ глазахъ, гуси мелькали, какъ хлонья енъга въ неногоду. Къ ночи стало морозить, при ясной погодъ и сильномъ вътръ, и уже на елъдующій день гусей было зам'ятно меньше, і октября я былъ снова на Шунгакъ-кулъ; погода измънилась, енъгъ и дождь чередовались еъ ясной морозной погодой, которая затьмъ опять смъпялась оттепелью, и количество гусей все убывало. Послъдне гуси въ небольшихъ стайкахъ наблюдались 4 октября.

"Образъ жизни краспоносаго гуменника во время остановокъ на пролеть довольно прость; кормятся гуси въ поль или степи, ночують на озерахъ и широкихъ старицахъ и туда же летаютъ пить въ теченіе дня. Восходъ солнца уже застаетъ гусей на кормежкъ. Тамъ и сямъ, по жниву и озими или степи, темными пятнами разбросаны жирующія стан гусей и лишь изр'ядка покажется запоздалая небольшая стайка, которая съ крикомъ летитъ съ озера нрисоединиться къ своимъ товарищамъ. Пасущіеся гуси понемногу подвигаются всею стаей дальше и дальше, оставляя после себя порядкомъ-таки помятую озимь, и потихоньку перекликаются между собою; изр'ядка лишь слышны звонкіе голоса вожатыхъ-почти всегда при приближении какой-либо опасности. При приближении охотника гуси загогочутъ, стая взлетитъ, и если выстръла не было, опустится снова саженъ черезъ сто-полтораста, какъ бы испытывая терпъніе охотника. Къ полудию гуси успъваютъ насытиться, ъдятъ болъе лъниво, по временамъ съ крикомъ расправляютъ крылья и, наконецъ, стая снимается и летитъ на воду. На полуденный водопой различныя стан прилетають въ различное время; обыкновенно можно застать гусей днемъ на водъ отъ 11 до 2 часовъ дня, но если погода стоитъ сухая и солнышко замътно пригръваетъ, то гуси начинаютъ летъть на воду уже съ 10 часовъ, а если погода сырая, особенно если выпалъ сиъжокъ, то многія стап проводять на кормежкт весь день, довольствуясь тою влагой, которой смоченъ кормъ. Прилетъвшая на воду стайка иногда дълаетъ кругъ прежде чемъ сесть, а обыкновенно прямо спускается съ довольно большой высоты. Странно вид'ьть, что, опускаясь на воду, гусь иногда кидается книзу очень быстро, головою впередъ, дѣлая при этомъ такіе повороты, что имъ можетъ позавидовать любая изъ настоящихъ утокъ. Не зная этой повадки, я неръдко упускалъ случай выстрълить по гусямъ: летитъ стая высоко внѣ выстрѣла-и вдругъ гуси кидаются

киизу съ такою быстротой, что слышится свистъ, и пропосятся мимо самой засады. Стайка падаеть на воду обыкновенно подальше отъ берега; гуси усядутся, нопьють воды, выкупаются и затёмъ синмаются и снова летять въ полет на смъну имъ летятъ новыя стайки и, хотя каждая проводить на водь не болье получаса, все время водоноя на озеръ есть гуси, и въ воздухъ стоитъ сумятица отъ прилетающихъ и улетающихъ стай. Особенно удобно наблюдать всю эту картину на какомъ-либо небольшомъ озеркЪ, гдЪ гуси должны по необходимости сильнъе скучиваться. Еще интересиъе картина прилета гусей на озеро на ночь. Чтобы наблюдать ее полностью, я садился въ засаду часовъ съ трехъ но полудии. Время водоноя уже прошло; на озерѣ остаются лишь отдъльныя, запоздалыя стайки; векорф слетають и эти гуси; подобраться къ нимъ на выстръль было бы трудно, да, кромъ того, стръльба, навърное, помъщаетъ дальнъйшимъ наблюденіямъ. Устроивъ себф засаду гдв-либо въ камышф или кустахъ, я усаживался въ ней, чтобы уже не трогаться съ мъста до самаго прилета гусей; какъ будетъ ясно изъ последующаго, надо наклонить или связать ветки такъ, чтобы сидящаго въ засадъ человъка по возможности не было видно сверху. Съ отлетомъ последнихъ стаекъ гусей на озере наступаетъ тишина, прерываемая лишь попискиваніемъ князьковъ и запоздалыхъ болотныхъ овсянокъ. Отъ времени до времени налетаютъ и садятся на озеро стайки утокъ, но опять-таки по нимъ не приходится стрълять, а къ тому времени, когда уже приближается прилетъ гусей на ночевку, утокъ необходимо прямо спутнуть, иначе онв испортять все двло, Гуси, да и не только краснопосый, а и всф, какихъ миф приходилось наблюдать, садятся на воду обыкновенно съ большими предосторожпостями, но разъ уствишсь, они успоканваются, и охотникъ ради удобнаго выстрала можеть даже высунуться изъ засады, особенно подъ вечеръ, когда начнетъ темнъть; утки, напротивъ, кидаются на воду очертя голову, но большинство изъ шихъ, особенно кряковая, все время зорко смотрять по сторонамъ, и лишь какая изъ нихъ замътитъ чтолибо неладное, закрякаетъ, и всъ перемъстятся подальше отъ подозрительнаго сосъдства и взбудоражать другихъ птицъ, сидящихъ тутъ же.

"Приблизительно за часъ — полчаса до заката солица является на озеро передовой гусь, вожакъ какой-либо большой стан. Держась все время на высотть не мешъе какъ двойного выстръла, гусь летаетъ надъ берегами озера, избраннаго для ночлега или, если озеро большое, разбитое полосами камыша на рядъ болъе мелкихъ пространствъ незаросшей воды, то надъ краями такого пространства. Все время издавая свой громкій, двусложный крикъ, гусь кружитъ надъ озеромъ, отлетаетъ изсколько въ сторону, онять возвращается и надъ каждымъ сколько-нибудъ соминтельнымъ предметомъ дълаетъ изсколько круговъ; если охотникъ, сидящій въ засадъ, замътитъ, что гусь кружитъ надъ нимъ, то тутъ уже не надо шевелиться. Иногда гусь слетаетъ еще на какое-либо озерко пососъдству, посмотритъ тамъ и вернется снова доканчивать свой осмотръ. Послъ этого гусь онять летитъ на

поле и спустя и жоторое время, приблизительно съ четверть часа, уже совсъмъ на закатъ солнца, возвращается въ сопровождени другого и осмотръ начинается снова. Теперь опи летаютъ надъ озеромъ замѣтно ниже, и громкій крикъ постоянно чередуется съ тихимъ гоготаньемъ, — гусн какъ бы переговариваются. Я склоненъ думать, что передовой гусь — самецъ, а второй — самка; мит казалось всегда, что второй гусь меньше; голосъ его далеко не такъ зыченъ. Этотъ осмотръ вдвоемъ заключается тъмъ, что оба гуся спускаются на средину озера, выньють воды, встрепенутся и затімь взлетають снова. Второй гусь опять летаетъ у береговъ озера, уже гораздо ниже, такъ что удачный выстрѣлъ пожалуй могъ бы его свалить, а передовой инирокими кругами забирается все выше и выше, и крикъ его среди вечерняго затишья раздается все громче и громче. Наконецъ съ поля, съ той стороны, откуда явился передовой гусь, слынштся какой-то неопредъленный звукъ, сначала едва слышный и постепенно все усиливающійся. Это тронулись гуси съ поля. Звукъ становится все слышиће и слышиће, становится яспо, что это не непрерывный гулъ, а сумма многихъ сотенъ голосовъ, и передовой гусь отправляется навстрѣчу приближающимся полчищамъ. Крикъ усиливается до невъроятія, слышенъ шелестъ сотенъ крыльевъ, какъ свистъ бури, несущійся но вершинамъ лъса,— и гуси начинаютъ надать на озеро со всъхъ сторонъ, сначала на средину, а затъмъ ближе и ближе къ краямъ. Отъ гусинаго гоготанья, именанья по водъ, хлопанья крыльями шумъ поднимается невообразимый; однажды въ такой моментъ у меня осфклось шомпольное ружье и рѣзкій щелчокъ пистона нисколько не обезпокоплъ гусей; въроятно они его и не слыхали. Понемногу все успоканвается и слышится успоконвающее, тихое гоготанье стариковъ. Если погода стоитъ не вполн'я тихая, то гуси всегда гребутъ противъ вътра и сбиваются подъзащиту камышей или кустовъ на ту сторону озера, которая обращена къ вттру; выходятъ ли они на берегъ, мнт не удалось зам'ятить. На громадномъ Аслы-кулъ, берега котораго на большей части своего протяжения голые и во многихъ мъстахъ обрывистые, гуси въ тихую погоду ночують на срединѣ озера и только въ сильный вътеръ уплываютъ подъ защиту береговыхъ обрывовъ. Къ сожалѣнію я не могъ съ точностью замѣтить, производится ли и на Аслы-кулѣ предварительный осмотръ озера стариками; миѣ казалось, что тамъ этого не бываетъ. На утро, чуть свътъ, гуси, проголодавшіеся за ночь, отдъльными стайками снимаются съ воды и снова летять въ поле. Такъ какъ охота на одномъ и томъ же небольшомъ озерк в можетъ производиться черезъ день, при чемъ въ послъдующія охоты гуси вовсе не кажутся болѣе осторожными, чѣмъ въ первую, то я думаю, что стоянки красноносаго гуменника въ окрестностяхъ Шунгакъ-куля длятся менъе двухъ сутокъ. Отлетъ стай, останавливавшихся на дневку, происходить, насколько я могъ замътить, послъ полуденнаго водопоя и послѣ ночевки на водѣ; стая снимается и летитъ уже не въ поле, откуда пришла, а далъе по направленію пролета".

132. Гуменникъ коротконосый. Anser brachyrhynchus, Baill.

Табл. 136.

Мензбиръ, Итицы Россіи, т. І, стр. 746.

Коротконосый гуменникъ, сходный съ красноносымъ по окраскъ клюва и запъ, по отличный по окраскъ крызьевъ (у него переднія изъ большихъ кроющихъ предплечья свѣтло-голубовато-сѣрыя, одного цвѣта съ верхними кроющими кисти), найденъ у насъ гиѣздящимся около Колы. Упоминаемые Н. Н. Сомовымъ гуменники съ розовымъ носомъ и лапами едвали относятся къ этому виду: скорѣе къ преднествующему, столь обильному на пролетѣ въ восточной Россіи, откуда можетъ легко залетѣть въ Харьковскую губ. Напротивъ, коротконосый гуменникъ, какъ гиѣздящійся на Шпицбергенѣ и на Кольскомъ нолу—вѣ, едва ли спускается такъ далеко къ югу и тѣмъ болѣе едва ли удаляется на такое большое разстояніе отъ моря.

Крыло коротконосаго гуменника не болбе $17^{1/2}$ д., длина верхняго клюва менбе 2 д.

133. Гусь сѣрый. Anser cinereus, Meyer.

Табл. 137.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 748.

Болье распростр. названія: гусь, стьрый или дикій гусь.

Мъстныя названія: гусь, дикій гусь, спрый гусь: ричшикь, ричшой гусь,

туменишкъ; сърякъ (на Камф); туски (Малоросс.).

Польск.— ges gegawa.— Эст.— mets ani.—Лат.— mescha sohs.— Фин.— harmaa hanbi.— Вог.— лунда, яхъ, ялунтъ.— Ост.— югантъ-лонтъ, лонтъ.— Самоѣд.— чункъ, на Еннсеѣ — йетту, дъётто, на Кети — тёку.— Тат.— касъ.— Чув.— хоръ, хуръ. Морд.—мази.— Черем.— камба.— Вотяц.— сшад-шекъ.— Мон.— галу.— Калм.— галунъ.— Тунг.— пунгнаки.

"Область гивздовья свраго гуся, —писалъ я въ общемъ очеркв образа жизни и повадокъ этой итицы въ "Птицахъ России", —лежитъ не только юживе области гивздовья казарокъ, по и области гивздовья гуменника, хотя на Кольскомъ полу—вѣ эти гуси встрѣчаются въ изкоторыхъ мъстностяхъ вмѣстъ. Нѣтъ никакого сомивнія, что сѣрый гусь прежде былъ распространенъ у насъ болѣе, нежели теперь; причина этому лежитъ не столько въ прямомъ преслъдованіи описываемой птицы человѣкомъ, сколько въ измѣненіи вида страны подъ вліяніемъ увеличивающейся густоты населенія; чѣмъ менѣе глухихъ мѣстъ, гдѣ исключительно гивздится сѣрый гусь, тѣмъ рѣже онъ встрѣчается въ извѣстной мѣстности. Но и въ настоящее время онъ еще распространенъ очень шпроко и мы постараемся сообщить объ этомъ возможно полныя свѣдѣнія, такъ какъ едва ли можно сомиѣваться, что Европ. Россія и Западная Сибпрь съ Туркестаномъ являются коренной областью распространенія сѣраго гуся.

"На Кольскомъ полу—вѣ сѣрый гусь занимаетъ двѣ обособленныя области: одна прилежитъ къ Варангеръ-фіорду, другая къ Ботническому заливу; въ другихъ же мѣстахъ полу—ва гусь не встрѣчается. Послѣдняя область продолжается и въ собственно Финляндію, гдѣ сѣрый гусь гнѣздится въ широкой береговой полосѣ Ботническаго и Финскаго заливовъ, являясь обыкновеннымъ въ Улеаборгской губ. и

ръдкимъ южиће; внутри страны гиъздящимся не найдеиъ. Едва ли можно сомитваться, что эта птица гитадится въ южной части Олопецкой и юго-западной части Вологодской губ., и виф всякаго сомивнія гивадится въ области верхней Волги, хотя адъсь чаще наблюдается на пролеть. Далье на востокъ сърый гусь еще встръчается въ Костромской и Вятской губ. и на Камъ, не подшимаясь, однако, съвернъе 596 с. ш. Что касается другихъ частей Пермской губ., то въ Богословскомъ округь сърый гусь уже не гизадится, хотя не внолив взрослыя особи встръчаются здъсь цълое лъто; однако въ Ирбитскомъ и Верхотурскомъ у, въроятно гибадится и уже несомивино и въ огромномъ количествъ гиъздится въ камышахъ степныхъ озеръ и ръкъ Екатеринбургскаго и особенно Шадринскаго и Челябинскаго убздовъ. Въ области средней и нижней Волги и во всемъ Пріуральскомъ крав стрый гусь еще очень обыкновененъ. Въ шестидесятыхъ годахъ Н. А. Съверцовъ нашелъ его обыкновеннымъ по всему среднему теченію р. Урала, отъ устья Илека почти до Уральска, откуда теперь, какъ говорить Н. А. Зарудный, гусь почти совсемъ вытесненъ. Однако по Плеку, Хобд'в и по камышистымъ, часто солоноватымъ степнымъ озерамъ и болотамъ эта птина еще очень обыкновенна. По Волгѣ сѣрый гусь тивадится до взморья.

"Что касается средней Россіи, то здѣсь сфрый гусь наиболѣе вытеснень человекомъ и совсёмъ, напр., пересталь гиездиться въ Тульской губ. Зд'ясь онъ даже на пролет'я р'ядокъ, такъ какъ собственно пролетные слъдують или восточиве или западиве. Однако въ губерніяхъ Рязанскої, Владимірскої, Ярославскої и Новгородскої гусн еще гивздятся. Въроятно гивздится хоть отдъльными парами въ Петербургской губ. и, по свидътельству Руссова, гизадится въ Прибалтійскомъ краф по озерамъ, лежащимъ недалеко отъ морского берега, напримъръ на Неххачскомъ озеръ. Относительно Польши мы имфемъ следующія сведенія. Въ тридцатыхъ годахъ серые гуси гифздились въ болотахъ по р. Бзурѣ въ Ленчицкомъ уѣздѣ, но затѣмъ въ качествъ гиъздящихся птицъ перевелись и теперь встръчаются въ Польшф только на пролетф, по гораздо рфже гуменника. Къ югу отсюда сърый гусь гизэдится, и мъстами даже неръдокъ, въ губернияхъ, расположенныхъ по Дивпру и Дону, такъ что можетъ считаться гивздянцимся для всей южной полосы Россін. Гивздится въ небольшомъ числъ даже въ степной части Крыма, гдъ остается и на зиму, и обыкновененъ здъсь на пролетъ. Что касается Кавказа, то здъсь сърый гусь гивздится какъ на съверномъ Кавказъ, по рр. Кубани и Тереку, такъ и въ Закавказъв на Гокчайскомъ оз. и на островахъ Каспійскаго моря. Пролетные пути съраго гуся общіе съ пролетными путями дру-

"Въ Азін сърый гусь гивздится въ центральной Персіп, въ Сибири, достигая полярнаго круга на Оби и только Байкальскаго озера и верховьевъ Амура въ восточной части страны, въ Монголіи и Туркестанъ.

"Сърый гусь очень статиая и сильная итица, которая инкогда не смънивается въ стада съ другими дикими гусями, по очень охотно присаживается къ своему домашнему собрату.

"Это бузусловно общественная птица, но въ періодъ гибздованья пары держатся отдъльно другъ отъ друга и только выводки съ подросшими молодыми соединяются въ стап. Самецъ сходится съ самкой на всю жизнь и живетъ съ ней очень дружно, оберегая ее отъ опасности, помогая въ выхаживаніи дѣтей и т. д. Вообще это очень сильная, хотя и до крайности осторожная птица; раненый же и преслѣдуемый гусакъ защищается съ удивительной силой и ловкостью и напоситъ крыльями такіе сильные удары охотинчымъ собакамъ, что испытавшія ихъ уже боятся бросаться къ гусямъ. Полетъ гуся сильный и быстрый, но итица поднимается высоко только во время пролета, въ другое же время летитъ низко и при перелетахъ на мѣста кормежки обыкновенно по одной и той же дорогѣ. Илаваетъ и ныряетъ гусь также превосходно, по спасается пыряньемъ только въ періодъ линьки.

"Подобно своимъ собратьямъ, сърый гусь растительноядиая птица; съ величайшей охотой пасутся гусиныя стап на прибрежныхъ заливныхъ лугахъ, на зеленяхъ, а также и на поляхъ, гдѣ остались осыпавшияся зерна. Эти птицы очень прожорливы и кормятся по крайней мърѣ два раза въ день, по зарямъ, и тогда наѣдаются до отвала, диемъ же, особенно въ жаркую пору, стан отдыхаютъ, около воды, при чемъ одинаково охотно располагаются на отдыхъ какъ около прѣсной, такъ и около соленой воды. Во время отдыха, какъ и во время кормежки стая охраняется или однимъ или нѣсколькими сторожами, изъ старыхъ опытныхъ гусаковъ.

"Гуси пускаются въ отлетъ съ своихъ зимовокъ очень рано. На Черномъ какъ и на Каспійскомъ морѣ ихъ стаи снимаются и тянутъ къ сѣверу уже съ послѣднихъ чиселъ февраля, и какъ въ южной, такъ и въ восточной Россіи ихъ замѣчаютъ еще тогда, когда вездѣ лежитъ снѣгъ и только кой-гдѣ на рѣкахъ начала выступать вода. Въ это время гуси летятъ очень высоко, но позднѣе, когда снѣгъ сойдетъ съ полей, рѣки выйдутъ изъ береговъ и зазеленѣетъ первая травка, гусиныя стаи летятъ гораздо ниже, собственно тѣ, которыя или думаютъ остановиться на отдыхъ или же приближаются къ мѣстамъ своего гнѣздовья.

"Выше я замѣтилъ, что пары сѣрыхъ гусей сходятся на всю жизнь; вслѣдствіе этого, прилетѣвши на родину, птицы теряютъ мало времени передъ тѣмъ какъ приступить къ гнѣздовитію, такъ какъ вся ихъ задача сводится только къ тому, чтобы найти подходящее для гнѣзда мѣсто. Въ нѣсколько дней сѣрый гусь съ необычайнымъ искусствомъ выбираетъ самое глухое мѣсто порѣчной заросли ольхи, березы и другихъ деревьевъ, или такъ назыв. уремы, находитъ здѣсь или кочку или сухое мѣсто около вывороченнаго пня, и здѣсь-то самка устраиваетъ свое гнѣздо. Иногда оно бываетъ очень велико и въ та-

комъ случав представляетъ большую кучу травы и камыша съ углубленіемъ посреднігь, которое выстлано перьями и пухомъ. Число ящцъ колеблется отъ 6 до 14, по чаще всего ихъ бываетъ 8 или 9. Чтобы показать, насколько рано прилетають гуси на м'яста своихъ гибздовій и какъ быстро устранвается гивздо, достаточно сказать, что на пизовьяхъ Плека первыя яйца находять уже въ концъ апръля, а въ Ландандін время кладки приходится на май. Ппогда сибгъ лежитъ въ такомъ большомъ количествъ, ледъ оттаялъ такъ мало, что весь пейзажь посить на себф скорфе зимній, чьмь весенній характерь, но парочки сврыхъ гусей уже запяли свои укромныя мѣста, гдѣ со временемъ трава, камышть и листва совериению скроютъ ихъ отъ чьего бы то ин было взора. Гусакъ шикогда не отходитъ далеко отъ своей дружки и либо держится около нея на берегу, либо плаваетъ тутъ же поблизости. Если все спокойно онъ отъ времени до времени вытягиваетъ къ ней свою шею и ижию гогочетъ, иногда ижсколько распуская крылья. Если же какой зв'трокъ или хищная птица покажется поблизости отъ гићзда, гусакъ весь настораживается, начинаетъ нервно двигаться взадъ и впередъ и успоканвается спустя только много времени. Когда гусыня проголодается, гусакъ занимаетъ ея мъсто, пока она кормится или просто отдыхаетъ отъ продолжительнаго сидънья, плавая на водъ. Яйца съраго гуся имъютъ отъ 3,7 до 3,2 дюйма въ длину и отъ 2,5 до 2,2 д. въ поперечникѣ; цвѣтъ ихъ очень блідный, грязновато-палевый.

"Въ концѣ мая или пачалѣ іюня выводятся гусенята, и тогда семья перебирается на болже общирное водное илесо, но опять-таки въ возможно глухомъ мъсть. Если же воды достаточно около гитада, въ такомъ случат отецъ и мать осторожно сводятъ птенцовъ къ берегу и здъсь учатъ ихъ илавать, пить, рвать ибжиую травку и прятаться при мальйшемъ предупреждении объ опасности. Каждый вечеръ самка собираетъ гусенятъ въ гизадо и прячетъ ихъ на ночь подъ своими крыльями, а самецъ охраняетъ выводокъ. Наконецъ, іюнь падходить къ концу, молодые подросли въ полгуся и почти оперились, только ихъ маховыя и рудевыя еще очень малы, и потому гусенята не могутъ летать, старые гуси пачинаютъ линять и тоже становятся весьма безпомощны, и выводки забиваются на это время въ самыя педоступныя крфии. Это единственное время, когда гуси, видя приближеніе опасности, спасаются пыряя, чтобы уйти въ камынии. Черезъ ивсколько педвль и молодые и старые почти выравниваются, и такъ какъ и тъ и другіе теперь совершенно оперились, выводки начинають оставлять крѣпи и летать за кормомъ на близлежащія поля".

Чтобы пополнить этотъ очеркъ, я приведу наблюденія падъ гусями на нижней Волгь, сдъланныя г. Смирновымъ. По живости и картинности изложенія это описаніе не уступаеть лучшимъ странинамъ С. Т. Аксакова и вмъстъ съ тъмъ въ точности передаетъ мъстный колоритъ.

"Въ теченіе осени въ Поволжьт держится гусь двухъ родовъ,

пишетъ г. Смирновъ, – мъстный и пролетный; мъстный гусь появляется въ концъ іюля мъсяца, пролетный же (въ томъ числъ и сибирская казара) въ половинъ сентября, или пъсколько позднъе, смотря по состоянію погоды. Собственно въ заволжскихъ займищахъ гусей выводится немного-мфстъ удобныхъ для этого мало, да и людно стало, не то, что было прежде. Теперь гуси выводятся только на возвышенныхъ, лъсистыхъ гривахъ общирныхъ острововъ, куда не достигаютъ мутные валы прибылой воды, и гдъ ръдко появляются весною неутомимые рыбаки съ своими сътями. Гусыня вьетъ свое немудрое гивздо въ глухой заросли терна, иногда подъ кучами набитаго прибоемъ валежника; послъ вывода уводитъ дътей въ недоступныя крфпи тальниковыхъ озеръ, гдф уже невозможно добыть выводокъ никакимъ способомъ. По мъръ спада воды подобное озеро, потерявъ связь съ рѣкою, стоитъ сначала какъ полная чаша; далеко къ его срединъ тянутся затопленныя вершины мелкаго тальника. Но чъмъ дальше, тъмъ вода все убываетъ и убываетъ—она быстро испаряется нодъ жтучими дучами польскаго солица и просачивается мелкими ручьями сквозь рыхлую, наносную почву острова. Встала въ берега Волга, осъло и озеро, раскинувъ по своимъ берегамъ густыя, едва доступныя крѣпи роскопно разросшагося тальника на вязкой, глинистой почвъ, въ которую нога уходитъ выше колъна. Въ эти тихія и кормныя м'яста сваливается вся птица, что усп'яла вывести д'ятей по окрестнымъ гривамъ; здъсь же перелиниваютъ исхудалые за весну цвътные селезни, паряжаясь въ сърый, будицчный нарядъ.

"Есть въ Поволжьт и другія еще болте кртпкія и недоступныя мъста-это тинистыя озера въ видъ общирныхъ торфяныхъ болотъ, доступныя человъку только во время зимы. Они встръчаются преимущественно по обширнымъ займищамъ при устьяхъ степныхъ ръчекъ, впадающихъ въ Волгу съ лѣвой стороны, какъ-то: Мочи (подъ Самарою), Иргизовъ, Еруслана и пр., или въ тъхъ мъстахъ, гдъ Волга, давая большое кольно вправо, отбрасываетъ по лъвую сторону огромную полосу заливныхъ луговъ. Подобныя болота расположены обыкновенно среди большихъ возвышенныхъ гривъ, почему не захватываются совершенно полою водою, а если ихъ иногда и заливаетъ отчасти, то только самымъ высокимъ половодьемъ, что, сравнительно, бываетъ ръдко. Дики и пустынны эти болота! Зыбучій берегъ ихъ поросъ густыми чащами ивы, черемухи, калинника и пр., перепутанными хмелемъ и другими вьющимися растаніями; далѣе, къ серединѣ идетъ уже непроходимая топь, покрытая то гладкимъ темнозеленымъ ковромъ мелкой травы, то косматыми кочками и густыми порослями камыша и тростника съ коричневыми шишками и султанами; мѣстами въ низкихъ, темно-зеленыхъ берегахъ стоятъ цѣлыя озера открытой воды, то свѣжія и глубокія, съ разбросанными кругами шпроколиственнаго кувшинника (водяной лиліи) съ роскошными бѣлыми и желтыми цв тами, то мутныя и ржавыя съ выступающими на поверхность желтыми и красными окисями минераловъ. Тихи и неподвижны эти

тяжелыя, безжизненныя воды; ръдко рябить ихъ поверхность легкій вътерокъ, еще ръже илеснется бойкая рыба... По утрамъ и вечерамъ собирается надъ поверхностью болота тяжелый, синеватый туманъ, грозя окрестнымъ жителямъ ядовитыми лихорадками. Развѣ иногда палетить случайно сильная степная полоса, раскачаеть до дна и оживитъ и всколько это сонное царство, но и то не надолго; прошелъ бъшеный вихрь и опять все тихо, неподвижно... Удеглась возбужденная имъ какая-то тяжелая, медлениая зыбь всего болота вмісті съ тростниками, кочками и бархатными лужайками, расправились смятыя, перепутанныя купы камыша; перевернутые листья кувининика опять легли на воду своими бъльми изпанками, и стоитъ оно безмолвное, дикое, наводящее на простого человъка невольный ужасъ горящими въ темныя ночи болотными огоньками. Вотъ въ такихъ мъстахъ вынужденъ теперь ютиться гусь вивств съ дупелемъ, бекасомъ и другою чисто болотною итицею; здісь ему тихо, безопасно; не достанетъ выводка ни человъкъ, ни дикій звърь. Но малое количество подходящаго корма, безчисленныя тучи комаровъ и мелкихъ, сърыхъ волжскихъ мошекъ скоро выживаютъ поднявшийся выводокъ на болже привольныя мъста; недолго онъ оглашаетъ зыбучее болото своимъ зычнымъ крикомъ, а едва миновалъ іюнь, какъ матка уводитъ гусенятъ на Волгу въ островныя озера, или въ камышистые ерики лъвой полосы дуговъ.

"Но самое большое количество гусей выводится въ низовьяхъ Волги, въ общирныхъ камышахъ морского побережья, а также на лиманахъ Камышъ-Самарскихъ озеръ, въ которыхъ пропадаютъ безслъдно степныя ръчки Большой и Малый Узепи.

"Весь мъстный гусь съ шизовій Волги и съ Қамышъ-Самарскихъ лимановъ летитъ вверхъ по ръкъ и жируетъ, съ половины іюля до времени отлета на зимовку въ каспійскіе култуки (заливы), на пространств'в между Самарою и Царицынымъ, гдв къ ръкв прилегаютъ илодопосныя, сплошь обработанныя степи, чего въ низовьяхъ ивтъ. Здісь косякъ гусей, облюбовавъ какое-нибуь мізсто на песчаныхъ розсыняхъ для постояннаго притона, начинаетъ летать каждый день на оба берега рфки кормиться на хлъбныя поля. Обыкновенно они летаютъ на поля два раза въ депь-рано утромъ и вечеромъ, незадолго до заката солица. Впоследствии присоединяются къзнимъ и пролетные гуси изъ средней и съверной Россіи, по не надолго-придетають они поздно, а наступающіе холода гонять ихъ далже и далже на югъ. Опытный охотникъ сейчасъ же отличитъ прилетнаго гуся отъ мъстнаго-онъ какъ-то строже, стативе и чище перомъ; при перелетахъ стая держится выше падъземлею и въ большемъ порядкъ; крикъ его звончве, отчетливве. Они останавливаются обыкновенно на избранной м'ястности дня на два, на три и летаютъ на окрестныя поля тоже по утрамъ и вечерамъ. Случается, впрочемъ, что погода вдругъ установится на недълю или двъ ясная, тихая, останавливается и пролетный гусь, но едва подуль холодный вътеръ, заклубились тяжелыя

осениія облака, какъ косяки одинъ за другимъ потянутъ на югъ, илутая въ темныя, ненастныя почи; въ такое время нерѣдко случается, что уставшіе пролетные косяки садятся по почамъ на отдыхъ гдѣ ни попало, даже на прудахъ среди общирныхъ селъ. Во время подобныхъ плутаній косяки теряютъ много отсталыми, которые долго потомъ колотятся по озерамъ и большею частію гибнутъ отъ охотниковъ или орловъ-бѣлохвостиковъ.

"Много я гонялся когда-то за осенними гусями, много перенесъ холоду, голоду и разныхъ лишеній... Пріятно теперь вспомнить чудныя картины волжской природы—теплые октябрскіе дни, лупныя ночи съ клубящимися падъ озерами и болотами бѣловатыми туманами, темныя, непроглядныя осеннія почи съ блуждающими болотными огоньками и тяжелыми массами дождевыхъ тучъ... Блуждаешь, бывало, по общирнымъ займищамъ съ надежною одностволкою, прислушиваешься, присматриваешься—иѣтъ ли гдѣ зазѣвавшагося косяка статныхъ гусей, нельзя ли свалить крѣпкимъ зарядомъ пару, другую... А они тутъ, какъ тутъ... Далеко въ ночномъ туманѣ слышится легкая трель сторожевого гусака, скрипнуло маховое перо, послышался легкій говоръ проснувшейся стан, но вскорѣ опять все тихо...

"Вотъ они сидятъ ночью на открытомъ, ровномъ песчаномъ берегу затона, почти у самой воды, темною, неподвижною массою; тихо и безмолвно въ сыромъ почномъ воздухѣ, развѣ свистнетъ гдѣ миловидный чирокъ-грязнушка или послышится отдаленный крикъ кряковой утки, внезапно спугнутой съ грязной лужи смѣлымъ хорькомъ. Крѣпко спитъ стая, заложивъ головы подъ теплое крыло, только сторожевой гусакъ то чутко дремлетъ, то вдругъ подинмаетъ голову и озпрается пытливо по сторонамъ. Ночь прошла благополучно; повъялъ легкій восточный вѣтерокъ, забѣлълась зорька, сильнъе потемнълъ западъ; разсвътъ идетъ все быстръе и быстръе; заклубился туманъ, побълъла широкая площадь тихо волнующейся воды, обрисовался противуположный, обрывистый берегъ острова съ густыми группами осокорей, задернутыхъ легкою дымкою тумана.—Проснулся старый гусакъ и тихо окликнулъ стаю, ему отвътили сонные, лънивые голоса. Не вдругъ просыпается стая: нъкоторые гуси уже сошли къ водъ, аппетитно позъвываютъ, размахиваютъ крыльями и звонко скрипятъ маховыми перьями, другіе еще спятъ въ покоїної лѣнивої позѣ. Но вотъ уже совсѣмъ свѣтдо, разгорѣлся востокъ надъ ровною заволжскою степью, обрисовались въ туманной дали мягкіе контуры лъсистыхъ горъ праваго берега. Проснулась вся стая, промочила горло свѣжею, холодною водою, потолковала что-то своимъ выразительнымъ говоромъ, снялась вдругъ и молча пошла прямо въ степь, выше и выше забирая надъ землею. Черкнули изъ-за плоскаго степного горизонта яркіе лучи осенняго солнца и освѣтили летящей стаѣ гусей необозримыя, выжатыя поля пщеницы, проса, ячменя, темныя полосы густого бурьяна и безчисленное множество хлѣбныхъ скирдъ и ометовъ.—Стая сдаетъ книзу, летитъ еще съ версту, дълаетъ кругъ и

съ крикомъ опускается на загонъ; новертвлись гуси, нохватали забытые колосья и разсыпанныя зерна, видять-илохо; загоготали, снялись всей стаей и пошли дальше надъ самою землею, опасливо минуя скирды и полосы бурьяна; саженъ за двъсти опять опустились, на мипуту замолкли, порылись въ густой жнивъ и опять снялись съ крикомъ и гвалтомъ. Часто такимъ образомъ они далеко уходятъ въ степь, пока не найдуть себф обильнаго кормомъ мфста, по душф, гдф и проводять пногда часъ, два, покуда не набыють свои объемистые зоба до последней возможности. Илохо придется загону, на который повадилась летать стая, особенно, если пшеница не сложена въ скирды, а лежить въ кучкахъ: гуси растащутъ, разобьютъ сиопы, вынциплютъ тяжелые колосья, словомъ, обмолотять по-своему.—Наконецъ аппетитъ удовлетворенъ; первые назвшиеся гуси начинаютъ подавать голоса, нъкоторые чистятъ запачканные въ землъ носы, перебираютъ перья, машутъ крыльями; гусаки гордо расхаживаютъ, вытянувъ шен, и громко гогочутъ; стая скучивается, говоръ усиливается до невозможности, и вдругъ, какъ-то неожиданно, поднимается на воздухъ; замъшкавшіеся гуси торопливо вспархивають по сторонамъ и съ крикомъ присоединяются къ став. Стройной, волнующейся линіей, забирая, все выше и выше, гуси безостановочно летять по прямой линін на волжскіе пески или озера и отдыхаютъ здісь до вечера.

"Хорошо замѣтить мѣсто, куда гуси повадились летать утромъ и вечеромъ; стоитъ только залечь, чтобы свалить крѣпкимъ зарядомъ крупной дроби не одного, а нѣсколько штукъ сытыхъ гусаковъ!..

"Долго присматривался къ летающимъ стаямъ туземный стрѣлецъ-хохолъ, опредълилъ примърно и мѣсто, гдѣ вотъ этотъ большой косякъ гусокъ-крыжней *), что летаетъ мимо утромъ и вечеромъ, набиваетъ воровскимъ манеромъ свои объемистые зоба. "Эхъ, кабы да вдарить!" мечтаетъ стрѣлецъ, но некогда—время горячее: идетъ усилениая молотьба на открытыхъ токахъ, дорогъ каждый часъ, не до гусей тутъ... Пріфхалъ какъ-то на станъ знакомый стрѣльцу парубокъ и сообщилъ, что гуси лоскомъ выбили заброшениую полосу пьяницы Морденки, каждый день повадились летать, да смирные такіе, вплоть подпускаютъ. Расшевелить парубокъ стрѣльца; зарядилъ онъ полуторнымъ зарядомъ свою немудреную одностволку съ ветловой, самодѣльной ложей, залегъ вечеромъ въ бурьянокъ около злополучной, брошенной хозянномъ полосы проса, дожидается.

"Сильно склоняется солице къ закату, вотъ оно уже коснулось нижнимъ краемъ лъсистыхъ шершавыхъ горъ праваго берега Волги и едва золотитъ верхи безчисленныхъ коненъ и скирдовъ, что усъяли всю степь на безконечное пространство; потемнъло голубое небо на востокъ, легли длинныя полосы тъни отъ бурьяновъ и густыхъ заро-

^{*)} Крыжень—собственно названіе кряковой утки, но заволжскіе малороссы называють иногда такъ гусей-гуменниковъ для болѣе рельефнаго отличія отъ мелкихъ гусей, т.-е. казары.

слей дикаго коноплянника, что разрослись на старыхъ токахъ или на м'ястахъ огромныхъ ометовъ соломы, брошенныхъ за ненадобностью и сгнившихъ до тла. Съло солице, потемитьла желтая степь; на плоскомъ горизонтъ, вслъдствіе штры потухающаго свъта, вырастаютъ небывалые лѣса; отчетливые контуры копенъ и высокихъ зарослей коноплянника стушевываются мало-по-малу и въ концѣ, концевъ на мѣстѣ ихъ виднѣются какія-то темныя, безформенныя массы. Въ воздухѣ сильно похолодѣло и потянуло сыростью.—Далеко на току блеснулъ огонекъ, вотъ еще и еще—молотильщики варятъ себъ неприхотливый ужинъ. Глухіе и смъщанные звуки, что иногда раздавались въ безмолвной степи, получають большую отчетливость въ чистомъ вечернемъ воздухѣ. Съ большой провзжей дороги несется стукъ колесъ и скрипъ тяжело нагруженныхъ, длинныхъ малороссійскихъ арбъ. Далеко гдъ-то послышались стройные и заунывные звуки малороссійской канты, которыя такіе охотники расп'івать заволжскіе хохлы, почти забывше свои старыя національныя п'всни далекой Малороссін; чізмъ-то церковнымъ, безотрадно-унылымъ вітеть отъ этнхъ звуковъ; нътъ въ нихъ ни одной полной, энергической ноты. Не выдержалъ волжскій мужичокъ, что ушель сюда, въ степь, на хорошіе осенніе заработки; долго онъ пробовалъ свой голосъ, мурлыкая себъ что-то подъ носъ; но вотъ полились по широкому простору степи энергическіе звуки волжской пъсни, полные той неуловимой гармоніи съ величавой природой могучей ръки, которая отзывается чуткому уху во всѣхъ, такъ называемыхъ разбойничыхъ и бурлацкихъ пѣсняхъ этихъ потомковъ "воровскихъ, понизовскихъ людей"... Едва скользятъ въ нихъ общерусскіе, заунывные мотивы, нѣтъ и сантиментальности; все это покрывается впечатлъніемъ чего-то удалого, широкаго, могучаго... какъ могуча и безпредъльна та рѣка, на бѣлыхъ валахъ которой создались, выросли и окръпли эти вольныя пъсни. До сихъ поръ еще помнить волжскій мужичокъ своихъ грозныхъ атамановъ, что окрестили своими именами лъсистые и обрывистые бугры праваго берега рѣки, понарыли въ нихъ пещеръ, гдѣ и запрятали за тридевятью жедъзными дверями понизовскую волю-волюшку...

"Чутко прислушивается ко всѣмъ этимъ звукамъ притаившійся охотникъ; хмурится на удалую пѣсню "москаля", бойкаго задиры и пересмѣшника... Почти совсѣмъ уже темно, хотя на ясномъ закатѣ все еще переливаются яркіе лучи медленно потухающей зари; на глубокомъ небѣ засверкали рѣдкія звѣздочки... Мало-по-малу замираютъ громкіе, степные звуки. Зашевелились въ травѣ мелкіе звѣрки и птички: крикнулъ гдѣ-то перепелъ, свиснулъ длинноногій тушканчикъ; зарѣяли въ воздухѣ маленькія степныя совы.

"Вдругъ со стороны Волги послышался давно ожидаемый и желанный кликъ гуся; вотъ ближе и ближе... Схватилъ стрѣлецъ съ головы шапку, положилъ подъ прикладъ къ плечу, чтобы хоть нѣсколько смягчить отдачу ружья, заряженнаго огромнымъ зарядомъ, взвелъ курокъ, притаился, ждетъ... Замѣшкались гдѣ-то гуси, ходко идутъ на

полюбившееся имъ мѣсто; вотъ они уже падъ самой головой сдѣлали большой кругъ, заскрипѣли маховыми перьями и съ крикомъ, въ безпорядкѣ, пачали спускаться на полосу, какъ-то пеловко покачиваясь всѣмъ тѣломъ въ воздухѣ. Не загорячился опытиый охотшкъ, не далъ имъ и въ стороны разбрестись. Сверкнуло изъ бурьяна багровое иламя, закутанное бѣловатымъ облакомъ дыма; чуткое эхо разпесло по глухой степи громовой ударъ... Безномощно быотся по землѣ задѣтые дробью гуси, остальные въ смертельномъ испугѣ опрометью бросаются въ разныя стороны.

"Много потеряють такимъ образомъ пролетные косяки своихъ товарищей, покуда достигнутъ иппрокихъ водъ Каспія; много ихъ и здѣсь погибиетъ отъ сильныхъ морскихъ бурь, голода и холода; почти наполовину уменьшенный косякъ достигаетъ наконецъ обширныхъ, никогда незамерзающихъ соровъ (солончакъ), что тянутся необозримыми объльми линіями въ далекой туркменской землѣ или по сѣвернымъ провищіямъ Персіи. Здѣсь имъ уже нечего бояться грома выстрѣловъ, здѣсь полное безлюдье; далеко кругомъ тянется мертвая дикая пустыня. Развѣ иногда ноявятся туркменскіе джигиты, соблазненные неумолкаемымъ шумомъ безчисленныхъ массъ зимующей птицы, онасливо повертятся кругомъ топкихъ соровъ на своихъ статныхъ коняхъ, поймаютъ одну, другую утченку голодными, дурно выношенными соколами и ястребами, и исчезнутъ опять за отдаленными песчаными барханами".

Добываніе гусей и қазароқъ.

Приведенные очерки образа жизни пролетныхъ гуменниковъ въ Уфимской губ, и съраго гуся въ Астраханской даютъ вмъстъ съ тъмъ полное и точное описаніе охоты за пролетными и мъстными гусями, и потому намъ остается упомянуть только о нъкоторыхъ другихъ способахъ, не затропутыхъ авторами этихъ очерковъ.

Весною къ пролетнымъ гусямъ подойти ивтъ возможности, но подъбхать въ телбив или верхомъ иногда удается. Чаще всего въ такомъ случав подъбздъ соединяютъ съ загономъ, т.-е. подъбзжающе охотники, не останавливая телбии, незамвтно спускаются съ нея, укрываясь за кустами, въ разстоянии другъ отъ друга приблизительно ста наговъ, а затъмъ телбиа объбзжаетъ гусей съ другой стороны и спугиваетъ ихъ такъ, чтобы они летбли на охотниковъ. Загонщикъ долженъ бытъ опытный, и вся охота, можно сказатъ, находится въ его рукахъ; но и при опытности онъ зачастую не можетъ ничего подълать съ гусями, которые, снявнись съ мъста, летятъ совсъмъ не въ томъ направлени, гдъ засъли охотники.

Лътомъ за выводками гусей охотятся съ лодки, совершенно такъ же какъ за утками, по гуси гораздо остороживе и это дълаетъ охоту за инми болве трудною. Наконецъ, осенью охотинки сторожатъ гусей или на перелетахъ съ мъста дневной кормежки на воду, или на самыхъ мъстахъ кормежки.

Такимъ образомъ, охота за гусями во многомъ сходна съ охотой за дрофами: то же скрадываніе, то же соревнованіе хитрости охотника съ хитростью итицы. Съ этой точки зрѣнія, охота за гусями многимъ придется не по вкусу. Но какъ охота трудная, она и увлекаетъ многихъ. При этой охотѣ мало быть хоронимъ стрѣлкомъ: надо еще знать привычки птицы, безъ чего успѣхъ немыслимъ, такъ какъ гуси вороваты, умѣютъ выбирать укромные уголки для своихъ остановокъ, и кто не умѣетъ ихъ прослѣдить, тотъ ихъ и не добудетъ.

Изъ промысловыхъ способовъ добыванія гусей практикуется охота за подлинью, ловля перевъсами—и то и другое производится такъ же, какъ при добываніи утокъ — и загонъ линяющихъ гусей въ съти. Послъдній способъ употребляется обитателями тундръ, которые такимъ образомъ добываютъ преимущественно казарокъ. На Колгуевѣ, напръ, нменно этимъ способомъ ловятъ тысячи черныхъ казарокъ, тогда какъ бълолобая и гуменникъ обыкновенно спасаютея отъ загона, такъ какъ линяя позднѣе казарки, еще летаютъ, когда послъдняя уже не можетъ летать.

Это добываніе казарокъ происходить около Прокофьева дия, т.-е. въ началъ іюля, когда, по выраженію промышленшиковъ, у гуся "глухая лёнь" бываетъ. Линяющіе гуси держатся на малыхъ озерахъ, прячась здѣсь въ заросляхъ кустарниковъ и травъ, а днемъ посѣщаютъ сосѣднія большія озера, гдѣ кормятся. Узнавъ это заранѣе, промышленники, какъ русскіе, такъ и самобды, ставятъ между двумя озерами съть въ родъ того вентеря, которымъ ловятъ куропатокъ, развертывая ея крылья въ сторону малаго озера. Съ разсвътомъ промышленники вывзжають въ своихъ лодченкахъ на малое озеро, гдф держатся гуси, и окруживъ ихъ, начинаютъ подгонять къ знакомому берегу, гдѣ лежитъ переходъ между двумя озерами. Загонъ этотъ-дъло довольно трудное, такъ какъ гуси, видя людей, сбившись въ кучу, держатся сначала середины озера. Лишь медленно и неохотно подвигаются они къ берегу, да и тутъ долго раздумываютъ, прежде чѣмъ рѣшатся на него выйти. Въ этотъ моментъ загона промышленникъ долженъ быть особенно осмотрителенъ. Все дъло теперь въ вожакъ: куда пойдетъ вожакъ, туда за нимъ и все стадо. Если вожакъ пустится мимо съти, тогда ловля не удалась—и все стадо бросится мимо; но стоитъ только вожаку пойти въ головку сѣти, чтобы всѣ его собратья не раздумывая пустились за нимъ. Надо сказать, что загонъ почти всегда бываетъ удачный, настолько хорошо знають свое дъло промышленники, съ малолетства принимающие участие въ этой ловлев. Если гуси загнаны въ съть, тогда нъсколько человъкъ бросаются къ головкъ съти и здъсь безъ всякаго сопротивленія хватаютъ попадающихъ въ узкое отверстіе головки своихъ жертвъ, тутъ же приканчивая ихъ. Такая бойня, доставляющая сразу по нъсколько тысячъ птицъ, оканчивается только со смертью последней, и обыкновенно все стадо попадаетъ целикомъ, до того дружно идутъ гуси другъ за другомъ. Затѣмъ добычу ощипываютъ, кладутъ въ бочки и солятъ, отчасти для продажи, отчасти

для собственнаго потребленія. Но съ гусями то же, что съ утками: всятьдствіе перящества и плохоїї солки, мясо получается певкусное, часто порченое, и пужна вся пеприхотливость самотдовъ и русскихъ промышленниковъ, привыкинихъ къ мурманскої трескт и гридинскимъ сельдямъ, чтобы фсть его. Въ продажт въ Архангельскт колгуевскії гусь идетъ по 6—8 кон. штука, да и то его берутъ бъдняки.

Такимъ образомъ, итичій промысель на Колгуевѣ, благодаря его неправильной постановкѣ, рѣнштельно не оправдываетъ себя. А между тѣмъ, при иной постановкѣ дѣла, съ Колгуева можно бы вывозить такіе продукты, какъ конченые гуси и утки, не говоря уже о многомъ другомъ, что нашло бы себѣ широкое распространеніе въ самыхъ разнообразныхъ классахъ населенія.

134. Краснокрылъ. Pheonicopterus roseus, Pall.

Табл. 138.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 756. **Болъе распростр. названія**: краснокрылъ, фламинго.

Мъстныя названія: краснокрыль, красный тусь. Кирг.—кызиль-касъ.—Калм.—улань-талу.

Краснокрылъ, котораго охотники бьютъ только случайно или покупаютъ живымъ, чтобы содержать дома, распространенъ у насъ въ качествѣ гнѣздящейся птицы только въ Киргизскихъ степяхъ, устранвая свои гнѣздовыя колоніи то въ одной мѣстности, то въ другой, смотря по тому, гдѣ ему безопаснѣе. Однако гнѣзда всегда располагаются въ почти недоступныхъ трясинахъ и обыкновенно такъ далеко отъ берега, что простымъ глазомъ ихъ и не замѣтить. По всей вѣроятности сѣверный предѣлъ гнѣздовой области краснокрыла у насъ не поднимается выше $48^0-48^1/2^0$ с. ш., но какъ залетная птица, краснокрылъ поднимается до Самарской губ. и Сызрани. Лишь въ качествѣ залетнаго гостя бываетъ краснокрылъ на сѣверномъ берегу Чернаго моря.


Въ началѣ іюля краснокрылы вмѣстѣ съ лебедями собираются тысячами для линьки на сѣверномъ берегу Мертваго Култука, и тогда ихъ безъ всякаго труда добываютъ здѣсь. Для этого линяющихъ и неспособныхъ летать птицъ отгоняютъ отъ берега въ воду, гдѣ онѣ идутъ по дну, пока это имъ позволяютъ ихъ длинныя ноги. Но потомъ птицѣ приходится плыть, и тогда охотники безъ труда завладѣваютъ ею.

Мясо краснокрыловъ невкусно, но языки очень цѣнятся любителями. Въ Астрахани и выше по Волгѣ за пару живыхъ краснокрыловъ платятъ до 20 руб. Года 2—3 они хорошо живутъ въ неволѣ, а потомъ хирѣютъ.



VIII.

ЦАПЛЕВЫЯ.



135. Каравайка. Ibis falcinellus, L.

Табл. 139.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. І, стр. 762.

Мѣстныя названія: каравайки, каравашка, темньій или черный кронишень. Калм.—шинчи.

По собраннымъ мною свъдъніямъ "каравайка распространена колоніями болѣе или менѣе обширными и, мѣстами, весьма удаленными другъ отъ друга. У насъ одна обширная колонія занимаетъ нижнюю Волгу, отъ устья до Сарпинскихъ озеръ, меньшая поселилась въ области рѣки Урала и въ Киргизскихъ степяхъ, нѣсколько другихъ—по теченію рѣкъ равнинной части сѣвернаго Кавказа, а также по нижнему теченію Акуши и Куры въ Закавказъѣ. Наконецъ, по всей вѣроятности, каравайка гиѣздится въ небольшомъ числѣ при устъѣ Днѣстра и на правомъ берегу днѣстровскаго лимана, тогда какъ показаніе Нордманна о гнѣздованіи каравайки въ низовьяхъ Днѣпра и Буга является анахронизмомъ. Въ качествѣ залетной птицы каравайка бываетъ подъ Оренбургомъ, Сызранью, въ Бузулукскомъ уѣздѣ, въ губ. Воронежской, въ Крыму, Польшѣ, Курляндіи, Лифляндіи и въ исключительно рѣдкихъ случаяхъ на сѣверномъ берегу Финскаго залива".

Мясо каравайки жестко и такъ часто пахнетъ рыбой, что охотники совершенно не цѣнятъ эту птицу въ качествъ дичи.

136. Чепура бѣлая. Ardea alba, L.

Табл. 140.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 803.

Въ пастоящее время мода на перья и перяныя украшенія вызвала такое преслідованіе птицъ, что наши промышленники ежегодно отправляють за границу несмітное множество перьевъ и птичыхъ шкурокъ. Эта мода, безъ сомпінія, преходяща и уже начинаетъ ослабівать, по перья піткоторыхъ штицъ всегда были и будутъ въ ходу за ихъ чрезвычайную красоту. Таковы между прочимъ піткими расщепленныя перья большой бітлой цапли, развивающіяся въ брачный періодъвъ видіть двухъ пучковъ, плущихъ отъ нижней части спины до хвоста.

Большая бѣлая цанля встрѣчается у насъ круглый годъ въ устьяхъ всѣхъ большихъ рѣкъ Кавказскаго края, гиѣздится въ Бессарабін, въ низовьяхъ Диѣстра, въ небольшомъ количествѣ въ устьяхъ Диѣпра и изрѣдка даже въ Харьковской губ. Въ устьѣ Волги, Урала, по инжией Эмбѣ и на Сарпѣ многочисленна, залетая по Волгѣ до Камынина и по р. Уралу до Оренбургскаго края. Отдѣльныя особи залетаютъ даже въ Польшу и Курляндію.

Конецъ второго тома.

.



Menshir, L.A. Okhotrici Rossii i Kawkaza

_

